


VALTER COLLEGE

DISPENSATOR

4







Pharmacopœi Parisienses

ex Dono Magistri
Gillet

1764









11165 1116
VALERII CORDI
Dispensatorium,

SIVE
PHARMACORVM
CONFICIENDORVM
RATIO;

Cum PETRI COVDENBERGII, &
MATTHIÆ LOBELII Scholiis, emen-
dationibus, & Auctariis.

Accessit hac editione, præter GVILIELMI
RONDELETII de Theriaca tractatum, emen-
datiorem; & FORMVLAS SELECTIORVM
PHARMACORVM, quorum post Val. Cordum
vltus passim receptus est, auctiores; alius FR.
DISSALDEI eiusdem argumenti Libellus.

Ball. ydins.



COLE
DE
PHARMACI
DE
PARIS

LVGDVNI BATAVORVM,
Ex Officina IOANNIS MAIRE.
clo. lo. c. xxvii.

collationné le 23 mars 1839.
F

LECTORI.

Scias, benigne Lector, asteriscos sparsim in hoc
Libello obuios, loca emendata, mutata, vel resti-
tuta denotare: Notis item his [] inclusa, illu-
strando contextui addita esse à P. Condenbergio,
& aliis.

*Virtutum omni genere
Clarissimo viro,*

D. GERARDO GRAMAIO,
Domino Vefaliae Comitiss,

ac Aërii bellici Quæstori Statuum
dignissimo,

PETRVS COVDENBERGIVS S. P.

CVM VALERII CORDI de con-
ficiendis Pharmacis libellum Chri-
stophorus Plantinus prelo suo esset com-
missurus, rogauit me, ut, si quid haberem
quod editionem istam iuuare posset, cum
studiosis communicarem. Fuit enim opti-
mo viro semper propositum, ut quos libros
imprimit, non nisi emendatissime è sua
officina prodire sinat. Quamobrem, ut
de ipsius incredibili taceam diligentia &
sumptu; in omni disciplinarum genere
doctissimorum virorum operam utitur. Ego
verò, etsi quæ iam olim in hunc Cordi li-
bellum (quem ego, quicquid dicat præfatio
anonyma, post obitum auctoris in lucem pro-
diisse, heredum vel amicorum curam, certis
de causis persuasum habeo) annotaueram,

non essent apud me tanti momēti, ut vel semel de illorū editione cogitauerim; tamen nō potui nō homini mihi amicissimo, & honesta petenti morem gerere. Quare vespertinas aliquot hac hieme horas; quæ sola me quid scribere vel legere permittebāt, libelli huius correctioni dedi; & maximo mendorum numero sublato, in suū quaque ordinem restitui; multis interim ipsius auctoris adiectis medicaminibus, quæ hætenus hic fuerunt desiderata; ita ut operā me meā non malè posuisse cōfidam: vbi à nonnullis haud immeritò notatur, explicatè subiunctis id rationibus doceo; & nonnumquā ineptas quorundā reprehensiones refuto, quæ solo nouitatis studiosine ullis rationibus vidētur inuectæ. Si quid autē à me erit omissū, copiosè & diligēter excutietur in magno meo huius farine opere, quod fortasse aliquādo medicis & pharmacopœis non minorem voluptatē quàm utilitatem adferet. Quòd verò illud nondū perficiā & publicè, maximas habeo & grauissimas consilii mei causas, tū quòd eorū fauore nō subleuer, quorum

quorū intererat curare ut tale quid diligēter præscriberetur; tū quòd tēpora sint eiusmodi, ut plures fiāt alyptæ, quàm experti Medici & Pharmacopœi. Qua de re cūm mecū cogito, nihil fero molestius, quàm gentis nostræ inscitiam; quæ cūm in aliis ferè rebus omnibus nulli sit nationi secunda, nusquam aequè peccat, quàm quòd nostri ordinis hominib. sit iniquior. Id verò pluribus verbis aperire non est necesse. Quis enim est vel mediocriter in pharmacopoliis versatus, cui hoc non sit notissimum? Magna spes erat præterea, IOANNEM GOROPIVM BECANVM, non tantum rei Medicæ, sed vniuersæ Philosophiæ & antiquitatis peritissimum virū; aliquid de Pharmaceuticæ scripturum. quod utinam fecisset, Sed quia nunc omni doctrina refertum opus, quod verè venerandæ antiquitatis planstrum quis appellet, præ manibus habet, nostris certè rebus vacare non potest: ideoque nec hortum, ut constituerat, colere. Id quidē ego totis ferè viginti annis feci sedulo: & quidem nūc maximis laboribus & impensis,

*ad sexcenta exoticarum stirpium genera
in meo florere hortulo quotidie, etsi rei
familiaris cum iactura & dispendio,
maxima tamen cum voluptate cerno. Et
nisi cultor pauperis horti esset pauperior,
darem operā, ne quid mihi deesset, quod
nostra saltem tellus, licet summa cura,
ferre posset. Interea id quod possum ago,
quando quod volo non licet. Sperandum,
inquit Euripides, & ferendum. Ceterum,
ut ad institutum redeam, quæ in hoc
opusculo præstiti, illa tibi, Gerarde Gra-
maie, singularis omnium bonarum artiū
patrone, dico dedicōque; parim ut obser-
vantiam erga te meam testificer, par-
tim ut hæc qualiacumque nominis tui
auctoritate munita, invidiam & calum-
nias tanto facilius ferant. Suscipies ergo
hæc, quæ tua est humanitas, benigno vul-
tu, quo Petrum Coudenbergium in tuā
iam pridem clientelam recepisti, & re-
ceptum constanter tueri pergis. Vale,
Macenas optime. Ex officina nostra
pharmaceutica, Antuerpiæ, Kalend.
Martius clō. Io. LXVIII.*

accensus, pro sua tamen modestia atque prudentia, nonnihil subuerebatur, priuam suam auctoritatem ad Pharmacopolas permouendos, ponderis haudquaquam satis esse habituram. Itaque librum suum Senatui potiùs offert, tum demum in usum publicum assumendum, cum esset illius iudicio & auctoritate comprobatus. Senatus verò, pro sua in studiosos omnes propensione, ac reipublicæ omni ex parte iuuandæ diligentia ac sollicitudine, officium illud Cordi perquam gratum habuit; librūque collegio Medicorū, Cordo præsente, perlegendum & examinandum tradidit: vt si quid mutandū, adiiciendūve arbitraturi essent, id auctore non modò sciente, verū etiam consentiente fieri posset. Quod cum sedulò ac magna diligentia factum esset, Senatusque ex Medicorum censura iam intellexisset, nihil hactenus absolutius aut emendatius in hoc descriptionum genere typis inuulgatum esse; librum non solum in publicum edendum, verū etiam Pharmacopolis, vt eum veluti lumen quoddam deinceps sequantur, offerendum esse decreuit. Cuius quidem editioni, hac quoque de causa studiosiùs inuigilatum est, vt auctore interim in Italia, dum ad metam studiorum suorum, quàm acerrimè contendit, immatura morte sublato, aliquid tamen illius

extaret, quod ingenium eius & industriam posteritati testaretur, eumque ab obliuione vindicaret.

Hoc igitur Valerii Cordi, candidissimi & diligentissimi iuuenis monumentum quaecunque, certè non pœnitendum, studiose lector, obuiis vlnis amplectere: & si quid ex eo iuuaberis (iuuaberis autem, nisi fallor, quàm plurimùm) amplissimo Norimbergensi Senatui, cuius liberalitate tibi cōmunicatur, gratias habe. Sin autem aliquid in eo displicuerit, ne Auctorem mortuum inhumaniter calumniis impete: sed absolutiore opere in publicum edendo, illum vincere, & nomen eius obscurare cōtende. Bene vale.

I O A N N E S P O S T H I V S

D. M E D I C V S G E R M A N V S.

*Pharmaca quæ Cordus variis collegit in hortis,
Latus agens cui tempora verna sui,
Post obitum in multos transcripta fuere libellos;
Verùm his errores non tolerandi inerant:
Quos gelido veniens Petrus de monte remouit,
Miscendo fidâ pharmaca cuncta manu.
Dii tibi, Coudenberge, senis dent Nestoris annos,
Vt quod habes, ingens perficiatur opus.*

A 5 I N D E X

INDEX SECTIONVM.

Pharmacopœum qualem virum esse deceat.

Confectiones aromaticæ.

Confectiones Opiatæ.

Condita. Conseruæ.

Syrupi. Rob. Lohoch.

Lenitiua & Solutiua.

Pilulæ. Trochisci.

Olea. Vnguenta.

Cerota. Emplastra.

Præparationes quorundam simplicium.

Ponderum ratio & notæ.

Accesserunt Valerii Cordi De purgantium medicamentorum extractione, ac Oleorum artificiosa distillatione (præter nonnulla pharmaca locis suis inserta) libellus.

Epitaphium eiusdem Valerii Cordi.

APPENDICIS INDEX.

De Delectu, Collectione, Repositione, & Duratione Simplicium, ex Iacobo Siluio.

De Adulterationibus Simplicium medicamentorum cognoscendis, ex eodem Iacobo Siluio.

Simplici aliquo absolutè scripto, quid accipiendum, ex eodem Iac. Siluio.

Diarium Pharmacorum parandorum, & simplicium legendorum, à Matthia Lobelio collectum.

Nonnulla purgantia medicamenta composita, Matthiæ de Lobel.

Succedanea, Quid pro Quo, vt vocât, ex Iac. Siluio.

De Succedaneis, Lobelii, imitatione Rondeletii.

Guilielmi Rondeletii de Theriaca tractatus, emendatior & auctior.

Formula Selectiorum Pharmacorum, post Cordum vſitatorum, auctiores.

Pharmaconetes siue Pharmacitis Biblos, Fr. Disſaldei, Liber continens Pharmaca tam simplicia quàm composita, quæ in Officinis parata habere debent Pharmacopœi.

Ff

VALERII CORDI

S I M E S V S I I

PHARMACORVM CONFICIENDORVM R A T I O.

*Qualem virum Pharmacopœum
esse deceat.*

MAGNUM præsidium humanæ imbecillitati in Medicina situm est, vt Homerus, omnium poëtarum præstantissimus, Medicum non sine causa πολλὰν ἀντάξιον ἑ καὶ pronuntiasse videatur. Verùm huius laudis, vt nunc quidem Medicina administratur, non exiguam partem Pharmacopœus sibi vindicat, cùm sit Medici quasi dextra manus; pericliteturque ipsius culpâ sæpè, non solùm ægri valetudo, verùm etiam Medici, quantumuis præstantis, fama & existimatio; cùm ea quæ Medicus rectè præscribit, parum dextrè exequitur, aut materia vtitur exoleta, aut adulterata. Inde enim frequenter accidit, vt æger vel non iuuetur omnino, vel, quod multo peius est, etiam lædatur. Medicus autem, præterquam quòd pro imperito habetur, etiam in errorem ducitur, dum se

aut de morbo non rectè iudicasse, aut non debitam medicinam administrasse suspicatur. Quare non temerè quemlibet ad huius muneris functionem admittere deberent, qui ad gubernacula rerum publicarum sedent. Verùm illi ut volent, suo fangantur officio, nos idoneum Pharmacopœum paucis delineabimus, ut ineptos & improbos à functione tam periculosa submoueamus, idoneos autem ad hoc munus capeffendum alacriores reddamus.

Principio, Latinæ linguæ non vulgariter tantùm, sed ad munditiem & proprietatem usque peritum esse oportet, ut ea quæ eruditi Medici, vel in genere, vel in specie ipsi præscribunt, rectè & exactè intelligere possit. Neque confidat se satis instructum esse, si semel vulgarem quandam viam functionis suæ, quasi artificium manuarium perdidicerit. Namquum multa quotidie noua conficiendarum medicinarum ingenia inueniantur; multa etiam veterum, obliuione sepulta, iterum in lucem eruantur, noua illi itidem quotidie discenda erunt; neque semper habere poterit aliquem, qui ea ipsi quasi per manus tradat, & ad oculum demonstret, ex eruditorum virorum descriptionibus ea ut discat necesse est. Quare si Latinæ linguæ probè peritus non fuit, fructus poporum ingeniorum, aut omninò,

aut

aut magna ex parte experts manebit.

Deinde opus est illi etiam cognitione rerum minimè vulgari, aut protrita, earum præsertim quæ propriè ad functionem eius pertinent: cuiusmodi sunt Simplicia omnia, quorum descriptiones ex præstantissimis auctoribus petitas, ad res ipsas cōferre debet, donec exactam illorū cognitionem hauriat, & prorsus imbibat. Cognita verò, visu, gustu, olfactu, tactu, & aliis debitis modis sæpe ac diligēter examinet, non solum ut falsa à veris, & adulterata à sinceris; verum etiam ut præstantissima à mediocribus, & mediocria à degeneribus discernere consuescat.

Est & alia causa cur tā diligenti examine opus sit. quædā enim alioqui grata, & salubria, ob insignē ramē acrimoniā in vasculis æreis decocta, aut instrumentis ferreis diu tractata, tam terrū ac horribile virus inde cōtrahūt, ut gustu fiāt abomināda, & quāvis valenti vētriculo intolerabilia. Quare hoc quoque scire debet, quo genere vasculorū & instrumentorū, vnaquęque medicina sit coquenda, tractāda, & conseruanda.

Hanc curam, alia quasi huic connera sequitur, scilicet, ut herbas, flores, fructus, semina, radices, debito tempore colligat, & ritè reponat, ne vel parum efficacia sint, vel putrescant, aut nimis arefacta virtutem omnem amittant.

Habeat etiam ædes salubri loco sitas, ac variis reponendis conseruãdisque accommodas. nonnulla enim humido, pleraque calido, quædam sicco, quædam etiam frigido loco rectius conseruantur: quam varietatẽ non quælibet domus præstare potest.

Facultates quoque saltem mediocres adsint oportet; in primis autem animus liberalis, ab auaritia sordibusque alienus. Diuitiæ enim hoc præstare poterunt, vt cõmodè habitet, & Medicinas, quæ emendæ sunt, suo tempore quam-optimas coëmat. Animus autem liberalis, minimeque auarus, cauebit, ne cõpendii, aut lucri sui causa, deteriores vili pretio libentiùs, quàm præstantissimas, paulo largiore cõmparet.

Iam simplicibus medicinis omnibus diligenter collectis, coëmpitis & repositis, succedit industria compositarũ ritè dispensandarum; vbi eum in primis vigilantem & circumspectum esse oportet. Nec temerè confidet ingenio suo in succedaneis eligẽdis, sed peritum Medicũ consulat: quem etiam omnino in conficiendis Opiatis, & similibus præstantibus, ac magni momenti medicinis, vt præceptorem & iudicem adhibebit: cui adiunget, si commodè fieri poterit, vnum & alterum bonum atque doctũ virum, vel Senatorii ordinis, vt eos habeat veluti testes suæ diligentiæ, industriæ ac fidei. Deinde quamque medicinam sic ritè
præpa-

præparatam, debito ac præscripto tempore fermentari sinat, antequàm eam in vsum publicum expendat.

Nec minor in eo fides requiritur in reiciendis simplicibus atq. cõpositis, quàm in iisdem reponendis & componendis. Debet enim singulis mensibus, aut sæpiùs etiam, omnia lustrare, & diligenter considerare, ut corrupta, putrida, mucosa, exoleta, & quouis modo inutilia, vel inefficacia reddita, reiciat bona fide; nec in iis quærat suũ lucrũ, quibus ægroto crearetur vitæ periculũ: sed sit, ut diximus, animo liberali & magno; cogitetq. parũ illud damnũ, fide sua iam perspecta, maioris sibi lucri causam fore.

Hæc omnia cùm indefessam diligentia & animum sibi semper præsentem requirant: hoc quoque obseruare conuenit, ne sit alex aut similibus ludis deditus, ne computationibus gaudeat, aut alioqui vinosus, vel ebriosus, neque fœdis amoribus implicatus teneatur. Alea enim negligentiam parit: ebrietas, errores, obliuionem & stuporẽ inducit: turpis verò amor, etiam veneficia illi extorquere posset.

Quare omninò, si fieri potest, maritus sit, cui cum vxore rectè conueniat; liberosque habeat, quos honestè educare studeat: huiusmodi enim pignoribus obstrictus, vagas libidines detestabitur, neq. illis fomēta sciens subministrabit: & posteritati suæ
consu-

cōsulens, bonam conscientiā servare adnitetur; nec metu, nec grātia, nec prece, nec pretio, ad vllum veneficiū impelletur.

Quòd si accesserit vera pietas, hoc est, timor Dei, & fides in Christū, charitas erga proximū, & spes futuræ vitæ, omnia erunt tutiora, illustriora & feliciora. Tamen enim cogitabit: Si cūm quid per negligētiam in vitam aut valetudinem proximi peccavero, iudiciū Dei non effugiā: quanto minùs effugiam, si sciens ac prudens venenum dederō, aborsum procuravero, aut aliquod aliud ingēs atque insigne flagitiū designavero? Et si humanitas eorū qui infirmos & ægrotos tantūm visitare solent, Christo adēdō grata est, vt illud beneficiū in seipsum collatum esse affirmet; quantò gratior erit illi mea cura & sollicitudo, dum studeo illis Medicinas rectè cōponere, tempestivè exhibere: & non propter lucrum tantūm, verū etiam humanitatis respectu operam dare, vt meliùs habeant & conualescant?

Hęc & similia si cogitabit, vltro, ac sua spōte, erit humanus, placidus, affabilis, benignus, alacris, in primis autem mitis erga pauperes, & commodus erga imperitos; nō enim in eorū ineptias, sed in necessitatem ægroti respiciet, ac Deū omnium inspectore ac iudicē prę oculis habebit: qui rectè agēti longè maiora & beatiora prēmia largietur, quàm ab vllō mortaliū persolui possint.

G O N.

17

CONFECTIO NES

AROMATICÆ.



Aromaticum Garyophyllatum, descriptionis Mesuæ.

℞. Garyophyllorum ℥ viij.
Macis Zedoariæ Galangæ
Sātali Machoziri Trochiscorū Diarhodō
Cinnamoni Ligni Aloës Spicæ Indicæ
Piperis longi Cardam. minoris ana ℥ j. *
Rosarum ℥ iiij. Glycyrrhizæ rasæ
Galliæ moschatæ veræ ana ℥ ij.
Folii [Sumatur eius loco Castæ lignea vera, aut
duplex pondus Cinnamomi.]
Eubearum ana ℥ ij. Ambræ ℥ j. *
Moschi ℥ β. Sacchati optimi.

VAL. CORDI ANNOTAT.

IN confectiōibus aromaticis ad saccharili-
bram unam, pendentem ℥ xij. accipiat℥ j. spe- *
cierum.

MYRROPIÆ accipiant in confectiōibus libram
continentem ℥ xij. & secundum hanc diuidantur *
uncia, dragma & scrupuli. Scrupulus verò pen-
dat grana electa xx. Nicolao præsertim.

GALANGÆ, id est, minoris Galangæ &
rusæ, saporis aromatici: nam affertur hodie noua
quæ-

quadam Galanga, magna crassa, foris subrufa, intus Zingiberis palliditate & filis, gustu acerrima, sine aromatica aliqua gratia: hac in nullas confectioes Galanga nomine inicienda est. Quod semel dixisse satis sit.

A **SANTALVM** Machoziri, est species citrini Santali, odoratissima, & valdè aromatica, tam gustu, quàm odore: & assertur ad nos cum Santalo albo, & citrino vulgari.

GLICYRRHIZA est dulcis radix, quam hodie usitato nomine Liquiritiam appellant.

B **FOLIUM** nondum allatum est ad nos in Germaniam; quare cum eo careamus, necesse est eius loco aliquod succedaneum accipere. Est autem eius succedaneum, ut Galenus nobis reliquit, Spica Indica, aut Casia lignea vera. Cum autem hac confectio alioquin capiat Spicam Indicam, Folii vice Casiam ligneam veram accipiendam esse censeo.

MOSCHI scribendum est: nam Musci appellatione, arborum villosa canities dicitur.

PETRI Coudenbergii Scholia.

A Santalum Machoz. est species, &c.] Santali citrini duas reperiri species, cum Cordum dicere Franciscus Alexander in suo Apolline miretur, nos easdem quoque iisdem aceruis à Lusitanis Antuerpiam aduectas interdum observauimus. Vnam nempe (Santali albi corde ad rufedinem accedente, ignavis quandoque imponitur) inter vulgarem optimam, ex pallido ruf. scentem, odoratam ac aromaticam: Alteram verò prorsus luteam,

luteam, aut quasi croco tinctam, odoratissimam, & valdè aromaticam tam gustu quàm odore, ut & Cordus ait; atque insuper unguinosam, sed eam admodum raram. De hac itaque specie cùm Cordum hîc locutum esse existimem: non ea propter tamen id ipsum quartum Santalum dici debere putamus, ut Franciscus sinistrè colligit: haud secus atque nigri Piperis species plures cùm sint, magnitudine, duritie, pondere atque acridine differentes, illorum aliquod quartum Piper esse dici non possit. Ceterùm de Santalis plura, ea-que magis indubitata, quàm à quoquam hactenus scriptitatum est, qui cupit, Garcia ab Horto de Aromatibus Indicis libellum, nuperrimè ex Lusitanico in Latinam linguam à Carolo Clusio conversum, consulat.

Folium.] Folium tribus nervis distinctum, lauri- B
no simile, quod Folii Indi nomine in officinis passim prostat, Folii in medicamentis locum non incommodè obtinere possit, dum genuinum adferatur, haberi-que abundè queat. De hoc quoque pluribus Garcia libellus.

VENTRICULUM & cor cōfortat: nauscam & vomitum sedat; & valet contra putrefactionem in partibus ventriculi. Membra verò nutritionis calefacit, ac ventositates dissolvit & carminat.

Aromaticum Rosatum Gabrielis,
descript. Mesue.

℞. Rosarum rubrarum 3 ℥.

Gly.

Glycyrrhizæ rasæ 3 vij.
 Ligni Aloës Sātali Machoziri ana 3 iij.
 Cinnamomi electi 3 v.
 Macis Garyophyllorum ana 3 ij. β.
 Gummi Arabici
 Tragacanthæ ana 3 ij. 3 ij.
 Nucis moschatæ Cardamomi
 Galangæ ana 3 j.
 Spicæ Indicæ Ambra griseæ ana 3 ij.
 Moschi 3 j. Sacchari.

CARDAMOMI, videlicet minoris: nam cum simpliciter Cardamomum scribunt auctores, minus Cardamomum, id est, usuale intelligunt.

MOSCHI, hoc est, ut vulgò dicitur corrupto vocabulo, Musci; pus illud aromaticum.

VENTRICULO imbecillo, aliisque nutritioni deseruientibus instrumentis succurrit. Ventriculi humiditatem, omnemque in eo putredinem emendat: concoctionem iuuat; & ex morbo conualescentibus auxiliatur.

Dianisum D. Mesua.

℞. Anisi electi 3 xx.
 Glycyrrhizæ rasæ Mastiches ana 3 j.
 Carei [i. Carui] Macis Galangæ Fœniculi
 Zingiberis Cinnamomi ana 3 v.
 Macropiperis Melanopiperis Leucopip.
 Calaminthæ Pyrethri
 Casia lignea veræ ana 3 ij.
 * Cardamomi minoris Garyophyllorum
 Cube-

Cubebærum Spicæ Indicæ
 Croci ana ʒ j. β. Sacchari.

MASTICHES, hoc est, ut vulgò dicitur,
Masticis.

CASIA lignea vera debet accipi, quæ nuper
 capite affertur; figura Cinnamomi, gustu aliquan-
 tulum lubrica, & Cinnamomi amula: ac non ille
 parvus cortex saporis insipidi ac styptici, ut hæte-
 nus factum est.

CRASSIs flatibus in ventriculo natis,
 eiusdemque perfriktioni succurrit. Pitui-
 tam in eo crudam absomit; tussique diu-
 turnæ potest.

Diambra D. Mesue.

℞. Cinnamomi Doronici
 Garyophyllorū Macis Nucis Moschatæ
 Folii [aut succedanei eius] Galangæ ana ʒ iij.
 Spicæ Indicæ Cardamomi maioris
 Cardamomi minoris ana ʒ j.
 Zingiberis ʒ j. β.
 Santali citrini Ligni Aloës
 Piperis longi ana ʒ ij. Ambræ ʒ j.
 Moschi ʒ β. Sacchari albißimi.

CONTRA omnem corporis imbecilli-
 tatem efficax est; omnemque corporis per-
 friktionem discutit: nativum suscitatur ca-
 lorem, & redituum recreat; refarcitque
 eos qui frigido torquentur humore. Iuvat
 articulos, & membris omnibus miri-
 ficè

ficè subuenit. Venterculum fastidientem, quique cibum continere non potest, roborat : & inappetentiam cibi summè corrigi. Coripsum roborat.

A *Diathamaron D. Nicolai.*

R. Anthophyllorum

Zingiberis ana ʒ v. ʒ j. ʒ xvj.

Cinnamomi

Garyophyll. ana ʒ iiij. ʒ j. ʒ iiij.

Carnium dactylorum ʒ iiij. ʒ. ʒ viij.

* Galangæ Spicæ Indicæ Zedoariæ

Costi Pyrethri Coralli rubri

B Rheupontici [accipiatur eius pauciora Rha-

* barbarum sic vocatum]

Saliuncæ Tragacanthæ Anacardii

Ossium dactylorū Carpobalsami Anisi

* Baccarum Iuniperi ana ʒ ij. ʒ ij. ʒ viij.

Leucopiperis

* Macropiperis ana ʒ j. ʒ j. ʒ ij.

Limaturæ auri puri

Limaturæ argenti meri

* Ossium è corde cerui ana ʒ ij. ʒ. ʒ vj.

Rasuræ Eboris Moschi ana ʒ j. ʒ viij.

Ambra ʒ j. Sacchari.

THAMAR Arabibus dactylum, palma arboris fructum significat ; unde confectiōni nomen

* Diathamaron : corruptè Diacamaron.

ANTHOPHYLLI sunt grandes Garyophylli, qui ad maturitatem perueniunt, nucleo intus

intus duro bifidoque; sapore non tam acres ut Garyophylli, præterquam in superficie.

COSTI, videlicet albi, feruidum & aromaticum saporem habentis. Non vulgaris illius grandis, qui teterrimum & rancidum saporem habet, & adulterinus est, atque ex Helueticorum alpibus & Italia ad nos affertur.

CARPOBALSAMI. Non habentur Opobalsamum, Carpobalsamum, & Xylobalsamum, secundum eorum veram descriptionem: verum cum experientia didicerimus, quod olea Cinnamomi & Garyophyllorum secundum nostram artem distillandi, veteribus ignotam, parata, in probis Balsami veri, & virtutibus similia sine (quare etiam pro Opobalsamo, oleum Garyophyllorum in Theriacam nostram accepimus:) non inconsultum esset, si quis pro Carpobalsamo acciperet Cubebas, aut Caryophylla, siue etiam Cardamomum, aut aliud semen, quod haberet mordacitatem in gustu, cum quadam redolentia, secundum Carpobalsami descriptionem, si horum nulum antea esset in descriptione.

SALIUNCA Germanicum est vocabulum, quo significatur Spica Celtica vera, quam in Pharmacopoliis Spicam Romanam, appellant. Sed in Nicolao Alexandrino Græco, inuenitur loco Saliunca Eleisphacum, id est, Salvia, præsertim in Aurea Alexandrina.

LIMATURA auri & argenti. Cum aurum sit metallicum & valde ponderosum corpus, limatura eius vel scobs semper fundum petit, nec
aqua-

*aqualiter confectiōibus commiscetur : quare hic,
& reliquis omnibus locis, sumantur folia auri.*

P. C. SCHOL.

- A Pondera apud Cordum hacce in compositione depravatissima restitui : sed non veluti L. Fuchs ex suo Myrepso vult, hocce in medicamento, innumerisq̃ue aliis corruptissimo.
- B Corallium album, quod à Cordo perperam appositum erat, deleui.

EFFICACITER prodest difficulter spirantibus, arteriacis, tussientibus, tabidis & omni thoracis & stomachi offensione : Aquæ subter cutem fusæ, renum doloribus. Voluptatem parit, corpora q̃ue saginat.

Diacalaminthon D. Mesuæ.

℞. Calaminthæ montanæ

Calaminthæ campestris Seselios

Petroselinī Macedonici ana 3 vj.

Zingiberis 3 iij.

Seminis Apii

Comarum Thymi ana 3 ij.

Ligustici 3 vj.

Piperis 3 xij. Sacchari albiſſimi.

CALAMINTHA montana nascitur copiosissimè in montibus circa Confluentiam urbem, ad Rheni & Mosella confluentes.

CALAMINTHA campestris, hoc est, usualis *Calamintha*, quæ in arvis nascitur (Mesue fluviatilem requirit:) hæc enim efficacior est, quàm in humidis locis nata. Germanicè *Koraminutz* vocatur.

SESELIOS, id est *Siselios*, quod etiam *Siler montanum* vocatur.

COMARVM *Tkymi*, id est, summitatum foliorum, & florum *Thymi*.

PETROSELINVM *Macedonicum* non est *Olusatrum*, vel, ut corruptè pronuntiant, *Olixatrum*, aut *Alexandrum*; semine oblongo, magno, nigro, amaro, ac *Myrrham* emulante sapore. Sed quia iam vero *Macedonico* *Petroselino* caremus, licet nobis eius loco *Olusatri* semen accipere (quod vulgò in *Pharmacopoliis* *Petroselinum Macedonicum*, falsò tamen, appellatur;) donec aliquando verum nobis contingat.

PIPERIS, id est, *Piperis nigri*: nam cum *Piper* simpliciter pronunciamus, semper nigrum intelligimus.

AUXILIATUR iis quos cibi fastidiũ urget, appetentiam reuocans: agrè quoque spirantibus, ventriculo refrigerationem sentienti, & flatibus distento, confert.

*Diacalaminthon Galeni, Sanitatis
tuendæ lib. 4.*

℞. Calaminthæ	Pulegii	Petroselini
Seselios	ana	℥ j.
		B
		Apti

Apii * Cacuminum Thymi ana \mathfrak{z} ij.
 Ligustici seminis \mathfrak{z} viij.
 Piperis \mathfrak{z} xxiiij. Sacchari.

CRASSA ac lenta attenuat & discutit : vrinas mouet, ac mulieribus menses.

Diacuminum D. Nicolai.

&. Cumini præparati [*id est, pridie in aceto infusi, & iterum exiccati*] \mathfrak{z} viij.
 (*id est, \mathfrak{z} j.*) Θ j.

Cinnamomi

A Garyophyllorum ana \mathfrak{z} ij. β .

Melanopiperis

Zingiberis ana \mathfrak{z} ij. $\ddot{\text{G}}$ v.

Galangæ

Thymbræ [*eius loco sume Satureiam*]

Calaminthæ ana \mathfrak{z} j. Θ ij.

Ammios

Ligustici ana \mathfrak{z} j. $\ddot{\text{G}}$ xviiij.

Macropiperis \mathfrak{z} j.

Spicæ Indicæ Cardamomi

Nucis Moschatæ ana Θ ij. β .

Sacchari.

THYMBRA est propriè Satureia siluestris, circa quam nascitur Cuscuta Epithymo similis, quæ Epithymbrum appellatur. Afferitur iam ad nos ex Orientalibus partibus; vorum rarò : ideòque in defectu eius satiuam Thymbram, hoc est, Satureiam accipere nobis licet.

Ana ꝓ ij. β.] *Cacutit Fuchsius*, ꝓ ij. ꝓ ꝓ.
ex *Pseudomyrriso* suo legendum existimans.

ARTERIACIS, difficultati spirandi,
tussiculosis, inflationibus efficaci est adiu-
mento. Noxam ventriculi corrigit, conco-
ctionem iuuat, adstrictionum vitia sanat.

Diacinnamomum Mesue.

R. Cinnamomi tenuis ꝓ xv. A

Cinnamomi crassi boni

Enulæ ana ꝓ iij. B

Galangæ ꝓ vij.

Garyophyllorum Piperis longi

Cardamomi maioris Cardamomi mi-

Zingiberis Macis (noris

Nucis moschatae

Ligni Aloës ana ꝓ ij. Croci ꝓ j. *

Sacchari tabarzeth ꝓ v.

Sacchari albi limi.

SACCHARI tabarzeth, id est, purissimi
atque optimi Sacchari, cuius ꝓ v. miscentur
speciebus: idq; ideò hoc loco accipitur, ut spe-
cies eò melius conseruentur ad usum. Vltimum
Saccharum additur, cum vis rotulas facere
ex speciebus.

Cinnamomi tenuis, Cinnamomi crassi.] A

Per Darseni, vel potius Darchini, lignum Chi-
nense, cui lignum odoratum, hoc est, China-

B 2 momum,

momum, tanquam *Chinamomum*, siue *Cinamomum* intelligunt Perse atque scriptores Arabes; cortices quandoque ligna appellantes, ut *Xylocinamomum* Græci. Quod interim crassi corticis est, *Cinnamum* vocant. Per Darseni *Cinami* igitur, *Cinnamomum* crassi corticis, tanquam ligneum significare volunt: est enim & in genere crassioris *Cinamomi*, quod & valdè bonum est, hoc est, acre, odoratum ac aromaticum. Nec caret hæc Mesuæ mens, ubi crassum *Cinamomum* requirit, suis rationibus: quas perpendat Francisci Alexandri Apollo oportet. Itaque *Cinnamomum* tenuis corticis electum, per se, aequè atque per Darseni *Cinami*, crassi corticis *Cinamomum* bonum, distinctum cum *Cordo* hîc interpretandum, intelligendum atque legendum existimo: utrumque tanquam in suo genere optimum. De *Cinnamomo* autem & *Cassia*, García de Aromatibus librum quem dixi, consule: ubi doctissimorum etiam hætenus virorum de hisce rebus altercationes, aniles, prorsusque futiles esse animadvertes.

B *Cyminum*, à *Cordo* huic medicamento temerè impositum, hortante & id quoque Euchsio, Monachis id priùs monstrantibus, expunxi.

EST medicina salubris ad humorositatem ventriculi, & putrefactionem in eo. Phlegma digerit, & digestionem adiuquat.

Dian-

Dianthos D. Nicolai.

℞. Florum Rorismarini ℥ j.
 Violarum Rosarum
 Glycyrrhizæ ana ℥ vj.
 Caryophyllorum Spicæ Indicæ
 Nucis moschatæ
 Galangæ Cinnamomi
 Zingiberis Zedoariæ
 Macis Ligni Aloës
 Cardamomi Anisi
 Anethi [*videlicet seminis*] ana ℥ iiij.
 Sacchari.

PRODEST præter rationem tribulatis, cardiacis : animi lætitiā auget. Eos roborat qui à longo morbo debiles adhuc sese recolligunt. Ventriculū perpulchrè emendat.

Diamargariton frigidum
D. Nicolai.

℞. Nucleorum sem. Citrulli
 Cucurbitæ Melonis Cucumeris
 Seminis Portulacæ
 Papaveris albi
 Santali albi
 Santali moschatellini [*id est, Citrini, boni odoris*]
 Ligni Aloës Zingiberis
 B 3 Rosa-

30 CONFECTIOES

Rosarum rubrarum

Florum Nymphaeæ albæ [id est, Nenupharis]

Florum Boraginis

Myrtillorum verorum ana ʒ j.

Corallii albi

Corallii rubri ana ʒ β-

Margaritarum ʒ iiij.

Sacchari.

NVCLEVS seminum, est ipsa in medio seminum medulla. Sunt autem eximendi horum seminum nuclei, cum iam preparanda est confectio hæc, aut alia, quæ durare debent: nam diu antè exempti rancidi fiunt.

OMNEM virium imbecillitatem firmat: iis quos animus deficit, siue à corde siue à stomacho deliquium originem ducat, omnem noxæ causam vitalium partium discutit. Insuper asthmaticis, tussientibus, tabidis auxiliatur. Longo morbo deiectos, & imbecillitate languentes recreat, & ad pristinum robur conducit.

Diamargariton calidum

D. Auicennæ.

R. Margaritarum non perforatarum

Pyrethri ana ʒ j. Zingiberis

A Mastiches ana ʒ iiij.

B Zedoariæ Doronici

* Seminis Apii Casia

Carda-

Cardamomi	Nucis moschatae			C
Macis	Cinnami	ana 3	ij.	*
Been albi	Been rubei			D
Piperis				*
Macropiperis	ana 5	iiij.		
Cinnamomi	3	v.		
Sacchari.				

P. C. SCHOL.

Zedoaria.] *Auicenne exemplaria editionis penultima, Zyrumbet; postrema autem, à Valgriso inquam exhibita, Zedoaria legunt, ut hinc vocum harum & rerum vicinitatem atque ambiguitatem (de quibus à plerisque concertatur) tibi expendendam nunc relinquam.*

Doronici] *L. Fuchsius Doronicum hic expungit, quod tamen omnia Auicenna exemplaria aptissimè etiam recipiunt.*

Cassia.] *Cùm Cordus huius leco rad. Capsia possimè haberet, correctiora Auicenna exemplaria Seitaragi legunt, nonnulla Capsia, quod non nisi Cassia est. Nam ineptiores Itali etiam Cassiam addita p ante s Capsiam scribere solent. Seitaragi autem cùm plura significata habeat, littera unius forsitan aut carentia, aut mutatione (ut in plurimis dictionibus usu venit) quandoque Lepidium designat, quandoque Cassiam: quam hic intelligendam, commodissimèque indendam dico. Quare Francisci Alexandri Apollini stupidam pertinaciam,*

*Fuckſio etiam mihi aſtipulante, demiror, Ta-
pſiam hîc (medicamento huic aded iniquam)
ſumendam eſſe mordicus defendentis. Interim
non tantùm quomodo C in T mutata, ſed
Radiciſ vox accedere quî potuerit, forſan ex-
clamabitur: verùm Laconis habeo hîc mihi im-
perantes.*

D Cinnami.] *Hæc voce Cordus carebat æquè
atque Been albi. In Auicenna Cherſe legitur,
quod Cinnamum interpretantur.*

VALET mulieribus: rectificat enim
diſpoſitionem matriciſ, & ventriculorum
earum.

Diamoſchum dulce, D. Meſua.

R. Croci Doronici
Zedoariæ Ligni Aloës

Maciſ ana ʒ ij.

* Margaritarum albarum Serici crudi roſti
Charabæ [*id eſt, Succini*]

* Corallii rubri ana ʒ ij. β.
Galliæ moſchata veræ

* Ocimi citrati ana ʒ j. β.

Been albi Been rubri

Folii [*aut ſuccedanei eiſ*] Spicæ Indicæ

Garyophyllorum ana ʒ j.

Zingiberiſ Cubebarum

Piperiſ longi ana ʒ j. β.

Moſchi ʒ ij.

Sacchari albi.

O C I M V M citratum non est Melissa, sed species quadam Ocimi siue Basilici, odore Melisse aut Citrei mali: cuius defectu, garyophyllatum Ocimum sumi potest.

PRODEST contra cordis palpitacionem: ei quoque cui tumultuosa insomnia obuersantur, item iis qui incertis timoribus corripuntur. Malis cerebri frigidis, vertigini, comitialibus, & difficulter spirantibus succurrit.

Diamoschum amarum, D. Mesue.

R. Croci	Doronici		
Zedoariæ	Ligni Aloës		
Macis	ana	ʒ	ij. *
Margaritarum albarum			
Serici crudi tosti	Charabæ		A
Corallii rubri	ana	ʒ	ij. β. *
Galliæ moschataæ veræ			
Ocimi citrati	ana	ʒ	j. β.
Been albi	Been rubri		
Folii [aut succedanei eius]			
Spicæ Indicæ			
Garyophyllorum	ana	ʒ	j.
Zingiberis	Cubebarum		
Piperis longi	ana	ʒ	i. β.
Moschi	ʒ	ij.	
Absinthii			
Rosarum	ana	ʒ	iiij. *
Aloës lotæ		ʒ	iiij. *
	B	ʒ	Casto.

Castorei

Ligustici ana ʒ j.

Cinnamomi ʒ ij. ʒ.

Sacchari.

- SERICVM crudum tostum significat Serice tombycis vellus, nullo colore tinctum, nulliū humoris aut succo qui tingendo sit, incoctum: sed tale quale natura est, fictilique inditum, ac donec conteri possit tostum aut assatum: vulgò dicitur Sericum vstum; quamvis comburi non debeat, sed torreretur aut assari tantum.

P. C. SCHOL.

- Setam pro Serico Cordus undique barbarè legebat.

Hæc confectio valentior est ad ea quæ suprâ dicta sunt: & propriè ad exiccandum humiditates ventriculi, & putrefactiones eius.

Diagalanga D. Mesue.

A ʒ. Galangæ

Ligni Aloës ana ʒ vj.

Garyphyllorum Macis

Ligustici ana ʒ ij.

Zingiberis Macropiperis

Leucopiperis Calami aromatici

Cinnamomi ana ʒ j. ʒ.

Calaminthæ siccæ Menthæ siccæ

Carda.

Cardamomi maioris

Spicæ Indicæ Seminis Apii

Seminis Fœniculi Seminis Anisi

Seminis Carui ana ʒ j.

Sacchari albiſſimi.

P. C. S C H O L.

ʒ vj. } *Legendum eſſe ʒ. vj. Fuchſius rectè
monet, non ʒ viij ut Cordus malè habebat.*

V A L E T aduerſus craſſiores flatuſ, aci-
doſ ruſtuſ, prauamq̃ue concoctionem:
item actioneſ ventriculi & iecoriſ à frigi-
ditate impeditaſ, robuſtiores reddit, eaſ-
demq̃ue emendat.

Diapenidion D. Nicolai.

ʒ. Penidiarum ʒ ij. *

Pinearum

Amygdalorum dulcium

Papaueriſ albi ana ʒ iiij. ʒ j. A

Cinnamomi

Garyophyllorum

Zingiberiſ Succi Glycyrrhiæ

Tragacanthæ Gummi Arabici.

Amyli candidiſſimi

Seminis enucleati Gucurbitæ

Citrulli

Cucumeriſ

Meloniſ ana ʒ j. ʒ ij. *

Camphoræ ʒ ʒ.

B 6

Sacchari

36 CONFECTIOES
Sacchari albissimi.

AMYLV M hodie corrupto vocabulo dicitur Amydum.

P. C. SCHOL.

A Deleui Amygd. amaras, quas Cordus peperam addiderat.

V A L E T aduersus omnem thoracis noxam, tussim à frigore contractam, vocis iacturam : tabidis denique & purulenta exscreantibus succurrit.

Diairis simplex.

R̄. Ircos ℥ β. Sacchari candi
Specierum diatragacanthi frigidi ana ʒ ij.
Sacchari albissimi.

* P O T E S T ferè eadem quod sequens, licet imbecillius.

Diairis Salomonis, ex Nicolao.

R̄. Iridis ℥ j.
Pulegii Hyssopi
Glycyrrhizæ ana ʒ vj.

* Tragachanthæ
Amygdalorum Pinæarum
Cinnamomi Zingiberis
Piperis ana ℥ iij.
Caricarum Passularum enucleatarum
Car-

Carnium dactylorum ana ℥ iiij. β.
 Styracis calamitæ rubæ | *potius rufa, legit*
 p. c.] ℥ ij. ʒ j.
 Sacchari albissimi.

Tussiculosis, difficulter spirantibus auxi-
 liatur: abscissæ vocis iacturam refarcit,
 quæ refrigeratione contracta sit.

Diatrágacanthum frigidum,
D. Nicolai.

℞. Tragacanthæ albissimæ ℥ ij.
 Gummi Arabici ℥ j. ʒ ij.
 Amyli ℥ β.
 Glycyrrhizæ
 Nucleorum seminum Cucurbitæ
 Cucumeris
 Citrulli
 Melonis ana ℥ ij.
 Camphoræ ʒ β.
 Penidiarum ℥ iiij.
 Sacchari albissimi.

Medetur omnibus pulmonum & tho-
 racis vitiis aridis, maximè tabidis, macie
 confectis: Inflammatione lateris laboran-
 tibus, omnibusque tussibus calidis & sic-
 cis, exasperationi linguæ & faucium.
 Deuoratum tamdiu ægrotans in ore con-
 tineat, quoad liquefactum perfectè exu-
 gatur.

Diatragacanthum calidum
D. Nicolai.

- * R. Gummi Tragacanthæ ℥ iiij.
 * Hyssopi Pineorum nucleorum
 Amygdalorum amborum purgatorum
 Seminis Linii ana ℥ vj. Sem. Fœnigræci
 Cinnamomi ana ℥ β.
 Glycyrrhizæ rasæ Succī Glycyrrhizę
 Zingiberis ana ℥ ij.
 Sacchari albi.

Valet tussientibus ex frigido phlegmate, & non valentibus eicere; asthmaticis, empyicis, anhelosis, suspiriosis, peripneumonicis, phthisicis, & ad omnem coarctationem pectoris: stomachum confortat, digestionem procurat.

Manus Christi perlata.

- R. Sacchari clarificati ℥ j.
 Aquæ Rosarum ℥ β.

Concoquantur dum aqua rosacea igni evanescat, & saccharum iustam crassitiem consequatur. In fine margaritarum minutissimè tritarum ℥ β. addatur, atque super marmor aqua rosacea inspersum infundatur, & fiant rotulæ.

P. C. S C H O L.

Quantis cachinnis Cordus, & tanquato
caci

caci caco dute Fuchs. Colonienses medici, ac Francisci Alex. Apollo, vel pueris Pharmacopœorum, hoc scripto sese deridendos exhibuerint, vix exprimi possit: ut hinc non tractari à fabris fabrilis, lucidè cerni queat. Eo pacto quòd huiusmodi imaginariis, extraq; arcam Medicorum quorundam scriptionibus, nullam debitam miscendi conficiendiq; rationem, ut neque modum; & ex consequenti parum aut nihil artis sue frugis, operisq; manuarii commodi, haurire discere possint Pharmacopœi: nō margaritas, oleum & operam omnem frequentissimè perdere, ac viziatas materias porcis obicere velint.

MEDETVR deiectis viribus, ardentibus febribus; & inaginationes falsas abolet.

Diabyssopum D. Nicolii.

℞. Hyssopi Ireos Thymi
 Melanopiperis ana ʒ xxx.
 Pulegii
 Thymbrae [*eius loco sume Satureiam*]
 Rutæ Cumini ana ʒ xx.
 Carnium dactylorum
 Tragacanthæ Glycyrrhizę
 Caricarum pinguium Passularum nuc-
 cleatarum
 Fœniculi ana ʒ x.
 Zingiberis Sem. Anisi
 Carui

Carui

Ligustici ana ʒ v.

Sacchari.

Accommodatum est ad capitis querelam ex frigido : vnam exiccat , arterias purgat , tussim compescit , omnes frigiditates pectoris & stomachi emendat ; digestionem procurat ; pleuriticis & empyicis mirabiliter opitulatur.

Diacostum D. Mesue.

R. Costi candidi , aromatici , amari
 Casia lignea veræ Cinnamomi ana ʒ v.
 Seminis Apii Seminis Anisi
 Schœnanthi
 Rhabarbari ana ʒ iiij.
 Asari ʒ iiij.
 Croci Aristolochiæ
 Myrrhæ ana ʒ ij.
 Sacchari.

SCHŒNANTHI. Hodie corrupto nomine dicunt Squinanthum.

COSTI AMARI. Cæpit hisce annis afferri loco veri Costi adulterinus quidam : qui nequaquam accipiendus est , ut supra dictum est , sed candidus , amarus & aromaticus.

ASARI , id est , radicem eius. sola enim radices ad medicinam accipi debent.

VALET ad dolorē viscerum & oppilationem in eis , & ad principium hydropisis.

Dia-

*Diarhodon Abbatis,
ex Nicolao.*

℞. Santali albi
 Santali rubri ana ʒ ij. β.
 Tragacanthæ
 Gummi Arabici
 Spodii ana ʒ ij.
 Asari Mastiches
 Spicæ Indicæ Cardamomi
 Succi Glycyrrhizæ Croci
 Xyloaloës [*id est, Ligni Aloës*]
 Garyophyllorum
 Galliæ moschatę Nicolai *
 Anisi Fœniculi
 Cinnamomi Rhabarbari
 Seminis Ocimi
 Berberis [*id est, acinorum eius*] A
 Seminis Scariolæ Seminis Portulacæ B
 Nucleorum seminis Cucurbitæ
 Citrulli Cucumeris Melonis
 Seminis Papaveris albi ana ʒ j.
 Margaritarum
 Ossis è corde cerui ana ʒ β.
 Sacchari Candi [*ut eò melius species conser-*
 uentur]
 Rosarum ana ʒ j. ʒ iiij.
 Camphoræ ʒ viij.
 Moschi ʒ iiij. β.
 Sacchari albißimi.

S C A.

B SCARIOLA propriè est Endivia illa vulgaris, quæ in dorso foliorum est spinosa. Quid autem vera sit Endivia, ubi locus postulaverit, dicemus.

P. C. SCHOL.

A Berberis.] acini sunt hic fructus Berberis integri.

B Scariola.] Cordum non novisse Scariolam, hoc nomine vulgarem admodum plantam, monente Græd Francisco Alex. satis liquet; ex eo quòd in Foliorum dorso eam spinosam faciat, ut Senchum pra oculis habuisse videatur.

VALET aduersus ventriculi calorem, iccinoris, lienis, pulmonumque: contra viscerum dolores, & omnem totius corporis noxam à calore proficiscentem.

Dialacca maior, D. Mesuæ.

℞. Laccæ præparatæ [eius præparatio in fine habebitur]

Rhabarbari ana 3 iiij.

Spicæ Indicæ

Massiches Apii

Coliculorum Schœnanthi Absinthii

Succi Eupatorii Mesuæ

Ammios Sabinæ

Amygdalorum amarorum

Costi Myrrhæ

Robiæ tinctorum Fœniculi

Anisi

Anisi Asari
 Aristolochiæ rotundæ veræ A
 Gentianæ Croci
 Cinnamomi Hyssopi
 Casie lignæ veræ Summitatū Schœnanthi
 Bdellii ana ʒ j. ʒ.
 Piperis
 Zingiberis ana ʒ j.
 Sacchari albiſſimi.

COLICVLO RVM Schœnanthi.] *Herba hæc aromatica à Græcis dicitur Σχοίνον, id est, Schœnus, & significat luncum aromaticum, qui hætenus improprie dictus est Squinantium. Nam Schœnanthum siue Σχοίνον ἄνθος, significat Iunci huius aromatici florem, qui non offertur ad nos. In hanc autem compositionem ingreditur bis Schœnanthum; hoc quidem loco coliculi aut stipites eius, inferius verò summitates eiusdem.*

SYMMITATVM Schœnanthi, id est, florum eius: nam flores in summitate huius herbe constituti sunt, & proprie Schœnanthum appellantur: sed quia flores non ad nos feruntur, cogimur tenerrimas eius partes in cacumine decerptas, eorum vice medicamentis miscere.

SUCCI Eupatorii.] *Hic succus non debet fieri ex vulgari Eupatorio, neque ex Eupatorio Græcorum, id est, Agrimonia falsò hodie vocata, sed ex Eupatorio quod Mesue describit. Est autem Eupatorium Mesue ea herba,*
qua

qua ab Italis dicitur *Gratia Dei*, siue *Gratiola*; cuius magnus est pronuntius *Wittemberga* in pratis ad *Albim* fluvium sitis.

P. C. SCHOL.

A *Aristolochiam longam*, erroneè in contextum à *Cordo intrusam*, deleni.

B *Succi Eupatorii.*] *Gratiola vocata*, purgatoria herba, foliis *Hyssopi*, *Eupatorium Mesua* haud dubio, ut & *L. Fuchsius*, *Matthiolus*, ac *Franciscus Alex.* rectè monent, esse non potest. Satius igitur erit, *Ageratum Dioscoridis*, quod & hodie *Eupatorii Mesues* nomen obtinuit, in eius locum substitui, donec melius doceatur.

VALET aduersus frigus ventriculi: obstructions. inflationes iecinoris, & renum duritias sanat. aquæ inter cutem causas omnes discutit. menses ciet: flatuosos spiritus ab alto corpore abigit.

Diacurcuma, id est, *Διὰ Κεόρυ*
maior, *D. Mesua*.

℞. *Croci* ℞ *Asari*

Petroselini Macedonici

Dauci ℞ *Anisi*

Apii ana ℥ iiij.

Rhabarbari ℞ *Meu*

Spicæ Indicæ ana ℥ vj.

Costi ℞ *Myrrhæ*

Cassia

Casiæ lignæ veræ Schœnanthi
 Carpobalsami [*aut aliquod succedaneum, ut
 superius significatum est*]
 Rubiæ tinctorum
 Succī Absinthii
 Succī Eupatorii Mesuæ [*i. Gratiolæ*]
 Opobalsami [*aut aliquod succedaneum, sine
 oleum Caryophyllorum, aut aliud crassum
 odoriferum oleum*] ana ℥ ij.
 Calami aromatici
 Cinnamomi ana ℥ j. β.
 Scordii [*videlicet veri*]
 Scolopendriæ [*Ceterach intellige*]
 Succī Glycyrrhizæ ana ℥ ij. β.
 Tragacanthæ ℥ j.
 Sacchari albissimi.

Confert ad ægritudines antiquas, & ca-
 chexiam : & ad hydropisim iuuamentum
 est manifestum, & eradicat ægritudines
 hepatis & lienis chronicas, quæ iam in-
 duratæ sunt : & confert ad corruptio-
 nem stomachi, & humiditatem frigi-
 dam, & ventositates grossas in eis, &
 ad dolorem renum & vesicæ; & urinam
 prouocat.

Diaprasium D. Nicolai.

R. Prassii ℥ v. β.
 Tragacanthæ Pinearum mundatarum
 Amygdalorum dulcium

Pista-

Pistaciorum	Carnium dactylorum
Caricarum pinguium	
Passularum enucleatarum	ana ℥ iiij. β.
Cinnamomi	
Garyophyllorum	
Nucis Moschatæ	
Macis	Ligni Aloës
Galangæ	Spicæ Indicæ
Zingiberis	Zedoariæ
Glycyrrhizæ	Rhapontici
Anacardii	Styracis calamitæ
Galbani	Terebinthinæ
Mastiches	Myrrhæ
Ircos	Aristotolichæ rotundæ
Corticum radicum Capparis	
Gentianæ	Melanopiperis
Anisi	Fœniculi
Anethi	Apii
Petroselinæ Macedonici	
Saxifragiæ	ana ℥ ij.
Hermodactylorum	
Origani	Peucedani
Schœnanthi	Cardamomi
Leucopiperis	
Carui	Ligustici
* Vincetoxici	ana ℥ j. β. ̄ j. β.
Balsamitæ	Pulegii
Dictamni Cretici	
Costi	Pyrethri
Thymbre	Basiliconis
Præopiæ	[videlicet radicis eius aut seminis]
	Macro-

Macropiperis Amomi Sinoni
 Orobi veri ana ꝑ j. ꝑ ij. ꝑ.
 Xylobalsami [*aut succedaneum aliquod si-*
mile descriptioni Xylobalsami]
 Casiæ fistulæ
 Corallii rubri Rasuræ Eboris
 Carpobalsami [*aut aliquod succedaneum, ut*
suprà]
 Dauci Cretici ana ꝑ ꝑ.
 Moschi Ambræ
 Ossis è corde cerui ana ꝑ xiiij.
 Sacchari albissimi.

SAXIFRAGIA in Italia dicitur ea her-
 ba, quam in Germania Pimpinellam vocamus.
 Itali habent diuersam Pimpinellam.

BALSAMITÆ.] Nicolaus Alexandri-
 nus Latinè impressus, non Balsamitam ha-
 bet, sed Balsamum: significat tamen Balsami
 vox, nonnunquam etiam Mentham; cuius spe-
 cies est Balsamita, hoc loco recipienda: nam si
 Balsami liquorem intellexisset Nicolaus, non
 simpliciter Balsamum, sed Opobalsamum po-
 suisset.

S I N O N Y M, secundum Matthæum
 Syluaticum, est Petroselinum agreste. Sed de
 eo infra in annotationibus Auræ Alexan-
 drina.

C A S I Æ fistula nomine hoc loco nequa-
 quam debet intelligi Casia fistula, cuius nigra
 medulla bilem per aluum purgat; sed Casia li-
 gnea aromatica, quæ Cinnamomo similis est:
 nam

*nam hæc etiam apud probatos veteres auctores
Casia fistula vocatur.*

- B DAUCUS Creticus hodie ignotus est:
ideò possumus eius loco Seseli Creticum accipe-
re, id est, Berwurtz, aromaticam herbam,
foliis Fœniculi, sed multò minoribus.

P. C. SCHOL.

- A Balsamitæ.] Cùm Nicolai codex, ut &
Cordus fateatur, Balsami legat; eo non herba
Balsamita vocata, neque cum Fuchsio Bal-
sami veri folia, sed oleum seu succus veri Bal-
sami, Opobalsamumve hîc intelligendum esse
existimo.

- B Daucus Creticus.] Berwurtz Germanis
vocata herba, seu Fœniculus porcinus Belgis,
non est Seseli Creticum, ut neque Daucus
Creticus, sed potius Meum Diosc. aut illi
proximum. Daucus autem Creticus verus,
Diosc. delineationi ad amussim conveniens,
semine acri, albo, hirsuto, oblongo, nu-
perrimè cognosci cœpit: virêque in hortu-
lo hodie, inter plurimas raras plantas, no-
stro.

Sanat capitis vertigines, oculorum ca-
ligines abstergit, palatum & arterias pur-
gat, distillationem vuæ astringit, dentium
dolorê mitigat. Asthmaticis & suspiriosis
peculiariter opitulatur; pectoris & pulmo-
nis causas facilè amputat. Stomachi & he-
patis dolores & debilitates sedat, splene-
tico-

ticorum & pleuriticorum angustias para-
gorisat: omnium interaneorum vitiis pro-
dest: inflationes & torsiones ab eis aufert.
Nephriticos, calculosos, stranguriosos &
colicos purgat, & dolorem releuat. Sæpius
autem sumptum, colorem pallidum emen-
dat, menses deducit, & in ordinem debi-
tum redigit. Typos quotidianarios &
quartanarios reprimit. Qui autem hoc ele-
ctuario vsus fuerit, à multis conseruabitur
morbis.

Diatrion santalon D. Nicolai.

R. Santali albi Santali rubri
Santali citrini Rosarum
Sacchari ana ʒ iiij.
Rhabarbari Spodii
Succi Glycyrrhizæ
Seminis Portulacæ ana ʒ ij. ʒ β. ʒ v.
Amyli Gummi Arabici
Tragacanthæ
Nucleorum seminis Melonis
Cucumeris Cucurbitæ Citrulli
Seminis Scariolæ ana ʒ j. β.
Camphoræ ʒ j.
Sacchari albißimi.

SCARIOLA est *Endivia vulgaris*, cuius folia in dorso habent spinulas, ut dictum est supra in *Diarrhodon Abbatis*.

Pollet aduersus iecinoris & ventriculi
• C calo-

calorem mirum in modum : tabidis & re-
gio morbo correptis itidem prodest.

Diaxyloaloës D. Mesua.

℞. Ligni Aloës crudi
Rosarum ana ℥ j.
Garyophyllorum Spicæ Indicæ
Macis Nucis moschatæ
Galliæ moschatæ Mesuæ Cubebarum
Cardamomi maioris
Cardamomi minoris
* Mastiches
Cinnamomi
Cyperī Schœnanthi
Zedoariæ Been albi
Been rubri
Folii [*aut Macis siue Spica Nardi*]
Serici crudi Margaritarum
Corallii rubri Charabæ
Foliorum Citrei mali
Corticum Citrei mali
Ocimi garyophyllati
Stsymbrii Menthæ siccæ
Sampsuchi [*id est, Maiorane*]
Piperis longi
Zingiberis ana ℥ iiij.
Moschi boni ℥ j.
Ambrę ℥ j. β.
Sacchari albißimi.

CYPERI, videlicet Cyperi rotundi: nam
rotunda

A R O M A T I C A E, S I

rotunda radices Cyperi propriè & simpliciter ab auctoribus Cyperi vocantur. Longis verò radicibus Cyperus, vocatur ab iisdem Cyperis. Quoniam verò non semper rotundum habere licet, necesse est in penuria eius, longo vii.

S I S Y M B R I V M est mentha aquatica, nigricantibus, ut purpura, caulibus.

P R O D E S T malis ventriculi, cordis & iecinoris frigidis, animæ defectioni, concoctionique. Oris fœtorem abigit, latitiamque parit.

Diatrion pipereon Mesua.

℞. Macropiperis Melanopiperis
 Leucopiperis ana ʒ v.
 Zingiberis Thymi
 Anisi ana ʒ ij.
 Spicæ Indicæ Animios
 Amomi [quod non habetur, & loco eius capiatur Carpesium sine Cubeba, aut Calamus aromaticus officinarum, qui pro vero Acoro habetur]
 Cinnamomi ana ʒ j.
 Casie lignæ Seminis Apii
 Seselios
 Asari
 Enulæ siccæ ana ʒ ʒ.
 Sacchari albissimi.

Refrigerato ventriculo, & acido ructui, quartanis, exolutis, iecinorosis, & inflationibus auxiliatur. Item tussientibus.

Diazingiber D. Nicolai.

℞. Zingiberis Galangæ
 Caryophyllorum Cinnamomi
 Nucis moschatæ Granorum paradisi
 Piperis longi Macis
 Cardamomi Spicæ Indicæ
 Rhabarbari Rosarum rubrarum ana ḡ xv.
 Pinearum mundatarum ℥ β.
 Phisticorum [*id est, Pistaciorum*] ℥ ij.
 Anisi Fœniculi
 Glycyrrhizæ rasæ Croci ana ℥ β.
 Sacchari albißimi.

℞. Ventericulum roborat & firmat.

Electuarium Ducis, D. Nicolai.

℞. Anisi ℥ ij. ḡ xv.
 Glycyrrhizæ
 Mastiches ana ḡ ij. ḡ v.
 Cinnamomi
 Chamædryos Zingiberis
 Galangæ Fœniculi
 Carui ana ḡ j. ḡ xv.
 Xylocassæ Calaminthæ
 Dauci Pyrethri
 Piperi albi Piperis longi
 Cyperi [*scilicet rotundi*]
 Schœnanthi Ireos

Amor.

Amomi [*aut succedaneum eius*]
 Folii [*aut succedaneum eius*]
 Afari ana \mathfrak{z} j.
 Spicæ Indicæ Croci
 Gummi Arabici Tragacanthæ
 Seminis Anethi Calami aromatici
 Cubebæ Garyophyllorum
 Carpobalsami
 Ligustici Seminis Olusatris
 Baccarum Juniperi Seselios
 Pentaphylli [*videlicet radicum eius*]
 Seminis Asparagi
 Seminis Citri
 Acori [*aut loco eius Galanga*]
 Ammii Rhabarbari
 Nucis myristicæ [*id est, Nucis Moschata*]
 Ligni Aloës
 Basilici garyophyllati
 Milii folis
 Seminis Saxifragiæ
 Nucleorum seminis Citrulli
 Cucumeris
 Melonis Cucurbitæ
 Seminis Scariolæ
 Petroselinî
 Been albi Been rubri
 Stryacis calamitæ
 Cardamomi ana \mathfrak{z} β . \mathfrak{z} v.
 Penidiarum \mathfrak{z} iij. \mathfrak{z} ij. β .
 Sacchari albißimi.

CHAMAEDRYOS, *videlicet vera, quæ*
 C 3 *foliis*

folia habet similia quercus. nascitur in montibus Iena, & inter Herfpruck atque Ambergam.

OLVSATRI semen, est magnum semen, quod in omnibus Pharmacopoliis dicitur Macedonicum seu Petroselinum Macedonicum.

Valet ad indigestionem & ventositatem stomachi & intestinorum, & ilei dolorem & lapidis.

Electuarium de Gemmis D. Mesue.

℞. Margaritarum albarum	3	ij.
Sapphiri	Hyacinthi	
Sardæ	Granatorum	
Smaragdi	ana	3 j. ℥.
Zedoariæ	Doronici	
Corticum Citrei mali	Macis	
Seminis Ocymi garyophyllati	ana	3 ij.
Corallii rubri	Charabæ	
Rasuræ Eboris	ana	3 ij.
Been albi	Been rubri	
Garyophyllorum		
Zingiberis	Piperis longi	
Spice Indicæ		
Folii [aut succedanei eius]		
Croci		
* Cardamomi	ana	3 j.
Trochiscorum Diarhodon		
Ligni Aloës	ana	3 v.
Cinnamomi	Galangæ	

Zurum-

Zurumbeth ana ʒ j. β.

Foliorum Auri

Foliorum Argenti ana ʒ ij.

Ambrae ʒ ij. Moschi ʒ β.

Sacchari albissimi.

SAPPHIRVS & **Smaragdus**, qui passim in Myropoliis habentur, nihil valent; cum flammam edant in igne, & ex argenti fodinis colligantur: quare emittendi sunt; aut loco eorum, de Hyacintho & Granato maius pondus sumatur.

SARDA est gemma qua neotericis Carneola vocatur; quod diligenter est notandum. Hactenus enim qualis esset gemma Sarda, ignorauimus omnes.

ZURUMBETH est species Zedoaria, qua radicem habet rotundam & globosam, & asseritur cum Zedoaria longa.

P. C. SCHOL.

Zurumbeth est spec.] Inter tres Zedoaria species qua Antuerpiam aduehuntur radiculis oblongis, quartum quid optimo Zedoario potissimum immixtum reperitur, rotundis globulis, & ea propter Truncosa Zedoaria à Materialistis nostris vocitata: hac utentur Zurumbeth loco Pharmacopœi, & Garciam ab Horto De Aromatibus Indicis hisce de rebus consulant, plura noscere qui voluerint.

Malis cordis, ventriculi, cerebri, ie-

cinoris, & vteri frigidis auxiliatur. Item palpitationi cordis, defectioni animæ, ac concoctioni: tristitiam denique citra causam ortam amouet.

Electuarium Iustinum D. Nicolai.

℞. Cinnamomi

Folii [*aut succedanei eius*] Costi

Nardi [*id est, Spica Indica*]

Cassie lignæ Aristolochiæ longæ

Aristolochiæ rotundæ Enulæ campanæ

Hyssopi Pulegii Artemisiæ

Pentaphylli [*videlicet radicis eius*]

Leucopiperis Orobi veri

Petroselinii Ligustici

Olusatri [*i. Petroselini Macedonici vocati*]

Seminis Vrticæ

Milii Solis

Saxifragiæ seminis [*sumatur eius loco semen Pimpinellæ nostræ, Germanorum videlicet, non Sanguisorbæ vocatæ.*

Baccarum Iuniperi Seminis Asparagi

Sileris montani

Seminis Apii Seminis Anethi

Seminis Rutæ Seminis Citrei mali

Seminis Fœniculi Seminis Anisi

Baccarum Lauri ana 3 j. β.

Sacchari albißimi.

Valet ad dolorē renum: calculos frangit,
& arenas expellit, ac stranguriam dissoluit.

Conse-

Confectio Liberans [scilicet à peste.]

℞. Radicum Tormentillæ
 Seminis Acetosæ
 Endiviæ
 Coriandri præparati
 Citrei mali ana ʒ j. ʒ.
 Santalorum omnium
 Dictamni albi ana ʒ j.
 Boli Armeni præparati
 Terræ sigillatæ [*loco eius Bolus Levanticus, id
 est, Orientalis, sumatur*] ana ʒ iiij.
 Margaritarum Corallii albi
 Corallii rubri Charabæ
 Rasuræ Eboris
 Spodii [*id est, Eboris vili, de quo in fine*]
 Ossis è corde cerui
 Been albi Been rubri
 Doronici Cardamomi
 Cinnamomi Macis
 Ligni Aloës
 Cassiæ lignæ [*aut succedanei eius*]
 Croci Zedoariæ ana ʒ ʒ.
 Smaragdi [*loco eius Hyacinthi aut Granati*]
 Hyacinthi Granati
 Serici crudi incisi & torrefacti ana ʒ j.
 Penidii
 Sacchari Candi ana ʒ ij.
 Florum Nenupharis [*id est, Nymphae*]
 Buglossæ

℥ ʒ

Rosæ

58 CONFECTIOES

Rosarum ana ʒ j.

Camphoræ ʒ vij.

Moschi

Ambrae ana ʒ iiij.

Sacchari albissimi.

Contra pestem pluitimum valet: tutatur corpus ne lædatur à pestifero aëre, & præferuat humores à corruptione.

Confectio Cordialis, Alex. Benedicti.

R. Margaritarum

Spodii [*id est, Eboris vsti*]

Granatorum verorum

Cinnamomi Tormentillæ

Boli Armeni ana ʒ iiij.

Santalorum omnium Rasuræ Eboris

Vnicornu ana ʒ ij. Hyacinthorum

Sapphiri [*loco eius maius pondus Hyacinthi*]

Corallii albi Corallii rubri

Charabæ albæ [*al. Succini*]

Valerianæ veræ

Dictamni Zedoariæ

Ligni Aloës ana ʒ j.

Terræ sigillatæ [*Aut Boli Levantici, hoc est, Orientalis*] ʒ j. ʒ iiij.

Serici crudi modicum torrefacti ʒ ij.

Ossium è corde cervi ʒ j. ʒ.

Been albi

Been rubri ana ʒ ij.

Foliorum auri opt. numero v.

Moschi

Moschi

Ambræ ana ḡ x.

Sacchari albiſſimi.

P R Æ S E R V A T cor à peſte.

*Electuarium Latitiæ, Galeni;
ex Nicolao.*

℞. Florum Ocimi garyophyllatī

Crocī Zedoarię

Xylobalſami [*pro quo Lignum Aloës, cū in
iſta deſcriptione non habeatur*]

Garyophyllorum Corticum Citrei mali

Galangæ Macis

Nucis moſchatæ

Styracis calamitæ ana ʒ ij. β.

Aniſi Raſuræ Eboris

Thymi Epithymi ana ʒ j.

Camphoræ Moſchi Ambre

Margaritarum perforatarum

Oſſium de corde cerui ana ʒ β.

Auri foliati meri [*id eſt, puriſſimi*]

Argenti foliati meri ana ʒ β. *

Sacchari albiſſimi

Fiat confeſtio ſolida.

Si verò volueris facere in forma liqui-
da ſive opiatæ, tunc adde

Succi Cydoniorum

Pomorum odoratorum dulcium

Boraginis

C 6

Vini

Vini veteris optimi, ana partes æquales: in tanta mensura, quanta despumando & decoquendo saccharo satis fuerit: nulla enim aqua saccharum dissolui aut decoqui ad spissitudinem debet in hac confectioe.

LÆTITIAM colorisquæ bonitatem efficit: concoctionem iuuat, & canitiem retardat.

Electuarium Latificans Rhasis.

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| R. Melissæ | Corticum Citrei mali |
| Garyophyllorū | Galliæ moschatæ Mesuæ |
| Mastiches | Croci |
| Cinnamomi | Nucis moschatæ |
| ★ Catdamomi | (cipi] |
| Neremisch | [pro quo potest semen Pæonie æ- |
| Been albi | Been rubri |
| Zedoarię | Doronici |
| Seminis Ocimi | |
| ★ Seminis Ocimi garyophyllati | ana ʒ β. |
| ★ Moschi | ʒ xxiiij. |
- Sacchari albissimi. Fiat confectio in tabulis.

Si verò volueris facere in liquida forma, ut decet, tunc prædictas species sequenti Syrupō misce, & fac in modum opiatę:

- ★ R. Myrobalanorum Chebularum nu. xx.
- ★ Emblicarum numero xxx.
- ★ Aquæ P iiij. aut quantum sufficit. Coquatur tritę myrobalani in prædicta aqua, donec

donec remaneat tertia pars ; deinde cola.
Colaturæ adde mellis despumati ℥j. loco
prædicti sacchari: bulliat postea usque ad
iustam spissitudinem ; & insperge species *
prædictas , postquam feruor Syrupi re-
missior factus fuerit.

NEREMISCH apud Rhazis est Rosa as-
nina. Auerrois autem interpres dicit Peoniam
esse Rosam asinorum. Ergo, secundum hunc Ne-
remisch idem esset quod Peonia : nisi Rhazis de
utraque, id est, de Neremisch & de Peonia, duo
propria faceret capitula, tanquam de rebus di-
uersis. Certò igitur statuere non possumus, quid
sit Neremisch.

Confortat omnia membra principalia,
ex quibus virtutes manant naturales &
animales : iuuat calorem naturalem , &
spiritum viuificat: compescit malas cogi-
tationes : & bonos mores , lætitiâque
& gaudium gignit.

*Electuarium Plirisarcoticum, seu potius
Pleres archonticum, D. Nicolai.*

℞. Cinnamomi	Garyophyllorum		
Ligni Aloës	Galangæ		
Spicæ Indicæ	Nucis moschatæ		
Zingiberis	Spodii		
Schœnanthi			
Cyperi	Rosarum		
Violarum	ana	3 j.	Ḡ xv.
		℥ 7	Folij

62 CONFECTIOES

Folii [*loco ipsius, Macis sumatur*]

Glycyrrhizæ Mastiches

Styracis calamitæ

Sampfuchi [*id est, Maiorane*]

Balsamitæ Ocimi

Cardamomi Macropiperis

Leucopiperis

Myrtillorum

* Corticis Citrei mali ana ʒ ij. ʒ v.

Margaritarum splendidarum

Been albi Been rubri

Corallii rubri

Serici tosti ana ʒ j. ʒ ij. ʒ.

Moschi ʒ vij. ʒ.

Camphoræ ʒ v.

Sacchari albissimi.

Tristibus, melancholicis, imbecillo ventriculo, deliquio animi à corde proficiscenti succurrit. Memoriam amissam recuperat, sensus acuit, comitialibus & asthmaticis prodest, omnemque cerebri debilitatem aufert.

Lithontribon D. Nicolai.

Rz. Spicæ Indicæ Zingiberis

Xylobalsami [*aut Ligni Aloës, ut suprâ*]

Acori [*siue Calami aromatici hodie vocati*]

Cinnamomi

Peucedani [*videlicet radicis eius*]

Meu [*loco eius accipe Seseli Cretici radicem, id est, Beruvvuriz, Germanis vocatam*]

Mela-

Melanopiperis Macropiperis
 Leucopiperis Saxifragiæ ana ʒ ij. ʒ.
 Opobalsami [*loco eius sumatur oleum ex gra-
 nis Iuniperi*]
 Garyophyllorum
 Costi Rhapontici
 Glycyrrhiæ Cyperi
 Tragacanthæ Chamædryos
 Seminis Olusatris [*est semen quod Macedo-
 nicum vulgò perperam vocant*]
 Seminis Apii Ammios
 Asparagi Ocimi Vrticæ
 Citrei mali ana ʒ j. ʒ ʒ xv.
 Folii [*aut succedanei eius*]
 Croci Schœnanthi
 Ligneæ Casiæ [*aut succedanei eius*]
 Bdellii Mastiches
 Ireos Amomi
 Ligustici Milii solis
 Petroselini Macedonici Sefelios
 Sinoni [*de quo supra*]
 Cardamomi
 Anethi Euphorbii
 Lapidis Lyncis Olei Nardini
 Olei Moschelini ana ʒ ʒ. ʒ vij. ʒ. *
 Sacchari albissimi.

Si volueris facere in forma Opiatæ,
 tunc speciebus adde triplum mellis de-
 spumati, loco sacchari : diutiùs enim du-
 rant species melle exceptæ, quàm saccha-
 ro. potest tamen utroque modo fieri.

Olei

Olei Moschelini præparatio infra habebitur.

P. C. SCHOL.

A Meu] *Seseli Creticum* Cordo vocatum, quod *Bervvurtz* Germani, *Fœniculum porcinum* Belgæ appellant, esse ipsissimum *Meu* seu *Meum* *Diosc.* omnino persuasum habeo. Nec radicem eius tantam, tamve crassam esse, (natalibus præsertim locis natam,) neque tam graviter olere, veluti *Matthiolum* metuit, ut neque tenuitatis nec odoris à *Dioscor.* descriptos limites ita transire putem, quin genuinum *Meum* esse queat: Crassitudo cum crassitudine comparanda cum sit, simul atque suaviter olere, & simpliciter odoratum esse, aliquantulum cum etiam differant. Eo modo, ut quæ de *Meo Asturæ* ac *Sistra Monachi* observârunt & scribunt; ego, utpote mihi quoque comperta, approbem, illisq; manus dem. Proinde si quispiã adhuc nihilominus refragari voluerit, pro *Meo* vero tamen eo tantisper utentur *Pharmacopœi*, deserto illo quo hæcenus usi sunt nostrates; dum ipse *Diosc.* Genius nobis aliud proferat. Ceterum imprudenter admodum *Matthiolum* carpit *Fuchsius*, quòd ille unà cum *Monachis*, hanc herbam *Apulis Imperatoriam* nominari inquit, quam *Angelicam* esse (sic à Germanis appellatam) malè interpretatur *Fuchsius*: eum *Imperatoria* nomine ab isthoc *Meo* admodum diuerse à Germanis demonstrantur plantæ.

Præ-

Præclarum ad indigestionem stomachi ex frigiditate. Illorum lumborumque dolores compescit, lapides in renibus & vesica potenter confringit, & inde mirabiliter expellit. Stranguriam & dysuriam è vestigio soluit.

Rosata Nouella D. Nicolai.

℞. Rosarum Sacchari
Glycyrrhizæ ana ℥ j. ʒ j. ʒ ij. β.
Cinnamomi ʒ ij. ʒ ij. minus ʒ ij. ★
Garyophyllorum
Nardi [*id est, Spica Indica*]
Zingiberis Galangæ
Nucis moschatæ Zedoariæ
Styracis calamitæ Cardamomi
Seminis Apii ana ʒ j. ʒ vj. ★
Sacchari albiissimi.

CONFERT apprimè calori & siccitati stomachi, cordis, hepatis & pulmonis. Sitim compescit & vomitum, abscindit debilitatem stomachi, adstringit laxa. Cardiacis subuenit, sudorem diaphoreticum reprimat, ex chronica infirmitate debiles recreat.

Electuarium Diapconias.

℞. Radicis Pæoniæ ʒ j.
Macis Spicæ Indicæ
Croci Coralliorum rubrorum
Mar-

Margaritarum non perforatarum

Mastiches ana ℥ β.

Myrtillorum verorum ℥ j. β.

Cinnamomi

Nucis moschatae

Garyophyllorum

Folii [*loco eius Cassie lignea vera*]

Zingiberis Piperis longi

Cardamomi

Granorum paradisi ana ℥ ij.

Glycyrrhizæ ℥ v.

Anacardi ℥ j. β.

Moschi Ambræ ana ḡ vj.

Sacchari albißimi.

Fiat confectio in tabulis in æstate.

In hieme verò adde speciebus triplū mēlis despumati, & conficiatur electuarius.

CONFERT epilepsiæ, & vertigini.

Electuarius Resumptiuum

D. Nicolai.

R. Rosarum Glycyrrhizæ

Sacchari ana ℥ ij. ḡ v.

Gummi Arabici

• Tragacanthæ ana ℥ ij. ḡ ij.

Santali albi

Santali rubri ana ℥ j. β. Papaueris albi

Succi Glycyrrhizæ Amyli

Seminis Portulacæ

Lactucæ Scariolæ ana ℥ iij.

Garyo.

Garyophyllorum

Spodii [*pro eo, Eboris vsti*]

Cinnamomi ana ʒ j. *

Zingiberis

Styracis calamitæ ana ʒ ij.

Croci ʒ v.

Penidiarum ʒ β.

Nucleorum seminis Cucurbitæ

Citrulli Cucumeris Melonis ana ʒ ij.

Seminis Cydoniorum ʒ ij.

Amygdalorū dulcium Pineorū nucleorū

Berberis Seminis Maluæ

Seminis Coti siue Bombacis *

Seminis Violarum Nymphææ

Sebesten ana ʒ ij.

Cum Syrupi Violati quantitate sufficien-
ti fiat Electuarium.

RESTAVRAT humiditatem radica-
lem : lenit, humectat, nutrit, & confor-
tat. Aperit poros, obsistit cholerae : sedat
febrem, tussim & sitim. Restituit integras
vires, & pristinam sanitatem, extenuatis,
consumptis & hecticis.

*Diacorum D. Mesuæ, in sua praxi, **
cap. 1. de affectibus nervorum.

℞. Radicum Secacul Acori

Pinearum ana ℥ j. β.

Radices Secacul mundatę & incisę co-
quantur in aqua clara, donec aqua consu-
matur:

matur : postea optimè pistentur, & in minutissimas partes conterantur, donec pul-
ti similes fiant. Dein adfunde eis mellis
odorati & optimè despumati l' x. coquan-
tur lento igne, donec tota aqua, quam radi-
ces Secacul imbibebunt, in vaporem reso-
luta sit; diligenter agitando, ne ad vasis
fundum adurantur radices. Cùm autè iustè
spissitudinis consistentiam acquisiverit, ab
igne deponito, & adde radices Acori re-
nuissimè tritas, & Pineas minutissimè in-
cisas, cū subsequētipulvere optimè mistas:

R. Piperis ℥ j. Piperis longi
Garyophyllorum Zingiberis

A Macis ana ℥ iiij.

Nucis moschatæ Galangæ

Cardamomi ana ℥ iiij.

Omnia ista simul cum melle & radicibus Secacul misceto & vnito; diligenter agitando, ne grumi aliqui relinquantur.

B. *SECACUL* verum est *Sifer*, quod Germani vocant *Gritzelmoren*, & *Klingelmoren*, Galli *Eschernis* & *Serniles*, Bauari *Nudle*, Sueni *Geyrle*.

ACORVS, id est, vulgò vocatus *Calamus aromaticus*. Mesue iubet etiam *Acori* radices elixari. Sed quia nos recentes & virides non habemus, ut ii qui in calidis regionibus habitant, idèò melius est eas tritas melli admiscere.

P. C. SCHOL.

A *Rosas* è contextu, à *Cordo* perperam imposi-
tas,

us, Euchsio quoque & id volente, sustuli.

Secacul verum.] Secacul non est Siser, ut B Cordus existimat: sed, veluti Frācisco Alexand. quoque placet, esse posset ea planta quam Criticum spinosum, seu Passinacam marinam vocant Monspelussani: unde mihi in horto meo à Matthia Lobelio doctore Medico semine transmissio, nunc virescit. Genuinum interim si id non fuerit, in eius locum tamen commodè substitui posset, respondentibus facultatibus: dum Arabs quispiam ipsissimum nobis monstrauerit.

Confert mirum in modum ægritudinibus neruorum: acuit omnes sensus & ingenium, sedat dolores capitis; est peculiare remedium frigidarum ægritudinum scorum, & maximè catarrhi.

Pulvis ad Epithemata cordis.

℞. Santali rubri ℥ j.
Corticum Citrei mali Santali albi
Rosarum Corallii albi
Corallii rubri Charabæ
Spodii [accipe Eboris vlli]. ana ℥ β.
Ossis cordis ceruini
Crocii ana ℥ j.
Specierum Lætitiæ Galeni
Specierum electuarii de Gemmis
Specierum Diamargariton ana ℥ iiij.
Camphoræ ℥ j.

In puluerem redactæ species commisceantur.

Pulvis

Pulvis ad Epithemata hepatis.

℞. Rosarum Santali albi Santali rubri
 Absinthii Schœnanthi
 Spodii [*pro eo, Eboris vlli*]
 Spicæ Indicæ ana ʒ β.
 Contrita in puluerem misce, & repone.

CONFECTIOES

OPIATÆ.

Diabolibanum D. Nicolai.

℞. Castorei Opii
 Hyoscyami albi ana ʒ iij.
 * Cassiæ lignæ ʒ ij. ʒ ij.
 Folii [*aut succedanei eorum*]
 Croci
 Turis masculi ana ʒ ij.
 Rhapontici
 Amomi [*pro quo Carpesium*] ana ʒ j. ʒ ij.
 Myrrhæ ʒ j. β.
 Pæoniæ Styrcis calamitę
 Macropiperis ana ʒ j.
 Spicæ Indicæ
 Pyrethri Euphorbii
 Leucopiperis ana ʒ ij. β.
 Mellis despumati triplex pondus.

EST verò observandum in omnibus opiatis, ut singulis uncis specierum, misceantur tres
 UNCIÆ

*uncia mellis despumati. Si minus fuerit, exsic-
catur confectio facilè : si verò plus addatur, vi-
res eius disperguntur.*

*Tus Masculum, est Tus album aut fla-
uum purissimum, in globulos rotundos singulos,
aut testiculorum figura geminos concretum;
ideoq; Masculi cognomen accepit.*

V T I L E est ad diuersas passiones ca-
pitis : hemicranicum dolorem placat, &
supercilii : lachrymas potenter stringit :
fauces rheumatizatas & arterias lenit. Hæ-
moptoicis & tussientibus medetur. Vo-
mitum compescit : dolorem stomachi &
nauseam aufert. Peripneumonici, pleuri-
tici, empyici subuenit. Gonorrhœam
& satyriam emendat, & menstrua-
lem sanguinem sistit.

*Musa Enea, siue Zazenea, vel Egetea A
D. Mesue.*

R. Castorei

Myrrhæ

Opii

Melanopiperis

Macropiperis

Galbani

Costi

Cinnamomi

Phu

*Meu [aut loco eius Seseli Creticum, id est,
Bervunriz]*

Dauci

Asari

Croci

ana

ʒ iiij.

Mellis despumati optimi triplex pondus.

R. C.

P. C. SCHOL.

A Musa.] *Erroneè à Cordo Musa hac confectio inscribitur, veluti & Francisci Alexand. ritè observauit; cùm Sagzeneà à Mesue vocatur. Musa enim Enea apud Nicolaum confectio est, ab hac plurimum differens.*

V A L E T ad omnes passionēs frigidas, & ventositates crassas, & dolorem dentium & corrosionem eorum, & ad frigus stomachi, tarditatem digestionis, colicam, difficultatem vrinæ, & ad frigus & phlegma, & ad mucositatem vrinæ.

*Philonium Maius, siue Romanum
D. Nicolai.*

R. Leucopiperis

* Hyoscyami albi [*i. seminis eius*] ana ʒ v.
Opium ʒ ij. β.

Cassia lignea [*aut succedanei eius*] ʒ j. β.

A Seminis Apii ʒ j.

Petroselinum Macedonicum Fœniculi

B Dauci Cretici ana ʒ β.

* Croci ʒ j. Spica Indica

* Zedoaria

* Pyrethri ana ʒ β. ḡ v.

Cinnamomi ʒ j. β.

Euphorbii Costi ana ʒ j.

Mellis

Mellis despumati optimi triplex pondus.

*Pro Danco Gretico accipere licet Sefeli Cre-
ticum, id est, Beruvuriz.*

P. C. SCHOL.

Sem. Apii ʒ j. & paulo post. Sem. Dau. A
ci ana ʒ. β. } Pro ʒ j. Cordus malè ʒ j. se. B
cuti & pro ʒ β. erroneè ʒ j. legebat: ut Fran-
cisco Alexand. quoque placet.

Emendat tussim cum vino multo obla-
tum, peripneumoniam cum hydromeli-
te, sanguinis sputum cum polygoniæ
succo. Indigestione n stomachi & vom-
tum cum posca, dolorem hepatis cum
œnomelite curat: spleneticis, & aurigi-
nosus cum oxymelite subuenit; cœliacis,
cum apozemate rutæ. Pleuriticis, ilio-
sis, nephriticis & vesicæ symptomatis
cholericis medetur.

Philonium D. Mesue.

℞. Piperis albi

Seminis Hyoscyami albi ana ʒ xx.

Opii ʒ x. Croci ʒ v.

Spicæ Nardi Indicæ Pyrethri

Castorei ana ʒ j.

Mellis despumati optimi triplum pōdus.

MIRVM in modum mitigat dolores,
præcipuè stomachi, matricis, laterum,
totius ventris, & colicam cum decoctione

D

chamæ-

chamæmeli vel rutæ, & statim prouocat somnum cum aqua lactucæ vel syrupo papaueris. Tollit dolorem capitis cum decoctione stœchadis, prohibet catarrhum cum decoctione olibani vel spicæ. Contra spasmodum, & paralysem bibitur cum decoctione nucis moschatæ. Facilitat anhelitum cum decoctione baccarum lauri vel hyssopi, & sedat tussim cum aqua mellis. Prouocat urinam, faciliat mictum, & frangit lapides vesicæ, cum decoctione Saxifragiæ vel aqua apii. Compescit vomitum & fluxum sanguinis ex ore, cum succo plantaginis vel decoctione mastiches; & sedat singultus, & præfociones, & vitia matricis, & potenter somnum inducit.

Philonium ex Galeno & P. Ægineta.

Rx. Croci	ʒ	v.	
Pyrethri		Euphorbii	
Spicę Indicæ		ana	ʒ j.
A Piperis albi	ʒ	xx.	
Hyoscyami	ʒ	viiij.	
Lachrymæ Papaueris		ʒ	x.
Mellis despumati optimi	triplum.		

P. C. SCHOL.

A Hyoscyami ʒ. viij.] *Cum non Galeni, sed P. Ægineta tantum corrupta exemplaria perperam legant Hyoscyami ʒ viij, atq; ex Cornarii*

narii dolabella ꝓ xx ꝓ ꝓ viij. restituenda sint, cum Mesues descriptione hoc pacto conveniet: utpote qui ex hisce eandem desumserit; Castorei in Euphorbii locum substitutum si exceperis.

Philonium Persicum D. Mesua.

℞. Piperis albi
 Hyoscyami albi ana ꝓ xi.
 Apii
 Terræ sigillatæ [*pro qua Boli Armeni, ut
 supra*] ana ꝓ x.
 Lapidis Hæmatitis Croci ana ꝓ v.
 Castorei Spicæ Indicæ
 Euphorbii Pyrethri
 Margaritarum Charabæ [*id est, Succini*]
 Zedoariæ Doronici
 Trochiscorum Ramich [*de quibus infra*]
 ana ꝓ j.
 Camphoræ ꝓ j.
 Mellis rosati optimi triplum.

P. C. SCHOL.

Piperis albi.] *Insulsè admodum Papaver in huius locum surregauerat Cordus; quod & suboluit facilè Fuchsio: sequentibus nihilominus Cordus Colonienfis medicis, in ab ipsis enulgato non ita diu Dispensariolo.*

INVENTVM est ad retinendum sanguinem menstruorum, hæmorrhoidarum, fluxum ventris, vomitum, & sputū sanguineum;

neum; præsertim si cum succo plantaginis dissolutum bibatur, & ad fluxum mēstruorum mittatur in vuluam, & ad fluxum sanguinis excoꝛiatium clysterizetur. Conso- lidat fermè vlcera & venas : & nihil est quod magis & tutiùs præseruet ab abortu prægnantem grauidam.

Requies Nicolai.

R. Rosarum

Violarum ana ʒ iij.

Opii Hyoscyami

Papaueris [*videlicet albi*]

Mandragoræ [*videlicet cort. radicis eius*]

Scariolæ [*videlicet seminis*]

Lactucæ [*videlicet seminis*]

Seminis Portulacæ

Psyllii

Nucis moschatæ Cinnamomi

Sacchari ana ʒ j. ʒ.

Santali albi Santali citrini

Santali rubri Spodii

Tragacanthæ ana ʒ ij. ʒ v.

Mellis despumati optimi triplum.

REQUIES dicitur, quia requiem acci-
pientibus præstat : maximè typicè feбри-
citantibus, quotidianariis, tertianariis,
quartanariis, acutis & peracutis.

Tryphera

Tryphera magna D. Nicolai.

℞. Opii 3 ij.
 Cinnamomi
 Garyophyllorum Galangæ
 Spicæ Indicæ Zedoariæ
 Zingiberis Costi
 Stryacis calamitæ
 Calami aromatici
 Cyperi
 Iridis Illyricæ
 Peucedani
 Acori [*aut Calami aromatici hodie vocati*]
 Mandragoræ Nardi Celticæ
 Rosarum Piperis
 Sem. Anisi
 Apii Petroselini Macedonici
 Fœniculi Dauci
 Hyoscyami Cumini
 Ocimi ana 3 j.
 Mellis despumati optimi triplum.
 I R I S *Illyrica*, est eadem quæ in *Pharmacopoliis* dicitur *Ireos*.

N A R D U S *Celtica* siue *Spica Celtica*, & *Saliunca*, est eadem herba quæ in *Pharmacopoliis* dicitur *Spica Romana*.

A V X I L I A T U R dolori stomachi ex frigidityte; & cùm accepta fuerit, statim patientem ad sudorem prouocat. Pñrene-ticis, & mulieribus quæ ex melancholia

D 3 de ma-

de matrice infomnes sunt, rheumaticis, peripneumoniacis, & qui excernunt excrementa cum sanguine, vtilissima est.

Tryphera minor Fænonis, ex Mesue.

℞. Myrobalan. Chebularum

Bellericarum Indarum Emblicarum

Nucis moschatæ ana ℥ v.

✱ Nasturtii assati Asari

Origani Persici Piperis

Olibani Ammios

Zingiberis Fructus Tamarisci sativæ

Nardi Indicæ Schœnanthi

Cyperi ana ℥ iiij.

Scoriæ ferri, quinque diebus in aceto maceratæ, & deinde tostæ ℥ xi.

Myrobalani cum butyro recenti non salito assentur modicum; reliqua oleo amygdalino dulci inuoluantur: deinde addatur Moschi ℥ j.

Mellis despumati triplex pondus.

Oportet autem diligenter attendere, ne Myrobalani comburantur, cum in butyro assantur.

ORIGANVM Persicum, idem est quod *Origanum Orientale*: nascitur etiam in Creta insula, & Græcia: habet autem surculos, capitula, folia, & ramulos maiorane similia; saporem verò inter *Saturiam* & *Distamnnum Creticum* medium: estque valdè odoratum & aromaticum.

maticum. affertur ex Oriente in Italiam. loco autem eius accipere licet Dictamnium Creticum verum.

T A M A R I S C U S *sativa, arbor est proce-
ra: sed ea nos caremus, ideóque cogimur loco
eius nostratis Tamarisci foliis uti.*

S C O R I A *ferri, propriè significat ferri
recrementum, id est, Eysenschlacken Germania
vocatam: verum, id non debet hoc loco accipi,
sed Squama aut Batitura Ferri optimi aut
Chalybis, quam Græci Stomoma appellant.*

V A L E T *ad corruptionem & exuberan-
tiam menstruorum, & hæmorrhoidarum,
& ad corruptionem formæ, & debilitatem
stomachi, & destruit humorem crudum,
& clarificat colorem. Confortat vesicam,
& abscindit fluxum ventris.*

Tryphera Sarracenica D. Mesua.

℞. Myrobal. Chebulorum

Indorum Bellericorum Emblicorum

Citrinorum ana ʒ v.

Cinnamomi Leucopiperis

Macropiperis Melanopiperis

Secacul [id est, Siseris, ut suprâ]

Folii [aut succedanei]

Spicæ

Cardamomimajoris Cardamomiminoris

Cassæ lignæ [aut succedanei eius]

Scitaragi Indi Cyperi

Apii Linguae avis

D 4

Garyo-

80 CONFECTIONES

Garyophyllorum

Been albi Been rubri

* Zingiberis ana ʒ ij.

Nucis moschatae Macis

Sesami excorticati ana ʒ iiij.

Amygdalorum dulcium

Amygdalorum amarorum ana ʒ v.

Ligni Aloës Rhabarbari

Rutæ Seminis Fœniculi

Mastiches ana ʒ ij.

Ocimi garyophyllati Menthæ siccæ

Origani Persici [*eius loco Dictamnium Cre-
ticum accipe*] ana ʒ j. β.

Fricentur Myrobalani trite cum butyro
vaccino recenti & non salito; aliæ verò
species cum oleo amygdalino dulci: &
conface cum mellis despumati opt. triplo,

SECA C V L, non est Iringus siue Eryngiū,
neque Iringus, qui habet folia Cretami marini;
neque Sigillum Salomonis. Sed verum Secacul
est veterum Siser, hoc est radix illa quæ Germa-
nicè dicitur Klingelmorn, Gritzelmorn, Nudlen,
& Geyrlen: Gallicè Escheruis & Seruilles.

LINGVA avis, est semen Fraxini.

SEITARAGI Indum, est herba Nastur-
tii odore & sapore, foliis longis, radice simili
eius herbe quàm Merretich vocant Germani,
& Pfefferwurtz, Raphanum magnum.

CONCOCTIONEM ventriculi & he-
patis suo calore iuuat: ob id flatus dissipat;
humores in ventriculo & aliis visceribus
putres

putres absumit; oris & corporis odorem
& colorem commendat; lassitudinem tol-
lit. Sanitatem præsentem tuetur, & mor-
borum generationem prohibet. Venerem
auget; hæmorrhoides sanat.

Tryphera Persica D. Mesua.

℞. Succorum Solatri siue Solani
Endiuixæ veræ & fatiuxæ
Apii ana ℥ ij.
Lupulorum depuratorum ℥ j.
Proiciantur desuper
Violarum siccarum aut viridium
Rosarum ana ℥ iij. [aliis ℥ iij.] ✕
Folliculorum Senæ ℥ ij.
Agarici ℥ j.
Prunorum Damascenorum pinguium nu. l. ✕
Cuscutæ ℥ β.
Spicæ Indicæ ℥ iij.
Bulliant molliusculo igne, donec super-
sint ℥ ij.
Et iniiciantur Epithymi ℥ xl.
Myrobalanorum Citrinorum
Chebulorum
Indorum frictorum in oleo amygdalo- ✕
rum dulcium ana ℥ ij.
Bulliant leuiter, deinde ab igne depo-
nantur & percolentur: atque dissoluantur
in vna parte istius percolati
Tamarindorum recentium ℥ iij.
Mannæ electæ ℥ j. β.
D s Pulpæ

Pulpæ Cassiæ ℥ iiij.

Sacchari violati ℞ j.

Percolentur & mudentur à granis & sordibus ; atque in aliam aquæ partem proiiciantur

Sacchari albißimi ℞ iiij.

Acetivini ℞ j.

Coquantur leuiusculo igne : deinde proiiciantur super illud quod dissolutum est in succis, & aggregentur simul in vnum, atque coquantur donec mellis crassitiem obtineant : postremò in puluerem redactæ sequentes species inspergantur :

Rhabarbari optimi ℥ ij.

Myrobalan. Citrinorum ℥ j. β.

Chebulorum

Indorum ana ℥ j.

Bellericorum

Emblicorum ana ℥ iiij.

Seminis Fumiterræ

Trochiscorum Diarhodon.

Macis Mastiches.

Cubebarum

Spodii [loco eius Eboris vñi]

* Santali citrini ana ℥ ij.

Nucleorum seminis Cucurbitæ

Citrulli

* Cucumeris

Melonis ana ℥ ij. β.

Anisi ℥ iiij.

Spicæ Indiæ ℥ ij.

Inuoluat.

Involvuntur hæ species in oleo violato : & confectio reponatur in vase vitreo.

CONFERT febris acutis, & inflammationi stomachi & hepatis, ictericis calidis : de oppilatione incolumitatem acquirit. Visum à fumis cholericis deperditum, reparat. Sitim mitigat : morbos adustionis fieri prohibet.

Confectio Anacardina D. Mesue.

R. Piperis nigri

Piperis longi

Myrobal. Chebulorum

Emblicorum Bellericoum Indorum

Castorei ana ʒ ij.

Costi Anacardii

Sacchari tabarzeth

Burungi

Baccarum Lauri ana ʒ vj.

Cyperi ʒ iiij.

Anacardi per se terantur, & aliis tritis admisceantur : deinde omnia cum butyri recentis non saliti &

Mellis despumati ana ʒ v. β.

Simul costis bullitioneunica conficiantur.

P. C. S C H O L.

Burungi.] Cordus huius loco semen Eru. *ca* posuerat, hanc dictionem ita interpreta-
tus ; cum Melissam esse existiment plerique,

Weg monet Fuchsius, Matthiolo aliter sentiente. Si verò dictionem hanc *Eruca semen* esse, *Mesua* mens fuerit, per id *Sinapi semen* à colore album vulgo hic nuncupatum, atque ab officinis nostris perperam *Eruca semen* vocitatum, intelligendum erit; ab huius confectiois virium scopo non alienum.

E s t confectio sapientum, & eorum qui desiderāt scire: acuit enim intellectū, subtilizat sensum, memoriam recuperat; & confert dolori stomachi & ventris à frigidityte factō; & clarificat sanguinem, colorem bonum facit.

Aurea Alexandrina D. Nicolai.

℞. Asari (suprà)
 Carpobalsami [aut aliquod succedaneum, ut
 Sem. Hyoscyami albi ana ʒ ij. ʒ.
 Garyophyllorum
 Opii Thebaici Myrrhæ
 Cyperi rotundi ana ʒ ij.
 A Balsami [loco eius oleum Garyophyllorum]
 Cinnamomi
 Folii [aut succedanei eius]
 Zedoarię Zingiberis
 Costi veri Corallii
 Casiæ lignæ verę Euphorbiæ
 Tragacanthæ
 Turis masculi
 Mei [vel potius Mei]

Styria-

Styracis calamitæ

Saliuncæ [*id est, Spica Celtica, quæ nunc Romana dicitur. Sed in Græco Alexandrino habetur Eleliphæon, id est, Salvia*]

Cardamomi minoris Sefelios

Seminis Napi Seminis Saxifragiæ

Anethi

Anisi ana ʒ j.

Ligni Aloës

Rhapontici

Aliptæ moschataæ Castorei

Spicæ Nardi Indicæ Galangæ

Opopanacis Anacardii

Mastiches Sulphuris viui

Radicis Pæoniæ

Eryngii [*videlicet radicis eius*]

Rosarum Thymi

Acori veri [*sive Calami aromatici*]

Pulegii Aristolochiæ longæ

Gentianæ

Corticum rad. Mandragoræ

Chamædryos Phu

Baccarum Lauri

Ammi [*id est, Ammios*]

Dauci Cretici [*eius loco licet accipere Sefeli Creticum, id est, Beruvurtz*]

Macropiperis Leucopiperis

Xylobalsami [*aut aliquod succedaneum*]

Sem. Carui

Amomi

Petroselini

Ligustici

Rutæ

D 7

sinoni

Sinoni ana ʒ β.

Auri cocti [i. omnino igne depurati & sinceri]

Argenti meri [vel Fol. Argenti]

* Margaritarum albarum

Blattæ Byzantiæ

* Offis è corde cerui ana ʒ xv.

Limaturę Eboris

* Calami aromatici

Pyrethri ana ʒ vij.

Mellis despumati triplum.

IN Græco Alexandrino Nicolao etiam alia quedam pretiosa habentur in fine, nî fallor. Sicut videbitur, si in lucem venerit.

MYRRHAE. Aetharius, auctor quem Ruellius interpretatus est, pro Myrrha habet Myrti baccarum, id est, Myrtillorum, facili ex altera in alterutram vocem lapsu: nam Myrta in plurali numero Græcis sunt fructus Myrti; quæ vox magnam habet similitudinem cum Myrrha.

MEV veronos caremus, eius loco accipere licet Sisonis semen, quod iam dicitur Amomum, aut Seseli Creticum, hoc est Beruvuriz: sed hoc inferius est accipiendum pro Dauco Cretico.

NAPVS, est parva, densa, ac solida rapa, quam appellamus Germanicè Merseburgisch, Bortfeldisch, & Bairisch rublein.

PHV verum, quod ad medicinam requirunt Auctores, non est Valeriana vulgaris, nempe agrestis: sed alia herba quæ Germanicè dicitur

dicitur Gartensclunk , Teriacskraut & Spik-
wurzel. Caulem & flores habet Valeriana,
radicem maiorem & odoratiorem, folia longa
& mollia. Colitur à nobis in hortis.

AMOMVM verum] est Rosa Hierichuntis D
odorata: sed eo Pharmacopola hactenus carne-
runt. eius succedaneum est verum Acornus aut
Carpesium.

SINONVM siue Sison, siue Sinneu, siue Si- E
non, est serpen nigrum aromaticum, quod ho-
die Amomum in Pharmacopoliis vocitatur
falsò.

AMBARVM Margaritarum] hoc est, F
perforatarum & non perforatarum. alii le-
gunt albarum Margaritarum. Actuarii ha-
bet simpliciter Margaritarum. Non malè ergo
quis aget, si tam perforatarum quàm non
perforatarum, ana ʒ ss. ʒ vj. & ss. acceperit,
ita ex utrisque unum fiet pondus, videlicet vs
Nicolau habet, ʒ j. ʒ xiij.

P. C. SCHOL.

Balsami] Opobalsami, legebat Cordus, au- A
ctoris potius mentem interpretans & ponens,
quàm vocem eam quam repererat seruans. Per
Balsamum verò absolutè scriptum, herbam
ipsam ipsius Balsami frutici intelligi vult
Fuchs. Myrepsum Xylobalsamo, Carpobalsa-
mo, Opobalsamo, & Balsamo, quatuor di-
stinctis vocibus uti perhibens. Sed eundem My-
repsum quatuor illa simul in eodem usurpare
indica-

medicamento, nec dicit nec demonstrat. Quare per Balsamum, Nicolaum succum seu Opobalsamum intellexisse, unà cum Francis. Alexand. Apolline censeo.

B Sem. Napi.] *Seminis Sinapis legit Fuchsius huius loco ex Myrepso, cui & aliquot vetustissima exemplaria consentiunt.*

C Rhapontici.] *Rhabarbari perperam legebat Cordus, indicante & id quoque Fuchsio; quod à Rhapontico diuersum est. Id ipsum autem admissum Dioscoridis descriptioni conueniens, hisce nuperrimis annis primum adferri denuò atque à peritioribus nonnullis cognosci cœpit. Non ita diu enim eius uncias paucas (rariusculum enim adhuc est) ex urbe Veneta, in qua tum agebat, ad me dono misit, non minus doctus, quàm hacce in nostra arte si quis alius versatissimus atque diligentissimus Valerandus Donueus, Lugduni pharmacopœia nuncfaciens. Verùm in huius Rhap. panuria Rhabarbaro non incommodè uteris.*

D Amomum verum.] *Rosa Hierichuntis vocata vulgò, Amomum herclè esse non potest, ut Matthiol. Fuchsius, & Francis. Alex. rectè sentiunt. Quare eius utendum succedaneo.*

E Sinonum.] *Cordimentem, ut neque Anguillare, non intelligit Francisci Alex. Apollo. Dicere enim volunt, Sinonum seu Sisonem verum, esse semen quoddam nigrum, acre, aromaticum, exiguum, Apii semini simile, eius herba, inquam, cuius imago ab Hieronymo Trag.* &

go, & Cordo, Sifonis nomine depicta est; ac cuius semen Belgii atque Germania officina Amomum falsò vocitant, pròque eo sinistrè utuntur. Idipsum interim si Sinonum non fuerit, facultate cùm illi sit satis vicinum, pro eodem vsui esse poterit.

Ambarum Margar.] Cùm ita legeret Cordus, unà cum multis aliis, longè aliter sese res habet; nempe ut in contextu restitui.

C O N T R A defluxiones capitis frigore conceptas efficax est: oculorum lachrymas exiecat, dentium dolores lenit: aduersus capitis cruciatum summopere prodest. Illitum fronti comitiales, insanos, vertiginosos, & in vniuersum omnem capitis noxam mulcet. Tabidis, tussiculosis, humorem à thorace reiicientibus, cardiacis, sanguinem exscreantibus præfenti est auxilio, ischiadicis, coli & renum cruciatibus. Aduersus iliorum noxam, difficultatem vrinæ, & eiusdem stillicidium valet: calculos comminuit: omni ventris malo liberat. Quotidianis & tertianis febribus circa accessionis initium, sufferuefacto Stœchadis iusculo, medetur.

Diacodion simplex D. Mesuæ.

Rx. Capitulum Papaueris mediocrium *
flaccidorum numero x.

Macerata horis xxiiij. in Aquæ celestis *
sextario

sextario vno, coquantur ad tertias, id est, tamdiu vsque quo tertia pars aquæ super sit.

Colaturæ expressæ adde

Sapæ optimæ ad tertias coctæ ℥ iiij.

Mellis optimi ℥ j.

Coquantur ad perfectionem.

Diacodiū cōpositū verò vt fiat, addantur

Acaciæ, non ita aridæ, sed liquidæ

* Rubiæ tinctoriæ Hypocistidis

Croci Myrrhæ

Balaustiorum [hoc est, florum malogranat. siluestrium] ana ℥ j.

Ramich ℥ iiij.

FLACCIDORVM, id est, non omnino recentium, neque aridorum, sed medio habitum, qualia sunt pridè decerpta. Si verò sicciora

* fuerint capita, biuuo maceranda erunt.

SEXTARIUS mensura genus est, quod si melle repleatur, pendet ℥ xxx; si oleo, pendet ℥ xviij, si verò aqua repleatur, pendet aquæ ℥ xx. Hoc autem loco accipiendus est sextarius aquæ celestis: ergo aqua oportet esse uncias xx ponderales. Variant tamen Auctores in sextarii definitione, vt inferius in vnguentis dicetur.

HYPOCISTIS, id est, vt hodie corrupto nomine vocant, Hypoquistidos.

RAMICH, compositio est peculiaris, que ponitur in Trochiscis.

MELLIS quantitas admodum parua videtur

detur esse in hac confectioe. *Actuarius* aliud
habet *Diacodion* ; quod huic subiiciemus sta-
tim.

DIACODION simplex confert eis
quibus ex capite ad pectus & ad pulmonem
subtiles catarrhi defluunt, & sunt causa
russis.

Compositum autem, naturę impetum
sistit, & sanguinis reiectionem à visceri-
bus thoracis.

Diacodion D. Actuarii.

℞. Capita Papaveris, neque perquam vi-
ridia, neque etiam ariditate exsucca,
numero xij.

Rosarum ʒ j. ʒ j. β.

Croci Acaciæ

Dulcis radicis [*id est, Glycyrrhizæ*] ana ʒ j.

Armenæ glebæ [*id est, Boli Armenæ*] ʒ β.

Cinnamomi Hali

Hypocistidis

Floris siluestris Punicę [*id est, Balanflorū*]
ana ʒ j.

Myrti Dauci ana ʒ j.

Corallii candidi [*id est, albi*]

Corallii rutili [*id est, rubri*]

Rhois culinarii [*id est, obsoniorum*]

Sanguinis Draconis

Florum Althææ ana ʒ j. [*scilicet ʒ ij.*]

Seminis Portulacæ ʒ j. β.

Capita

Capita papaveris in cælesti imbre sufficienti duos dies macerato, postridie ad tertias coquito, & decoctum expressum ad iustam consistentiam bulliat cum mellis optimi ℞ ij. Postremò deposito ab igni vase, species subtilissimè tritas adiicito, & bene vnito.

☉ hoc signum significat pondus, quod dicitur Sicilicum: pendet autem tantum quantum 3 ḡ. & est quarta pars uncia unius.

HALVS aut Halum siue Alum, est Consolida saxatilis, id est, Symphytum petraeum, quod hodie non habent Pharmacopola, ideoq; necesse est Symphyti, siue Consolida maioris radices accipere. nam Galenus dicit, utile esse magnum Symphytum, id est, Consolidam, ad omnia ad qua Petraeum, id est, Alum.

RHV S Culinarium, id est, quod nunc vocant Arabico nomine Sumach: oportet autem enucleatum, & pulpam eius accipere.

AVXILIO est celiacis, dysentericis, leuitati intestinorum, alui profluuiio, cum aqua cælesti, in qua spodium ferbuertit aut succinum torrefactum, vel cum stillaticio rosarum liquore.

A Diacastorium D. Nicolai.

℞. Castorii

Myrobalanorum citrinorum ana ʒ iiij.
minus ḡ j. β.

Assx

Assę foetidę	Myrrhę		
Euphorbii	ana	ʒ j. Ț xvij.	
Aloës	ʒ j. β.	minus Ț j.	*
Folii [<i>aut succedanei eius</i>]			
Artimonii [<i>id est, Pyrethri</i>]			*
Glycyrrhizę	Tragacanthę		
Calami aromatici			
Nitri	Galbani		
Schœnanthi	Opopanacis		
Spicę Nardi Indicę			
Sagapeni	Nucis moschatę		
Cassę lignę	Leucopiperis		
Macropiperis	Melanopiperis		
Xylobalsami [<i>aut succedanei eius</i>]			
Carpobalsami [<i>aut succedanei eius</i>]			
Colocynthidis	Rhapontici		*
Styracis Calamitę	Zingiberis		
Cinnamomi	ana	ʒ j. Ț ij.	
Staphisagtrię			
Dauci	Fœniculi		
Petroselini	Apii		
Sileris montani	Baccarum Lauri		
Petrolei	Seminis Sinoni		
Styracis [calamitę]	rubrę [<i>id est, rufa pu-</i>		*
	<i>rissima</i>]		
Sanguinis draconis	Cardamomi maioris		
& minoris			
Turis	Agarici		
Mastiches			
Salis Hammoniacy	Zedoarię		
Anisi	ana	ʒ j. Ț ix.	*
	Thym-		

- Thymbræ Hyssopi
 Chamædryos Pulegii
 Origani Balsamitæ
 Ocimi Brancæ virginæ
 Dictamni [*videlicet Cretensis*]
 Seminis Rutæ Aristolochiæ longæ
 Aristolochiæ rotundæ Ari
 Mabathematicum Asari
 Saluiæ [*videlicet minoris*]
 * Rosarum
 Bdellii ana ḡ xviii.
 Epithymi Polypodii quercini
 Opobalsami [*loco eius oleum Garyophyllorū*]
 ana ḡ xiiij.
 * Alypiados
 * Capparis [*id est, radicis eius*] ana ḡ xij.
 Anacardii Sabinæ Gentianæ
 * Corticum rad. Mandragoræ ana ḡ x.
 Peucedani
 * Absinthii ana ḡ vij. Ireos ḡij. β.
 Mellis despumati triplum.

PETROLEVM hoc loco accipiendum est clarum, flavum atque liquidissima tenuitatis: & non nigrum & crassum.

STYRACIS rubee, id est, calamita rubee: hoc enim loco non est accipiendus cortex ille fuscus & aridus, quem vocant Thymiana, atque malè Storacem rubeam: sed Styracis calamita purissima gutta, quibus rufus est color.

SALIS Hammoniæ, hodie dicunt Armoniæ. est autem hic duplex. Facitius, quo
 utuntur

utuntur Chymista, Aurifabri & Ærarii: atque Nativus, qui ad medicinam recipitur. Cum autem careamus Natio, necesse est eius loco Salem Gemmeum accipere. Nam hoc loco non requiritur Sal Hammoniacus factitius, ut puto; potest tamen tantilla eius portio iudè misceri tam numerosis simplicibus huius compositionis.

BRANCA Vrsina, hoc loco non significat eam herbam quam Germani Beraklaw vocant, foliis asperis, umbella & semine Anethi, odore & sapore cimicum; radice acris & feruida: sed eam Brancam quæ in Italia Vrsina vocatur, radicibus longis, Tragacantha modo mucosis.

MABATHOMATICVM, aiunt esse Cauliculi silvestris succum. est autem Cauliculus seu Caulis agrostis id olus quod Cato & alii rei rustica scriptores apud Latinos Brassicam silvestrem vocant, cuius multa sunt species.

ALYPIAS, siue Alypum, quid sit, nondum constat: quidam interpretantur Meze-reon, id est, Chameleam, sed falsò: utrumque enim seorsum peculiari capite ab auctoribus depingitur: vires habet acres, & atram bilem per alium purgandi. possumus autem eius loco accipere Epithymum, Thymbram, aut Thymum.

P. C. SCHOL.

Huius confectiois descriptionem cum non A
esse

esse legitimam, sed corruptissimam Fuchsius & Franciscus Alexander meritis conquerantur, eam nos hic suæ integritati restituimus; quamquam non ex Fuchsi Myrepso depravatissimo, ut neque ex Francisci Apolline.

B Alypias siue Alypum.] *Eius, quæ hæc nomine hodie cognoscitur, herbam affabrè tibi Matthiolus in suis illis heroicis Commentariis depictam exhibet.*

CONFERT cephalalgicis, epilepticis, vertiginosis, hemicranicis, paralysis omnium membrorum, & omnibus frigidis ægritudinibus, tempore frigido nocentibus.

Michleta D. Nicolai.

℞. Myrobalan. citrinorum
Chebulorum

Indorum, omnium tostorum ana ʒ ij. β.
Myrobal. Bellericorum

Emblicorum tostorum ana ʒ ij.

Nasturtii tosti [*id est, seminis eius*] ʒ ij. β.

Cumini Anisi

Fœniculi Ammios

Carui ana ʒ j. β.

Omnia cruda terantur, & macerentur in aceto vini modico xxiiij. horis; exiccantur cum insperso aceto; postea torreantur supra prunas: tostis addantur subsequents:

Spo-

Spodii [*id est*, Eboris vsti]

Balaustiorum

Pulpæ Sumachii Mastiches

Gummi Arabici ana ʒ j. ʒ xy.

Omnia cum oleo rosato fricentur, & cōmisceantur cum Syrupi myrtini triplo.

Propriè valet ad hæmorrhoides, & ad ventris torsionem & rugitum lienterix, & dysenterix: & optima est omni solutioni ventris.

Electuarium de Baccis Lauri

D. Rhafis.

ʒ. Fol. Rutæ [siccorum] ʒ i.

Ammios Cumini Nigellæ

Ligustici [*id est*, seminis eius]

Origani Carui

Petroselini

Amygdalorum amarorum

Piperis nigri Piperis longi

Menthastri Dauci Acori

Baccarum Lauri

Castorei ana ʒ ij.

Sagapeni ʒ β.

Opopanacis ʒ iij.

Mellis despūmati triplū [i. l. j. ʒ iiij. ʒ vij.]

SAGAPENVUM corrupto nomine vocatur Serapinum in Pharmacopoliis.

VALET ad colicam & iliacam passionem; & doloribus intestinorum ex causa frigida vel ventosa confert.

E

Diasa-

Diasatyrion D. Nicolai.

℞. Testiculorum Satyrii recentium densi-
forum

Radicum Pastinacæ satiuę recentium

Radicum Secacul [*id est, Grietzelmorn*]

Nucis Indicæ Pincarum

* Pistaciorum ana ʒ xij. β.

Garyophyllorum

Zingiberis Anisi

Erucæ seminis

* Linguę auis [*i. seminis Fraxini*] ana ʒ v.
G xv.

Cinnamomi Caudarum Scincorum

Seminis Bulbi ana ʒ ij. β.

* Moschi G vij. β.

Mellis despumati optimi P iij.

SATYRION habet duas radices, unam solidam, alteram flaccidam; ex his tantum sumenda sunt densa & solida.

SEMINIS Bulbi. Bulbus vulgò non est cognitus: quare eius loco *Vertica* semen accipere licet.

SCINCORVM. Notandum est in primis non esse accipienda reptilia illa quadrupedia ex fossis, quæ nos vocamus *Vvassermolchen*, siue *Vvasser Eyden*; ut hætenus factitatum est. Veri autem Scinci iam denuò in copia offeruntur ex Alexandria Ægypti, quos à Materialistis expetant Pharmacopole in posterum.

POLLET contra vesicæ & renum imbecillitatem:

cillitatem: iis etiam auxilio est, qui urinam reddere nequeunt: venerem stimulat, eamque certa de causa cessantem, haud se-gniter restituit.

Diasatyrium aliud D. Mesue.

R. Secacul albi & mundi, & elixati in decocto Cicerum, quorum prima aqua in qua decoquebantur, sit effusa ℞ j.

Testiculorum vulpis [herbæ] ℥ viij.

Radicis Raphani ℥ iij.

Radicis Lophi plani ℥ ij.

Terantur hæ tres radices posteriores, & infundatur super eas lactis bubuli aut ouilli tantum, ut lac duos digitos emineat, adiiciendo Olei sesamini

Butyri recentis non saliti ana ℥ iiij.

Coquantur cum facilitate usque ad consumptionem lactis, & donec omnino remollitæ sint radices, & habeant iustam spissitudinem instar pultis crassioris: nam si aquæ quod in lacte & radicibus est, non consumatur, situm contrahit hoc medicamentum.

Postea affunde omnibus hisce prædictis radicibus

Mellis despumati optimi ℞ vj.

Succi Ceparum recentium ℞ j.

Coque omnia simul ad perfectam decoctionem, deinde ab igne depone, & insper-

ge subsequentium specierum minutissimum puluerem:

Caudarū Scinci, cū renibus & sumine, ʒ j.

Seminis Erucae Zingiberis

Been albi Been rubri

Linguae auis [*id est, seminis Fraxini arboris*]

Seminis Nasturtii Cinnamomi

Piperis longi Seminis Bauciæ

Seminis Napi

Pulpæ seminis Asparagi maximè recentis
ana ʒ iiij.

Confice cum eis : vltimò verò adiiciantur subsequentia:

* Pinearum mundatarum l j.

Fisticorum [*i. Pistaciorum mundatorū*] ʒ x.

* Cerebellorum passerum ʒ ij.

Confice & misce omnia optimè, & aromatiza cum

Moschi boni ʒ j.

RADICIS Raphani, videlicet satini, quam vocamus Rettich.

LUPH planum.] Duplex est Luph (*id est, Serpentaria,*) crispum scilicet & planum: Crispum folia habet diuisa & crispa; Planum verò lata & plana veluti Aron, unde utrique nomen inditum est. Vulgò autem apud nos caremus Luph, *id est*, vera Serpentaria: idèò eius loco accipienda sunt radices herba quam Aron vocant.

A TESTICULI vulpis] hoc loco non sunt accipiendi testes animalis, dicti vulpes; sed radices

dictes Satyrii siue Orchios, quæ habent similitudinem testiculorum vulpium. Vnde etiam nomen herba accepit. quæ in re quosdam turpiter errasse scio.

NAPVS est paruum, oblongum, densumque rapum : cuius sunt species plures, Bayerisch rublein, Stechrublein, Merseburgisch & Bortfeldisch rublein.

BAUCIA est Pastinaca sativa siue Carota: Ghelbenmoren Germani vocant.

FISTICVM siue Phisticum, idem est quod Pistachium siue Pistacium.

P. C. SCHOL.

Testiculi vulpis hoc loco.] *Cordus hinc Orchin cum Satyrione confundit, ut ritè inquit Franciscus Alexand. Quare Orchios dictio delenda est.*

VALET ad erectionem virgæ: multiplicat sperma, & desiderium coëundi.

Theriaca D. Andromachi, ex Actio.

R. Trochiscorum scilliticorum ʒ xlviij.

Trochiscorum de vipera, seu Pastillorum

Theriacorum

Trochiscorum Hedychroi Piperis nigri

Opii Thebaici recētis ana ʒ xxviij. [*al. 24*]

Rosarum siccarum Scordii Cretici

Seminis Buniadis agrestis Iridis Illyricæ

Agarici albi Pontici [*id est, in Ponto nati*]

E 3

Cinna-

- Cinnamomi Succi Glycyrrhizæ sicci
 Opobalsami [*loco eius olei Caryophyllorum*]
 ana ʒ xij.
 Myrrhæ Troglodyticæ
 Croci Cilicii Zingiberis
 Rheupontici [*id est, Rhabarbari*]
 Radicum Quinquefolii
 Calaminthæ montanæ Marrubii comarū
 Stœchadis cacuminum & foliorum
 Petroselini Macedon.
 Costi recentis [*videlicet veri, non adulterini*]
 Piperis albi Piperis longi
 Dictamni Cretici Turis masculi
 Schœnanthi [*id est, Iunci odorati floris*]
 Terebinthinæ Chiæ [*i. in Chio insula nata*]
 Casiæ fistulæ [*videlicet Casia lignea vera*]
 Spicæ Nardi ana ʒ vj.
 * Gentianæ radice Polii comarum
 Styracis calamitæ Seselios Massiliensis
 A Abrotoni Seminis Thlaspios
 Ammi Chamædryos comarum
 Chamæpityos comarum
 Hypocistidis succi Malobathri foliorum
 Spicæ Celticæ [*id est, Spica Romana*]
 Anisi Helladici [*hoc est cognomen Anisi, à regione, ubi optimum est*]
 Mei Athamantici [*vulgò Meu*]
 Fœniculi seminis (ni]
 * Sigilli Lemnii [*aut eius penuria Bali Arme-*
 Chalcitidis semiaffatæ
 Amomi racemi Acori radice

PhuPōtici [*accipe verū, quod in hortis colitur*]
 Carpobalsami Hyperici cacuminum
 Acaciæ liquidioris Gummi vermiculati *
 Cardamomi ana ℥ iiij.
 Dauci Cretici Galbani puri
 Opopanacis Sagapeni Persici
 Bituminis Iudaici [*id est, Asphalti*]
 Centaurii minoris comarum Castorii
 Aristolochiæ tenuis ana ℥ ij.
 Vini veteris odorati, quantum liquoribus
 & gummis dissoluendis satis fuerit.

Mellis despumati optimi triplum; hoc est
 ℞ xiiij. ℥. vj. vt sequetur paulo post.

Confice sic: Cinnamomum Crocumque
 (vt Aëtius vult) vnumquodque per se te-
 rito, & si voles etiam Rhabarbarū & Hedy-
 chroos Trochiscos: misce deinde inuicem
 optimè: postea reliquas herbas ac radices,
 & omnia arida similiter tūdito, semper si-
 milia cum suis similibus; aromata per se,
 ac reliqua etiam per se seorsum. Postea (si
 Aëtium imitari est animus) Crocum, Ca-
 siam, Cinnamomum, & Lemuiam terram
 in pila cū vino optimo tere atque vnito, ac
 reliqua omnia secundum artem addito; &
 melle despumato vniuersa excipito.

Ego verò ita præparare consueui, simili
 ferè ratione:

℞. Piper nigrum	Piper album
Piper longum	Iridem Illyricam
Zingiber	Costum

Amomum [*aut eius succedaneum*]

Acorum Cardamomum Carpobalsamum.

Incidenda minutim cōcidito , & in tenuissimum pulverem conterito , & per angustissimum cribrum excernito : postea in scatula diligēter, ne expiret , obstructa reponito, donec reliquis admisceas. Postea

℞. Radices Quinquifolii Gentianam

Meon [*aut eius succedaneum*] Phu

Dauci Cretici radicem [*aut eius succedaneū*]

Aristolochiæ tenuis radicem Rosas

Trochiscos scilliticos

Trochiscos de vipera

Scordium Calaminthen montanam

Marrubii comas Stœchadis comas

Dictamnium Creticum Schœnanthum

Polii montani [minoris] comas

Abrotonum Chamædryos comas

Chamæpityos comas

Nardum Celticam Hyperici comas

Centaurii minoris comas, atque

Castorium, & semina omnia;

Concidito omnia minutim, teritoque in tenuissimum pulverem , & per angustissimum cribrum excutito. Excussum pulverem prædicto quem reposuisti adiecito, diuque donec perfectè commisti sint , in mortario terito; adhibita diligenti cura, ne quid inter tundendum excernendumque pereat , aut temerè ponderi decedat : mox è mortario exemptum pulverem iterum ne expiret

exspiret reponito, vsque quò omnia conficiantur. Interea R̄ Agarici optimi albi-
fimi, atque in longa rectaq. capillamenta
fissilis, frustra electa: ab his scobē deradito
℥ ij. sed quia non facilè per se tunditur, ne-
que etiam cum aliis, propterea quòd in pul-
verem volatilem resolutus evanescit, ita vt
multum ponderi eius decedat; idèd ad sco-
bem Agarici prædictam infunde optimum
vinum, & fac Trochiscos minutos in tepi-
da umbra exiccandos: exiccatos minutissi-
mè contundito, atque per cribrum excer-
nito angustissimum: excreti deinde Agari-
ci cape pondus, quod requirit compositio,
videlicet ℥ xij. & prædicto pulveri sum-
ma diligentia commisceto: quo facto,

R̄. Opium

Succum Glycyrrhizæ

Myrrham Acaciam

Gummi Hypocistida.

Concidito omnia in minutas partes, &
mistis superinfundito vini optimi quātum
dissoluendis atque eliquandis succis satis
fore conieceris: exprimito: postea per ra-
rum colum liquefactam & modicè cale-
factam pulticulam colato, ita vt nihil præ-
ter sordes in colo remaneat. Quod si succi
& liquores isti sordidi & furculis foliisq.
pleni fuerint, ponderi eorum aliquid ad-
dendum esse facilè æstimare quis potest:
quod in sequentibus densatis liquoribus

Et etiam

etiam obseruandum est. Deinde

℞. Galbanum

Opopanacum & Sagapenum. hæc affuso optimo vino, modeste supra prunas dissoluantur, & perrarum lintheum fortiter exprimantur: his dissolutis,

℞. Tus masculum

Bitumen Iudaicum. terantur quàm minutissimè poterunt, addendo Terebinthinam, & sincerissimam, aut ex scobe ac sordibus expressam Styracem: dissoluantur lento admodum igne, cum mellis despumatisufficiēti copia; & ita calidam puliculam postea cum reliquis calentibus misceto, & diligenter rudicula agitato, ne rursus in grumos concrecant Tus & Bitumen, ubi refrixerint: quapropter aliquid de contusorum puluere est admiscendum.

Quòd si hoc modo dissoluere, & miscere diffidas, Bitumen & Tus vnà cum reliquis aridis tundito, & tantùm Styracem atque Terebinthinam dissoluito, atque melli despumato calenti admisceto. his factis,

℞. Cinnamomum

Malobathrum [*aut eius succedaneum*]

Casiam fistulam veram

Trochiscos Hedychroi

Spicam Nardi Indicam; & simul tundito in tenuissimum puluerem:

Postea

℞. Crocum

Rheon

Rheon siue Rhaponticum. (id est, quod hodie Rhabarbarum vocatur;) & vnumquodq; seorsum tūdito, deinde iis misceto Trochiscorum Hedychroi Cinnamomi Casiæ Spicæ Nardi Croci & Rhei Pontici, pulueres, diligentissimè:

Posteà

R. Mellis optimi & aromatici, quale è Lithuania Dantiscum affertur: despumetur sedulò; despumati postremò mellis sume ℥ xiiij. ʒ vj. ex eo modicum infunde in amplum alium ex aurichalco factum, & insperge paulatim commistos paulo ante Trochiscorum Hedychroi, Cinnamomi, Casiæ, Spicæ, Croci & Rhei Pontici pulueres; alternis vicibus, mel despumatum tepidum, atque pulueres iniiciendo: quæ diligentissimè interim pistillo ligneo agitata sunt. Cùm hæc optimè fuerint commista, & floridum puniceumque colorem contraxerint, iniicito Lemniam terram antea subtilissimè per se, deinde cum vino tritam, & vnà etiam Chalcitida assatam; quam hoc modo assabis: Accipe purissimæ Calcitidis circiter ʒ iij. eam in fictile non ita profundū iniectam, supra prunas ponito, donec liquefiat & bulliat: deinde ab igne auferto; & abiicito id quod in superficie durū est atq. rufescit, & ex medio eius sume ʒ iiij. & cum vino tritam atque

dissolutam medicamento admisce. Postea paulatim etiam infundito tepefactos liquores & succos quos antea in vino dissoluisti; alternis vicibus, succos, mel & reliquos pulueres, quos primò contriuiisti, iniiciens; simul etiam admisce Styracem Terbinthinamque & Opobalsamum; ita ut omnia exactissimè admisceantur: atque sigillatim mel & pulueres commisce, donec vniuersa vnita & in vnā substantiam redacta sint; assiduè agitando, ne grumi aliqui relinquantur, aut nodi.

Postquam verò optimè totam confectio-
nem miscueris, indito in vas ex densa ma-
teria factum, videlicet ex plumbo albo,
quod hodie stannum appellant: oportet
verò ut tertia aut quatta pars vasis relin-
quatur vacua, ut efferuescens medicamen-
tum attollere se queat, nec effluat. Rep-
onendum autem est hoc medicamentum,
donec feruescat, in tepido & sicco loco:
postquam verò subsederit, in frigido & sic-
co loco conseruandum erit. Porro ego hac
ratione præparauī Theriacen: alii verò
paulò aliter conficiunt. Sed omnium pessimè
faciunt, qui succos & liquores & reliqua
omnia simul tundunt, & postea rufum pul-
uerem impuro melli incoquant. Animad-
uertendum etiam est, ne vini plus quàm
opus sit liquoribus & succis dissoluendis
adfundatur. Nam si ultra modum vinū suc-
cis ad-

eis addatur, situm contrahet Theriaca: propterea etiam non cōsueui Casiam, & Crocum, & Cinnamomum vino permiscere, sed mel. nam aquosius est vinum nostrate: quod intelligentes quidam ex recentioribus, qui de Compositis medicamentis scripserunt, iubent pro vino accipere coctū mustum, hoc est, sapam, passum aut defrutum: quibus tamen non assentior. Nam hęc vina sunt spissiora, quàm vt in eis concreti atque densati succi, & liquores dissolui queant. Nam eius tantum rei gratia vinum Antidoto huic permiscere soliti sunt veteres, quos & nos imitabimur.

Hec descriptio est sumpta ex Aëtio: paulò post ponetur ea quam transtuli ex Graco carmine Andromachi senioris.

V I P E R A E serpentes sunt in Italia: inde etiam facti ex eis Trochisci petendi sunt.

T R O C H I S C I Hedychroi, inferiùs in Trochiscis describentur.

P I P E R I S nigri. *Andromachus senior, qui inuentor est huius compositionis, hoc loco habet P I P E R longum, in Carmine Elegiaco Graco.*

S C O R D I I Cretici. Optimum Scordium nascitur in Creta insula: nos interim nostrate utamur, satis efficaci. Porro verum Scordium herba est Chamadryi similis, odore aliquo Allii; & nullo modo Allium silvestre, ut hactenus magno errore crediderunt: nascitur in Saxonia, quemadmodum & circa Nurembergam.

BVNIAS, id est, *Napus* : quid verò sit *Napus*, dictum est in *Diasatyrio Mesua*, & antea etiam.

MYRRHAE *Troglodytica*. *Troglodyta* populi sunt *Arabibus* vicini : apud quos optima nascitur *Myrrha*.

OPOBALSAMO vero caremus : ideoq̃ eius loco accipiendum est succedaneum aliquod, veluti est oleum *Garyophyllorum*.

CROCI *Cilicii*, id est, in *Cilicia Asia* regione nati. & idem est quod *Crocus Orientalis*.

RHAPONTICVM hoc loco significat *Rhabbarum* : nam magna illa radix quam hodie *Rhaponticum* vocant, falsò hoc nomen habet.

COMAE sunt folia & flores plantarum.

PIPERIS longi. *Andromachus senior* hoc loco habet *PIPER* nigrum : Iunior verò *Andromachus*, id est, Senioris filius, ordinem nigri & longi *Piperis* inuertit; quem in hac compositione sequimur, paulo post etiam Senioris *Tberiacen* adscripturi.

DICTAMNVS *Creticus* folia habet alba, lanugine obducta, gustu acris ut *Thymus* : offertur rursum ex *Creta insula* ad nos.

CASIA fistula hoc loco significat *Casiam* ligneam veram, qua iam iterum offertur, est q̃ *Cinnamomo* similis.

POLIVM montanum duplex est : unum pluribus surculis fruticosum, ac humi sparsum : alterum candidius, & rectius se attollens. Maius nascitur apud nos ; minus offertur ex
Monta

Monte Pessulano: & ha sunt veri Polii species, & totam hiemem virent, ut *Laurendula* aut *Thymus*. Vulgò non habuerunt verum Poliam *Pharmacopola* usque ad hoc tempus.

STYRAX, id est, *Storax calamita*. Accipienda autem est hoc loco purissima eius resina in micas concreta.

SESELI, id est, *Sileris montani*. Dicitur autem *Massiliense*, à provincia *Massiliensi*, in qua prouenit optimum.

THLASPI est species agrestis *Nasturtii*, quæ passim nascitur secus vias, semine rufo, sapore acri & glutinoso: quod ut habeant diligenter curent *Pharmacopola*. Vocatur Germanicè *Voegecreffen*.

CHAMÆPITYS vera est *Iua*. herba est tenuibus foliis, floribus parvis & luteis: nascitur copiosè ad Rhenum in *Franconia*, in vineis & agris quiescentibus; præsertim *Spira*, *Vormacia*, & *Vuirzburghi*, & aliis locis.

MALOBATHRUM est *Folium Indum*, cuius succedaneum est *Spica tam Indica quàm Celtica*.

MEV, seu potius *Meum* non habemus: loco eius sumimus *Seseli Creticum*, id est, *Bervvurtz*, aut potius *Sison* hoc loco: inferius enim sequitur *Daucus Creticus*.

SIGILLVM *Lemnum*, id est, terra *Sigillata*, quæ signatur in *Lemno insula*, in qua effoditur hac terra: in cuius defectu sumatur bolus *Armenus Lemanticus*, [seu *Orientalis*.]

CHAL-

CHALCITIS hodie non à quouis cognoscitur: est autem Vitrioli natiui species. Hac qui carent, accipere possunt Vitriolum viride optimum, quale est Goslarianum in Saxonia. Porro Andromachus mihi videtur Chalcitida Theriaca miscuisse, nigri coloris gratia: qui color ab omnibus in Theriaca requiritur sine aliqua ratione. Mihi itaque videtur non necessariò eam addi. Nam horribili & eruginoso sapore totam compositionem inficit. At cùm ego aliquando in Theriaca compositionem non adiecissẽm Chalcitida, saporem gratiorem acquisiuit hoc medicamentum. Consulantur igitur hac de re Doctores Medici.

AMOMO vero caremus: eius loco accipimus Carpesium, aut Acorum verum, id est, nostrum Calamum aromaticum.

ACORVS verus, est illa radix quam hodie falsò vocant Calamum aromaticum.

ACACIA, succus est fructus ex arbore, & qua distillat gummi Arabicum. Loco eius accipimus siluestrium Prunellorum succum inspissatum.

GUMMI vermiculati, id est, Arabici gummi, quod concretum est in grumos vermium figura.

DAVCI Cretici vice accipere licet Seseli Creticum, id est, Beruvurtz; videlicet radicem eius.

SAGAPENVUM hodie vocant Serapinum; quod in Perside optimum provenit. Senior Androma-

dromachus Sagapeni habet ʒ iiij. -
Junior verò tantum ʒ ij.

ARISTOLOCHIA *tenuis, id est, Aristolochia nostra longa vulgaris.*

P. C. SCHOL.

Abrotoni] *hanc dictionem, in Aëtio à Cornario verso, non reperiò.*

Rhaponticum.] *Idipsum à Rhabarbaro differre, alibi diximus. Radix autem ista magna qua Rhapontici nomine in officinis passim prostat, Centaurium magnum Dioscoridis est.*

Chalcitis.] *Chalcitida commodè ac necessariò semper Theriaca immiscendam esse, unà cum L. Fuchſio, & Franc. Apolline censemus: Simulq; somnium esse, aruginosum & horridum eius saporem in Theriaca præceteris persentiri, ut imaginantur nonnulli, scimus & dicimus. Rationibus autem hæc aliâq; qua scholiis profero, confirmare, compendii egestas cum non permittat, in nostrum opus, si fauerint Superi, ea omnia asseruantur.*

Theriaca in omnibus antidotis ob multiplicem vsum potiores partes obtinet. Est enim famosa & salubris cõtragenera egri-tudinum plurima. Valet enim ad grauissimas passiones totius corporis humani: Epilepticis, catalepticis, apoplecticis, cephalalgicis, stomachicis, hemicranicis prodest. Ad raucedinem vocis, & constrictionem pectoris optima est: arteriacis, asthma-

asthmaticis, hæmoptoicis, icteris, hydro-
piciis, peripneumoniciis, iliosis, & vulnera in
intestinis habentibus: Nephriticis, calculo-
* fis & colicis subuenit. Menstrua educit, &
fætum mortuû expellit. Lepras, & variolas,
* & frigus periodicum, & cæteras passiones
inueteratas emendat. Præcipuè contra om-
nia venena & serpentium morsus & repti-
lium valet. Sed diuersa est eius dosis pro
quantitate & qualitate vniuscuiusque pas-
sionis. Omnem defectionem sensuum re-
leuat. Cor, cerebrum, hepar, stomachum
confortat. Totum corpus incorruptum du-
cit & custodit.

*Theriaca Andromachi Senioris, è car-
mine eiusdem elegiaco translata.*

℞. Trochiscorum Scilliticorum ʒ xlvij.
Trochiscorû Theriacorum Piperis longi
Liquoris Papauerini [*id est, Opii*]
Magmatis Hedychroi ana ʒ xxiiij.
Foliorum Rosarum siccarum
Iridis Illyricæ [*id est, Ireos*]
Cyanæ Glycyrrhizæ
Seminis Buniadis [*id est, Napi, vulgò Beye-
rische rublein*]
Scordii
Liquoris Balsami [*lococuius oleum Garyo-
phyllarum*]
Cinnamomi Agarici ana ʒ xij.
Myrrhæ

Myrrhæ Costi Croci Coricii
 Casiæ [*id est* , *Casia lignea vera* , aut *succedanei eius*]

Nardi Indicæ

Iunci Arabici [*id est* , *Schœnanthi*]

Turis [*videlicet masculi & electi*]

Piperis candidi Piperis nigri

Comarum Dictamni [*id est* , *foliorum & florum Dictamni Cretici veri.*]

Marrubii

Rhei [*i. quod hodie vocatur Rhabarbarum*]

Stœchadis

Petroselini [*id est* , *seminis eius*]

Calaminthæ [*i. Calaminthi montani tenui-*

Lachrymæ Terebinthi Libyftiadis (*folii*)

Zingiberis

Quinque folii [*i. radicum eius*] ana ʒ vj.

Polii [*videlicet montani & albi, quod è Lugdu-*
no affertur]

Chamæpityois

Styracis [*i. Styracis calamita, sincera & electa*]

Mei [*quod vulgò Meum vocatur*]

Amomi racemosi [*aut succedanei eius, ut su-*

Nardi Galaticæ [*id est* , *Celtica*] (*præ*)

Rubricæ Lemniæ [*id est* , *terra sigillata vera,*
aut Boli Armeni , ut suprà]

Phu Pontici

Chamedryadis Creticæ [*i. Chamedryos vera*]

Foliorū Malobathri [*eius loco ponatur Matis*]

Chalcitidis tōstæ

Radicis Gentiadis [*id est* , *Gentiane*]

Anisi

Anisi Succī Hypocistidis
 Fructus Balsami [*id est* , Carpopalsami ; pro
quo etiam succedanem surmatur, sicut supra
facta est mentio]

Gummi splendidi Seminis Fœniculi
 Cardamomi Indici [*id est* , minoris]
 Sefelios tenuis Lachrymæ Nigræ spinæ
 Thlaspios Hyperici Ammios
 Sagapeni ana ʒ iiij.
 Castorei Aristolochiæ tenuis .
 Seminis Dauci Bituminis
 Liquoris Panacis [*id est* , Opopanacis]
 Centaurii [*videlicet minoris*]
 Chalbanidis pinguis [*id est* , Galbani re-
centis & puri] ana ʒ ij.
 Confice cum vino & melle. Haftenus An-
 dromachus.

Vini autem tantum accipias , quantum li-
 quoribus & succis dissoluendis satis fore
 conieccheris, vt proximè dictum est. Mellis
 verò optimi accipe ℥ xiiij. ʒ iiij. ita detra-
 his Mellis ʒ iiij. de priori Theriaca , quia
 huic defunt Abrotoni & Acori ana ʒ iiij.

Confice autem & hanc Theriacam vt
 proximam.

*Andromachus, Neronis medicus, primùm con-
 didit medicamentum hoc : eiqꝫ declarationem
 heroicis carminibus descriptam, nuncupauit. Sed
 Galenus mutata forma , compositionem reddi-
 dit meliorem.*

TROCHISCI Theriaci , sunt Trochisci
 de vipo-

de vipera siue de Thiro, ut hodie vocant.

MAGMA hedychrom, i. Trochisci hedychroi, quos Aescenna vocat Alindaracaron: quorum compositionem in tractatu de Trochiscis inquire.

CYANEÆ, id est, Carulea vel nigra Glycyrrhiza, seu, ut hodie vocant, Liquiritia, quæ nigrum colorem habet. Intelligit autem Andromachus succum Glycyrrhizæ.

CROCVS Coricius, id est, in Corico Sicilia monte nati, hoc est, Croci Orientalis.

LACHRYMÆ Terebinthi Libystiadis, id est, Resina Terebinthina Libyca, in Libya Aphrica regione nata. Eius loco nos accipere possumus Laricis resinam, quæ ubique in Germania Terebinthina improprie vocatur.

MEI loco, quo caremus, possumus accipere Seseli Creticum, id est, Berwurtz; aut semen nigrum & odoratum, quod hodie vocant improprie Amomum, veteres autem Sison.

PHV Ponticum, non est Valeriana vulgaris, sed ea herba quæ in Hessia vocatur Theriacskraut, vel Gartenfeliunck.

MALOBATHRYM non habemus: eius loco accipe Spica Romana radicular, vel Spica Romana & Macis ana partes æquales, ut Arabes precipiant; vel Cassiam ligneam veram.

RADICIS Gentiadis, id est, Gentiane, à Gentio Illyrici rege sic appellata, qui eam primò inuenisse creditur.

GYMMI splendidi, i. mundi, sinceri & translucidi,

lucidi, videlicet Gummi Arabici cognominati.

NIGRA vel cerulea spina, est arbor quæ aliàs dicitur Spina Ægyptia : ex qua manat gummi Arabicum. Per lachrymam verò eius Andromachus intelligit succum eius, qui Aca-cia vocatur, & sit ex fructu siliquaceo huius spine : eius loco accipimus succum Prunellorum agrestium.

SESELI tenue, est Seseli Creticum, quod ex omnibus speciebus Seselios minimum & tenuissimum est. Germanicè vocatur Berwurtz. Potest tamen etiam vulgare intelligi.

DAUCVS, id est, Daucus Creticus. Hoc loco eius vice accipe semen Pimpinella nostratis, aut radices Seselios Cretici : nihil enim refert, quòd bis accipiantur in hanc compositionem. Est autem Seseli Creticum, quod Germ. vocatur Berwurtz.

ARISTOLOCHIA tenuis, est illa quæ apud nos nascitur, longa cognomento : cuius radices gracilitate sua & longitudine imitantur sarmenta vitium.

Theriaca Diatessaron D. Mesue.

R. Gentianæ Baccarum lauri Myrrhæ Aristolochiæ rotundæ ana ℥ ij.

Mellis despumati optimi ℥ iij. id est, ℥ xiiij.

DIATESSARON, hoc est, ex quatuor simplicibus composita.

ARISTOLOCHIA rotunda, non est illa
radix

radix quam nos *Holuvuriz* vocamus: sed alia
multò maior & tuberosa, intus solida, colore
buxi flava, odore & sapore similis *Aristolochia*
longa nostrati. Affertur ex Italia & Heluetia.

T H E R I A C A antidotus *Diatessaron* ad
affectus frigidos, tum cerebri, ut epilep-
siam, paralysem, spasimum cynicum: tum
ventriculi, ut inflationem, & ab ea dolo-
rem, tardam concoctionem: tum denique
hepatis, ut hydropem, cachexiam, obstru-
ctionem. Præterea morfui *Scorpionis*, &
potioni veneni confert.

*Mithridatium, ex Damocratis Græco
carmine in Latinam linguam
translatum.*

℞. Myrrhæ Arabicę Troglodytidis
Crocī Agarici Zingibetis
Cinnamomi Spicæ Nardi
Turis [*videlicet electi*]
Thlaspios ana ʒ x.
Seselios
Opobalsami [*aut oleum Garryophyllorum*]
Schœni [*id est, Squinanthi, ut hodie vocant*]
Stœchadis Terebinthinæ Chelbanæ
Costi [*videlicet veri & aromatici*]
Piperis longi Castorci Pentici
Succi Hypocistidis Stryacis bonæ
Opopanacis

Folii

Folii Malobathri recentis [*aut succedanei eius*] ana ʒ viij.

Cassæ nigre [*lignæ aut succedanei eius*]

Polii Piperis albi Scordii

Seminis Dauci Cretici

Fructus Balsami [*aut succedanei eius*]

Cypheos Bdellii ana ʒ vij.

Nardi Celticæ purgatæ Gummi

Petroselini [*id est, seminis eius*]

Opii papaueracei

Cardamomi Seminis Fœniculi

Gentianæ Foliorum Rosarum

Dictamni Cretici ana ʒ v. boni ponderis.

Anisi Arii

Acori [*sive Calami aromatici*]

Phu Sagapeni ana ʒ iij.

Mei Athamantici Acaciæ

Ventris Scinci [*videlicet veri*]

Fructus Hyperici [*id est, summitatum eius*]

ana ʒ ij. ʒ.

Vini quantum sufficit.

Mellis mensuram convenientem.

VINI quantum sufficit, id est, quantum satis est succis & liquoribus dissoluendis.

MELLIS mensuram convenientem.] In Græco est σὺμαρτερον, quod idem significat. Sint autem mellis optimi odorati & dispumati ℞ ix. ʒ viij. ʒ ij.

CIPHII sunt Trochisci qui ad odorem suffiuntur. eius compositio habetur in tractatu de Trochiscis.

NAR-

NARDVS Celtica, est Spica Romana. Purgata, id est, à paleis, terra & sordibus mundata. Radices eius tantum debent accipi.

ARIU, in Græco est Ἀρίον, id est, Arion, quod nomen apud nullum alium auctorem in Mithridatio scriptum inuenitur. Intelligit autem Damocrates per Arion, siue Arium, Aron, id est, Arum, quantum ego ratiocinari possum: nam Aron egregiam facit contra venenata medicinam.

ACACIA vera caremus: accipe ergo loco eius succum Prunellorum, diligenter spissatum; aut alium quendam, quem Doctores substituent. Nos inferius ponemus Acaciam succedaneam.

P. C. SCHOL.

Atii.] Afari potius legendum esse, ex Græcis nonnullis exemplaribus, existimo.

MITHRIDATICVM proximum est in qualitate & virtute Theriacæ, & parum differunt: nisi fortè quodd Theriaca est parum calidior, & potentior contra venena serpentum. Curat omnes passionēs capitis virorum vel mulierum, si fuerint ex frigidityte: & maximè melancholicis & timidis, epilepticis & hemicranicis confert, & dolorem supercilii patientibus & lachrymantibus oculis: & ad omnia capitis vitia vel aurium subuenit. Dentium doloribus & palato, & omnibus vi-

tiis oris & maxillarum medetur, si super locum dolentem ponatur, & itidem ad modum emplastri ponatur in temporibus, vnde fit discursio. Synanchen soluit. Apoplecticis, tussientibus, asthmaticis, hæmoptoicis, peripneumonicis, & omnibus doloribus qui intra corpus humanum fiunt, succurrit: Iliacis, dysentericis, & lientericis confert; si datur cum decoctione balaustiorum: Extensionem humerorum, tetanos siue spasmos patientes, & paralyticòs sine mora sanat: Diaphragmati & hypochondriis subuenit. Renibus & vesicæ opitulatur. Calculos frangit. Menstrua prouocat, omniaque vitia matricis excludit: Arthriticam atque Ischiasin patientibus, & podagricis singulare præsidium est. Præcipuè datur contra venena omnia. Venenatos morsus, siue rabidi canis, seu cuiuscunque reptilis, impositum siue bibitum, cum magna admiratione emendat. Quotidianariis & quartanariis etiam ante horam accessionis cum vino tepido datum, mirificè prodest.

*Mithridatium aliud, ut ex Cleopatro
& Antipatro, Galenus & Aëtius
exscripserunt.*

R. Myrrhæ ʒ vij. β. ∞ iiij.
Nardi tantundem

Croci

Croci	ʒ	vij.	℥	iiij.	
Opii	ʒ	iiij.	℥	ij.	β.
Styracis	ʒ	v.			
Cinnamomi	ʒ	vij.	℥	iiij.	
Castorei	ʒ	vj.	℥	j.	
Polii	ʒ	vj.	℥	iiij.	
Scordii	ʒ	vij.	℥	iiij.	
Zingiberis tantundem.					
Costi	ʒ	vj.	℥	iiij.	*
Piperis albi	ʒ	v.	℥	ij.	
Piperis longi	ʒ	vj.	℥	iiij.	
Seselios	ʒ	v.	℥	ij.	*
Abrotoni tantundem					
Petroselini [<i>videlicet seminis</i>]	ʒ	iiij.			
Dauci seminis	ʒ	vj.	℥	iiij.	
Casiae	ʒ	v.	℥	iiij.	
Turis	ʒ	vj.	℥	ij.	
Succi Hypocistidis	ʒ	vj.	℥	j.	β.
Nardi Gallicae	ʒ	iiij.			
Fœniculi seminis	ʒ	iiij.			
Nardi Indicæ	ʒ	iiij.			A
Acori [<i>aut Calami aromatici</i>]					
Phu Pontici		Sagapeni			
Fructus Balsami [<i>aut succedanei eius</i>]					
Hyperici					
Iridis Illyricæ [<i>id est, Ireos</i>]	ana	ʒ	ij.		
Rubricæ Lemniæ [<i>loco eius Bolus Lenanti-</i> <i>eus</i>]	ʒ	vj.			
Lumborum Scinci [<i>videlicet veri</i>]					
Cypheos	ana	tantundem	,	id est,	ʒ vj.
Acaciæ	Gummi	Cardamomi			
	F 2	Pele			

Pelecini ana ℥ ij.

Thlaspios ℥ vj. ∞ iiij.

Gentianæ ℥ iiij. Anisi ℥ iiij.

Rosarum siccarum ℥ iiij.

Mei Athamantici tantundem

Schœni [*id est, Squinanthi*] ℥ vj. ∞ iiij.

Opopanacis ℥ vj.

Galbani ℥ vj. ∞ iiij.

Opobalsami tantundem [*cuius loco, ut supra, oleum Garyophyllorum*]

Aristolochiæ [*videlicet rotunda vera*] ℥ j.

Hyssopi ℥ iiij.

Marrubii ℥ j.

Chamæpityos ℥ iiij.

Libanotidis ℥ v.

Terebinthinæ ℥ vj. ∞ iiij.

Mellis Attici quod sufficit.

Vinum ne addas. Hactenus Cleophrantus & Antipater.

Mellis autem despumati optimi & odorati sume ad totam confectio nem l' vij. ℥ vj. ℥ vj. Vinum ne addatur præcepit Cleophrantus: idè in aceto sunt dissoluendi liquores concreti, ut Sagapenum, Opopanax & Galbanum. Confice secundum artem.

M E L L I S Attici nobis copia non sit: idè que aliud, quod optimum fuerit, recipiendum erit.

Compositio hæc est valdè mendosa in ponderibus apud Aëtium: apud Galenum verò est emen-

est emendatior. Rursum simplicium numero aliqua desunt apud Galenum, quæ ex Aëtio confectioni huic restitui. Aëtius hunc Auctorem vocat Cleopatrum, Galenus verò Cleophrantem.

☞ Hic character significat obolum: est autem obolus pondus $\frac{1}{2}$ scrupuli videlicet dimidium: itaque vj. oboli faciunt 3 j.

NARDVS Indica hoc loco non significat Spicam Nardi Indicam, sed Malobathrum, id est, Folium Indum, quod Nardi est species, & in India gignitur. Aëtius propterea hoc loco pro Nardo Indica habet Phyllon, id est, Folium Indum, cuius loco accipe Cassiam ligneam veram, quæ Cinnamomo est similis; aut Macis & radicem Spica Romane ana 3 ij.

ACORI, id est, radicis quæ nunc improprie vocatur Calamus aromaticus.

PELECINI, i. seminis eius. In eius penturion accipe semen Nigella arvensis & cornuta. Est autem omnino similis vere Nigella: nascitur in agris.

LIBANOTIS hic non significat Rosmarinum, sed Angelicam siluestrem minorem. Nam plures sunt Libanotidis species. Semen autem eius accipi debet, quod Cachrys vocatur.

P. C. SCHOL.

Nardi Indicæ.] Galenus & Aëtius hic A non Nardi Indica, sed Fol. Malobathri legunt.

Mithridatium D. Andromachi.

℞. Glycyrrhizæ	ʒ	vij.	β.	ς	iiij.
Opii	ʒ	iiij.	ς		ij.
Castorei	ʒ	vj.			
Polii	ʒ	v.	ς		ij.
Costi	ʒ	v.	ς		ij.
Nardi Spicæ	ʒ	vj.	ς		ij.
Cassia [<i>videlicet vera</i>]	ʒ	v.	ς		ij.
Turis	ʒ	vj.			
Seselios	ʒ	v.	ς		ij.
Succi Hypocistidis	ʒ	vj.			
Acori [<i>id est, Calami aromatici</i>]	ʒ				ij.
Scordii [<i>videlicet veri</i>]	ʒ	vj.	ς		ij.
Folii [<i>loco eius sumatur Macis</i>]	ʒ	iiij.			
Gallii	ʒ	v.	ς		iiij.
Cypheos	ʒ	vj.	ς		ij.
Myrrhæ	ʒ	vj.			
Croci	ʒ	vij.	ς		ij.
Cinnamomi	ʒ	vij.	ς		ij.
* Styracis [<i>videlicet optima</i>]	ʒ	v.	ς		iiij.
Dauci seminis	ʒ	vj.	ς		iiij.
Zingiberis	ʒ	vij.	ς		ij.
Phu Pontici	ʒ	ij.			
Petroselini [<i>videlicet seminis</i>]	ʒ	iiij.			
	ς	iiij.			
Nardi Gallicæ	ʒ	iiij.			
Fœniculi seminis	ʒ	iiij.			
Nardi Indicæ	ʒ	iiii.			
Hyperici	ʒ	ij.			

Acacię

Acaciæ	ʒ	ij.	
Gentianæ	ʒ	iiij.	
Anisi	ʒ	iiij.	
Thlaspios	ʒ	vj.	∞ iiij.
Mei Athamantici	ʒ	iiij.	
Rosarum siccarum	ʒ	iiij.	
Gummi [<i>videlicet Arabici</i>]	ʒ	ij.	
Cardamomi	ʒ	iiij.	
Schœni [<i>id est, Squimanthi</i>]	ʒ	vj.	∞ ij.
Opopanacis	ʒ	vj.	∞ ij.
Opobalsami. [<i>sine olei Caryophyllorum</i>]	ʒ	vj.	∞ iiij.
Galbani	ʒ	vij.	
Scinci [<i>videlicet veri</i>]	ʒ	ij.	∞ ij.
Terebinthinæ	ʒ	vj.	∞ ij.
Vini Chii quod sufficit.			
Mellis Attici costi quod sufficit, hoc est,			
P	vj.	ʒ iiij.	ʒ ij.

FOLIUM duas res significat : Folium Nardi videlicet; aut Malobathrum, quod hic recipiendum est.

GALLION herba est multis minimisq; floribus luteis & odoratis. Est autem species Aspergula : Germanicè vocatur Ranritzen.

NARDVS Indica hoc loco non significat Malobathrum, id est, Folium; sed radicem Indice Nardi: nam Nardi partes tres olim in usu fuerunt; videlicet Radix, Folium & Spica. Antea verò præcepit in hanc compositionem sumendam esse Spicam Nardi, & Folium,

F 4 id est,

id est, Malobathrum: ideò necessariò hoc loco per Indicam Nardum intelligi radicem Indica Nardi.

Esdra antidotus, ex Aëtio.

℞. Amomi	℥ xij.
Florum Iunci odorati [<i>id est, florum Schœnanthi: eorum loco sume summitates Schœnanthi</i>]	℥ ix.
* Pyrethri	℥ vj.
Croci	℥ xxxvj.
Cinnamomi	℥ vj.
Myrrhæ Troglodyticæ	℥ xij.
Styracis calamitæ	℥ xvij.
Petroselinî	℥ iiij.
Seminis Dauci	℥ iiij.
Tragacanthæ	℥ vj.
Succi Hypocistidis	℥ ix.
Iridis Illyricæ [<i>id est, Ireos</i>]	℥ xv.
Seminis Fœniculi	℥ vj.
Bdellii	℥ ix.
Turis	℥ j.
Sulphuris vivi	℥ vj.
Seminis Hyoscyami albi	℥ xxvij.
Cassia lignæ [<i>aut succedanei eius</i>]	℥ ix.
Seminis Papaveris	℥ xxx.
Spicæ Nardi	℥ xij.
Seminis Rutæ	℥ iiij.
Seminis Ocimi	℥ iiij.
Rhois Culinarii	℥ lv.
	Seminis

Seminis Anethi	℥ vj.
Asari [<i>id est, radicum eius</i>]	℥ j.
Seminis Cardamomi	℥ vj.
Opii	℥ xxvij.
Euphorbii	℥ vj.
Piperis nigri	℥ xxx.
Rosarum siccarum	℥ ix.
Phylli [<i>id est, Folii</i>]	℥ xij.
Opobalsami [<i>sine olei Garyophyllorum</i>]	℥ xxiiij.
Ventris Mergi	℥ vj.
Iaceæ	℥ xij.
Lycii Indici	℥ xij.
Garyophylli	℥ xij.
Stercoris reperti in aluo Mergi	℥ vj.
Rheu Pontici [<i>i. Rhabarbari</i>]	℥ xij.
Mei Athamantici	℥ vj.
Floris Nerii	℥ iiij. ℞.
Terræ Cimoliæ	℥ xij.
Succi Artemisiæ	℥ xx.
Foliorum Seridis [<i>i. Cichoreæ</i>]	℥ ix.
Spicæ Celticæ	℥ xij.
Castorei	℥ iiij.
Costi	℥ xij.
Gentianæ	℥ xij.
Confectionis Hedychroi	℥ ix.
Anisi	℥ vj.
Sisonis	℥ xviiij.
Thymiamacis Ammoniaci	℥ xij.
Foliorum Citri	℥ xij.
Vini veteris odorati quantum satis	
℞ 5	fuert

fuerit succis & liquoribus resoluendis; Mellis despumati optimi, vt Aëtius scribit, interprete Cornario, libras v. aut vj. Sed nos singulis specierum vnciis ternas vncias mellis adiiciemus. Itaque sume mellis despumati odorati quàm optimi ℥vj. ʒ vij. ʒ ij β.

Arida omnia minutissimè contundito.

Opium verò & Myrrham, Hypocistidem, Bdellium, Lycium, Ammoniacum in vino dissoluito. Tragacantham deinde seorsum per se affuso vino dissoluito. Deinde omnia simul misceto, addendo etiam despumatum Artemisię succum. In vniuersum hanc confectiorem eodem modo conficies, quo Theriacam: & eodem modo dimittenda est vt efferuescat, non omnino repleto vase.

NICOLAUS Alexandrinus duas habet Esdra compositiones; alteram magna, alteram verò Hispaniensis cognomento: sed quia confusa & indigesta tantum sunt moles, & numerosis, & nulla harmonia coeuntibus simplicibus constat, ideò voluimus eas hic ascribere, his duabus eius receptis paulò exactius compositis contenti.

RHOIS Culinarii, id est, Sumach; videlicet pulpa eius, sine osseis seminibus.

PHYLLI, id est, Folii. Cuius loco pone Spica Romana, Macis ana ʒ vj.

TERRA Cimolia. Eius loco accipe Bolum verum preparatum.

SISON

SISON est semen illud nigrum quod Apio simile est ; & vocatur improprie Amomi semen.

THYMIAMA Hammoniacum, i. Gummi Hammoniacum, quod vocant Ammoniacum.

VENTRIS Mergi, id est, Stomachianis Mergi. Germanicè vocatur ein Taucher.

NERION, i. arbor Oleander : pro cuius floribus accipe radices Vincetoxici. Legitur etiam in Aëtio rosarum Rhododaphnes ; sed idem est quod flos Neri : idèò alterum tantum eorum posuimus.

Mirificè contra lethalia venena prodest : aliosque vsus multos habet, quos apud Aëtium libro 13. cap. 101. Paulum libro 7. cap. 11. Aëtuar. in libro De comp. medic. reperiēs.

Esdræ Antidotus ex Aëtuario.

R. Mameræ	℥	℥	j.	
Amomi [eius loco sume nostrum Calamum aromaticum]	℥	ij.		
Iunci odorati [id est, Squinanthi]	℥	β.		
Pyrethri	Θ	viiij.		
Croci	℥	j.		
Myrrhæ	℥	iiij.		
Styracis	℥	β.	Θ	ij.
Petroselini		Θ		iiij.
Tragacanthæ	℥	j.		
		F 6		Succi

Succi Hypocistidis ℥ iiij.
 Ireos ℥ β. ℥ ij.
 Seminis Fœniculi ℥ j.
 Folii [aut succedanei eius.] ℥ iiij.
 Radicis Ponticæ [id est, Rhabarbari]
 Rosarum siccarum Glycyrrhizæ
 Florum siluestris Punicæ
 Cinnamomi ana ℥ iiij.
 Nardi Celticæ ℥ j.
 Mellis despumati ℥ vi. ℥ ix. ℥ vij.

Myrrham & Hypocistidem in vino dissolue modico : Tragacantham verò per se etiam dissolue ; & confice secundum artem. Actuarius ponit absurdum conficiendi modum , quem non sequimur.

Materia loco sume Doronicum Romanum. Florum siluestris Punica, i. florum Balaustrorum.

C O N D I T A.

Caro Citri Cortices Citri Flores Citri
 Arantia integra Cortices Arantiorum
 Flores Arantiorum Limones.

Limones conditi frequenter pro Chebulis conditis venduntur. Sed facillè deprehenditur dolus. Nam Chebuli unum tantum magnum & lignosum habent nucleum ; Limones verò multa semina, &c.

(iani
 Chebuli Myrobalani Bellerici Myroba-
 Emblici Myrobalani Citrini Myrobalani
 Indi

Indi Myrobalani.

Omnes quinque Myrobalanorum species iam afferuntur ex India condite.

Nuces moschatę integrę, vt ex India afferuntur.

Iuglandes Citonia Mespila

Pyramoschatella Cerasa

Pruna siluestria Garyophylli

Piper in racemis, vt ex India affertur.

Calamus aromaticus [*id est, verus Acorus*]

Galanga Zingiber Enula campana

Secacul [*id est, Sifer: Germanicè Gritzelmorn, Clingelmorn*]

Eringium

Pimpinella [*nostra*]

Crethami [*agrestis radix.*]

C R E T H A M Y S *agrestis herba est, Eringii propemodum foliis: Germanicè vocatur Sichelmoren, & Sichelkraut: nascitur in agris pinguibus.*

Omnia diligenter Saccharo clarificato condiantur secundum artem.

C O N S E R V Æ.

Anthos [*id est, flos Rosmarini*]

Boraginis Buglossi

Cichorii Fumi terrę Lauendulę

Maioranę Melissę Menthę

Nymphę seu Nenupharis.

F 7

Primulę

*Primulae veris. Primula veris, idem est quod
herba Paralysis.*

Rosarum

Paeoniae

Violarum

Cardui benedicti

Liliorum conuallium

Florum Tiliae

Euphrasiae

Sambuci

Hyssopi

Acetosae

Betonicae

Scabiosae

Salviae.

Flores minutissime incidantur : & singulis libris florum addantur Sacchari albissimi librae duae ; videlicet qui humidi & mucilaginosi fuerint , ut Boraginis , Buglossi , &c. Siccioribus vero , quales sunt Anthos , Lauendulae , Maioranae , Melissa , Salviae , Menthae , & similibus , addantur Sacchari albissimi librae duae & semis.

Diacitonium simplex.

℞. Carnium Citoniorum vapore aquae dulcis resolutorum , & ad spissitudinem coctorum,

Sacchari albissimi despumati , & ad spissitudinem iustam cocti ana ℥ viij.

Coquantur ad solidam consistentiam ; & extendatur in tabulam feruens massa : refrigerata in partes incidatur. Quidam octo ℥ carniū Citoniorum addunt sex ℥ Sacchari clarificati.

Poteris etiam ita facere.

℞. Ci-

R. Citoniorum excorticatorum & ab interioribus mundatorum ℥ viij. Sacchari clarificati ℥ iij. Coque Citonia super vaporem aquæ dulcis : deinde vnà cum Saccharo ad iustam spissitudinem coque.

Peculiare remedium est fluxus, vel vomitus: quoniam stipticat [scu adstringit] & corroborat membra collapsa, debilia. Confortat stomachum, virtutem retentiuam & digestiuam: & summopere excitat gustum. Sed ad fluxum datur ante cibum; & ad vomitum compescendum, post cibum.

Diacitonium compositum

D. Nicolai.

R. Carnium Citoniorum comminutarum & coctura inspissatarum ℥ iij. Mellis despumati ℥ iij.

Coquantur simul ad iustam consistentiam: & postquam ab igne deposueris, antequam refrigerentur, insperge subsequentes species in tenuissimum puluerem contritas:

Cinnamomi	℥	j.	β.
Zingiberis	℥	j.	
Piperis			
Galangæ ana	℥	β.	
Garyophyllorum			
Nucis moschatæ ana	℥	iiij.	
Spicæ Nardi	Ligni Aloës	Macis	
		Carda-	

Cardamomi ana \mathfrak{z} ij.

Zedoariæ \mathfrak{z} j.

Extendatur tota massa in tabula marmorea, prius rosacea aqua inuncta, in qua aliquid Moschi dissolutum fuerit.

Et quando ut aluum soluat conficere volueris, antequam in tabula marmorea extendatur, in vnamquamque lib. adde Scammoneæ $\mathfrak{z}\beta$. quæ bene trita subigatur composito.

M E L habet Nicolaus : ego potius consulerem ut Saccharum loco mellis adderetur.

Quedam exemplaria habent Mellis lib. iij. Sed Nicolai exemplar, quod ad meas manus peruenit, habet lib. iiij. Nam necesse est etiam, ut species suum conseruatium habeant.

Hoc est calidius, & melius ad ea quæ diximus. Resoluit ventositates, remouet fœtorem corporis, restituit pristinum colorem; & magis restaurat.

Diacitonium è succo Citoniorum.

R. Succu Citoniorum despumati \mathfrak{f} xij.

Mellis optimi despumati

Sacchari albissimi clarificati ana \mathfrak{f} ij.

Coquantur simul ad iustam spissitudinem : deinde ab igne remotis & adhuc repentibus insperge subsequentium specierum puluëres minutissimè tritos, & per cribrum excussos:

R. Cinna.

℞. Cinnamomi
 Nucis moschatæ ana ʒ iiij.
 Garyophyllorum Zingiberis
 Galangæ ana ʒ ij.
 Radicularum Nardi Celticæ
 Piperis nigri Ligni Aloës
 Macis Zedoariæ Cubebarum
 Cardamomi ana ʒ j.
 Confice secundum artem.

S Y R V P I.

Syrupus de Duabus radicibus.

℞. Radicum Petroselini
 Radicum Fœniculi ana ʒ iiij.
 Aquæ quantum sufficit
 Sacchari clarificati ℥ ij.
 Coquantur secundum artem.
 VISCERA obstructione laborantia
 referat.

Syrupus de Quinque radicibus.

℞. Radicum Apii Radicum Fœniculi
 Radicum Petroselini Radicum Rusci
 Radicum Asparagi ana ʒ iiij. A
 Aquæ quantum sufficit.
 Sacchari ℥ iiij.
 Coquantur secundum artem.
 C O N-

CONFERT febribus pituitosis & biliosis, & iis incipientibus.

P. C. SCHOL.

A Ana \mathfrak{z} iiij.] Sacchari quod in hunc Syrupum recipitur, perpensa quantitate, nimiam non esse hic radicum cuiusque unciarum quatuor assumptionem, industriè Cordus existimauit; Euchsio quamquam secus videatur.

*Syrupus Acetosus simplex, ex
descriptione Mesuæ.*

R. Aceti vini P iiij.

Sacchari clarificati in aqua P v.

Coquantur secundum artem.

EST communis ad omnem materiam. Digerit choleram, phlegma & melancholiam: rationeque aceti attenuat crassos humores, incidit viscosos, duros mollit, ineptos euellit: vbique penetrat, oppilationes aperit, prouocat urinam, putredini resistit, & corrigit malitiam humorum: idcirco in febribus pestiferis iuuat: Sed ratione remissæ frigiditatis, tenues & subtiles humorum partes inspissat, adæquat calorem, refrigerat, viscera lenit, & sitim sedat.

*Syrupus Acetosus compositus,
D. Mesuæ.*

R. Radicum Fœniculi Radicum Apii
Radicum Endiuia ana \mathfrak{z} iiij.

Seminis

Seminis Anisi	Seminis Fœniculi	
Seminis Apii	ana	℥ i.
Seminis Endiviæ	℥	iiij.
Aquæ quantum sufficit.		*
Sacchari optimi	℞	iiij.
Aceti acerrimi	℞	ij.

Coquantur secundum artem.

BILEM crassam & auulso difficilem, ac pituitam incîdit, terget: obstructa hepatis, lienis, renum aperit.

Syrupus acetositatis Citri.

℞. Acetositatis mali Citrei per pannum A destillatæ ℞ vj.
Sacchari albissimi ℞ iiij.

Coquantur secundum artem.

RARO habent Pharmacopola Syrupum acetositatis Citri verum: nam plerumque venditur pro eo Syrupus Citreorum conditorum. Porro cum quis bene conficere voluerit, oportet ut per filtrum aut pannum destilletur acetositas Citreorum, sine ulla vi aut expressione: alioquin coagulatur, cum refrigerit, Syrupus.

P. C. SCHOL.

℞. Acetos. mali Citrei ℞ vj. &c.] ℞ viij. A Fuchsius, & Sacch. lib. v. legi vult. Verùm cum Cordus in hac Syrupi descriptione Mesuem non sequatur, ut conferenti liquebit, sed suo Marte eandem descripserit; frustra conqueri-

tur Fuchsius. Mesues autem nomen inscriptioni eius additum fuisse, ut & Syrupo de Agresta, scriptoris vitio id factum fuisse hinc liquet. Quare utrobique id ipsum à me deletum est.

Æs tvm ac feruorem bilis flauæ, febriumque ardentium & pestilentialium mitigat; sitim quoque vehementem restinguit.

Syrupus acetositatis Limonum.

℞. Acetositatis Limonum maturorum
per filtrum destillatæ ℥ vj.
Sacchari albißimi ℥ iij.

Coquantur secundum artem.

VEHEMENTIVS infrigidat & penetrat, quàm Syrupus acetositatis Citri: & valet contra putrefactionem, contra vermes, vehementiam caloris febrilis, & alios crudos humores.

Syrupus Aranciorum acetosorum.

℞. Succu Aranciorum acetosorum per pannum aut filtrum destillati ℥ vj.
Sacchari albißimi ℥ iij.

Coquantur secundum artem.

Ad hunc modum potest etiam fieri ex succo Aranciorum dulcium.

Syrupus.

Syrupus de Agresta.

℞. Agrestæ l' v.
 Sacchari clarificati l' iiij.

Coquantur secundum artem.

AGRESTA est succus uuarum immaturarum; qui Græcè vocatur *Omphacium*; & inspissatus seruatur. Hoc autem loco recipienda est *Agresta* nondum ad spissitudinem decocta.

Agresta exprimi debet ex generosissimis uuis, apud nos paulò ante maturitatem.

IN magnis æstibus ad sitim restinguendam mirificè confert: Vomitum & alui profluuium biliosum sistit: Febris biliosis succurrit: Gravidarum vomitum etiam reprimi, ac ventriculum earundem firmat: Venenisque aduersatur.

Syrupus de Pomis, D. Mesuæ.

℞. Succi pomorum dulcium
 Succi pomorum acetosorum ana l' v.

Coquantur, despumentur & colentur: deinde adde

Sacchari l' iiij.

Coquantur secundum artem.

Succus exprimendus est ex optimis pomis siue malis, qualia sunt quæ *Vveynlingen*, siue *Vveynsferulen* vocantur, in acetosorum genere. Ex dulcibus etiam sapidissima sunt eligenda.

COR

C O R imbecillum roborat : ob id syn-
copen & cordis tremorem sanat.

Syrupus Granatorum dulcium,
D. Mesuæ.

℞. Succi Granatorum dulcium l' v.
Sacchari albißimi l' iiij.

Coquantur secundum artem.

M A L E hodie faciunt Syrupum Granato-
rum, indifferenter cum dulcibus acetosa Gra-
nata miscentes. Oportet enim utrumque Syru-
pum tam acetosorum, quàm dulcium Grana-
torum seorsim conficere : nam diuersis morbis,
morborumq; accidentibus medentur.

S I T I M, tussim, & pleuritidem iuuat.

Syrupus Granatorum acetosorum,
D. Mesuæ.

℞. Succi Granatorum acetosorum l' v.
Sacchari albißimi l' iiij.

Coquantur secundum artem.

F E B R E S biliosas, & quæ ex pituitosis
flammam multam inuehunt, iuuat.

Syrupus Dinarii, siue Byzantinus
simplex, D. Mesuæ.

℞. Succi Endiuix Succi Apii ana l' ij.
Succi

Succi Lupuli

Succi Buglossæ domesticæ aut silvestris
ana l' j.

Succi depurentur, & despumentur, dum
maneant l' iiij.

Sacchari optimi l' ij. β.

Coquantur cum facilitate, donec fiat
Syrupus.

*Q V I D A M differentiam faciunt inter Sy-
rupum Dinarium & Byzantinum seu de Byzan-
tiis; alterum simplicem, alterum compositum
vocantes. Sed nos simplicis & compositi nomine
distinguiamus, utrumque Dinarium siue Byzan-
tinum appellantes.*

*HUMORES crassos & lentos incidit
atque extenuat: obstructions aufert; mor-
boque regio succurrit.*

*Syrupus Byzantinus compositus,
D. Mesue.*

℞. Succi Endiviæ veræ

Succi Apii ana l' ij.

Succi Lupuli

Succi Buglossæ domesticæ aut silvestris
ana l' j.

In succis decoquantur

Florum Rosarum ℥ ij.

Glycyrrhizæ ℥ iiij.

Seminis Anisi Seminis Fœniculi

Seminis Apii ana ℥ iiij.

Spicæ

Spicæ Nardī Indicæ ʒ ij.
 Colaturæ adde Aceti l' ij.
 Sacchari albissimi l' ij. ʒ.

Coquantur secundum artem diligenter.

SYRUPVS Byzantinus compositus, est
 efficacior simplici.

*Syrupus de Artemisia D. Ioan.
 Matthæi de Gradi.*

R. Artemisiæ M ij.
 Pulegii Calaminthæ
 Origani Melissæ
 Dictamni Cretici Perficariæ
 Sabinæ [*id est, Sauina*]
 Amaraci [*hic accipe Maioranam*]
 Chamædryos
 Perforatæ [*id est, Hyperici*]
 Chamæpityos [*id est, Iua arthritica*]
 Comarū Matricariæ Centauræ minoris
 Rutæ Betonicæ
 Buglossæ Radicum Fœniculi
 Radicum Apii Radicum Petroselini
 Radicum Asparagi Radicum Brusci
 Radicum Saxifragiæ [*eius loco accipiantur
 radices Pimpinellæ*]
 Radicū Enulæ Campanæ Radicū Cyperi
 Radicum Rubiæ tinctorum Radicū Ireos
 Radicum Pæoniæ ana M j.
 Baccarum Iuniperi Seminis Ligustici
 Seminis Petroselini Seminis Apii
 Seminis

Seminis Anisi Seminis Nigellæ

Carpobalsami [*aut succedanei eius*]

Costi Radicum Asari

Radicū Pyrethri Casię lignę aromaticę

Cordumeni Calami aromatici

Phu [*id est*, *radicis eius*] ana ℥ β.

Aquæ quantum sufficit Sacchari ꝑ̄ iiii.

Coquantur omnia magnâ diligentia, secundum artem, ne plus quàm necesse sit aromata bulliant.

Pro vulgari & falso Dictamno hic debet
poni Dictamnus Creticus; qui singulariter fa-
cit ad ea ad que Symplicius hic est compositus.

SAXIFRAGIAM Itali vocant eam her-
bam quam nos Pimpinellam appellamus : &
huius radix hîc debet accipi.

MEDATUR passionibus matricis, & retinet eam in proprio loco. Resolvit frigiditates, ventositates, & dolores. Corroborat nervos, aperit poros, sanguinem corrigit, menstruis imperat, & provocat.

Syrupus de Absinthio maior,
D. Mesuæ.

3. Absinthii Romani 1' 3.

Rosarum rubearum § ij.

Spicæ Indicæ 5 iiij.

Vini clari veteris & optimi

Succi Cydoniorum ana ℞ ij. β.

G Macc.

Macerentur in vase marmoreo aut fictili denso per noctem vnam ; deinde decoquantur.

Colaturæ adde Sacchari l' ij.

Confice secundum artem.

AB S I N T H I V M Romanum, idest, Absinthium Ponticum, gustu adstringens, & aromaticum : vulgare autem dicitur Rusticum Absinthium.

V E N T R I C V L V M roborat & iecur, aliâque instrumenta nutritionis, appetentiamque excitat, Contra regium morbum prodest. flatus discutit, humoresque per urinam pellit.

Syrupus Infusionis Rosarum.

℞. Infusionis Rosarum l' v.

Sacchari clarificati l' iiij.

Coquantur cum facilitate.

E S T conueniens ad extinguendam sitim in febribus acutis, & ad remittendum excessum caliditatis in eis, confortans stomachum relaxatum, & hepar supercalefactum, & cor: resistens putredini, conueniens tempore pestilentiae, & resistens venenositati.

Syrupus Infusionis Violarum.

℞. Infusionis Violarum l' v.

Sacchari clarificati l' iiij.

Coquan-

Coquantur cum facilitate.

FEBRIBVS acutis, iecinoris & cordis caloribus, asperitati gutturis, morbo laterali, tussique aridæ succurrit: Stimulæstinguit, aliumque emollit.

Infusio Rosarum Mesuæ.

R. Foliorum Rosarum ℥ j ponantur in vrceo angustiori, & infunde illis aquæ calidæ lib. iij. aut quantum sufficit, vt madden. Macerentur per horas viij. aut xij. obstructo fictilis orificio: deinde exprime leuiter, & excola infusionem, abiectis Rosis; & iterum inde recentes rosas, & infusionem excolatam calefac; & infunde rosas: ac obstructo orificio vrcei in calido loco dimitte per horas viij. vel xij. Postea rursus excola, & colaturam infunde aliis recentibus Rosis; & tertio dimitte. Et si efficaciorē facere volueris, etiamquarto recentes Rosas in eodem diluto recalefacto macera. Ac postremo, addito saccharo, Syrupum facito.

Porro quidam tundunt Rosas, quidam verò integras ponunt. Et tunc quidem celerius vim suam & colorem in aquam deponunt, ac minorem locum occupant. At Viola cum tunduntur, aliquam herbaceam & tediosam acrimoniam acquirunt, hoc est, sy kriigen einen grassenden geschmack im mund. Quare consulantur

hac de re Doctores medici.

*Hac infusio dicitur alio nomine Mucharus,
& Mucharum, siue ex Violis siue Rosis fiat.*

*Mesue tantum bis iubet Rosas infundi: me-
lius verò est ut sapius recentes abiectis subli-
tuantur.*

Infusio Violarum.

*Infusio Violarum eodem modo fit quo
Rosarum Infusio.*

Syrupus de Sueco Fumi terræ maior D. Mesue.

R. Myrobalanorum Citrinorum

Myrobal. Chebulorum ana ʒ xx.

Florum Boraginis Florum Buglossæ

Florum Violarum Absinthii

Cuscutæ ana ʒ j.

Glycyrrhizæ Rosarum ana ʒ iiij.

Epithymi Polypodii ana ʒ vij.

** Prunorum enucleatorum*

Passularum enucleatarum ana l ʒ.

Tamarindorum

Pulpæ Casiæ fistulæ ana ʒ ij.

Aquæ l x.

*Coquantur secundum artem ad tertiās:
deinde cola : & colaturæ adde*

Succi Fumi terræ depurati

Sacchari albißimi ana l iiij.

Coquan-

Coquantur lento igne ad iustam consistentiam, & repone.

Meum exemplar manu scriptum habet Prunorum ꝑ.ß. quemadmodum passule.

Syrupus Fumariæ maior ventriculum & hepar roborat, obstructions aperit: cati morbos, præcipuè ab humore falso vel vsto natos, vt psozam, lepram, impetiginem, serpiginem curat.

Syrupus de Mentha maior
D. Mesuæ.

℞. Succi Citoniorum muzorum
Succi Citoniorum dulcium
Succi Granatorum acetosorum
Succi Granatorum dulcium
Succi Granatorum muzorum ana l' j. ß.
In succis macerentur per horas xxiiij
Menthæ siccæ l' j. ß.
Rosarum rubearum ʒ ij.

Coquantur deinde cum facilitate, vsque ad medietatis consumptionem: colentur; & colaturæ adde
Mellis vel Sacchari l' ij.

Coquantur ad perfectionem: & cum reponis, atomatiza cum Galia moschata vera trita, & in sindone ligata, atque ex orificio vasis suspensa.

MUZORVM, id est, in vipi saporem
G 3 *acescen-*

acescentium : nam *muzus* sapor de dulcedine & acetositate aliquid habet.

Notandum est, si quis cum melle velit hunc Syrupum conficere, ut accipiat mel odoratum aromaticum, quale è *Dantisco* aduehitur: vel tale aliud; ut est quod vocant *virginium mel*, & *Saxones Kruthonich*, quasi aromaticum mel; & non illud vulgare, flatuosum.

Ventriculum frigidum roborat: ob id nauseam, vomitum, singultum, fluorem alui sedat.

Syrupus de Mentha minor
D. Mesue.

℞. Succī *Menthæ* depurati ℥ j.
Succī *Granatorum* dulcium
Succī *Granatorum* acetosorum, ad medic-
tatem coctorum

Sacchari vel Mellis ana ℥ j.

Coquantur sensim secundum artem.

In hoc quoque Syrupo notandum est, quod in proximo Syrupo de *Mentha* maiore diximus de melle.

Eandem ferè cum superiore facultatem habet.

Syrupus de Calamintha D. Mesue.

℞. *Calaminthæ* domesticæ
Calaminthæ silvestris ana ℥ ij.
Ligu-

Ligustici [*seminis scilicet*]

Dauci [*videlicet seminis eius*]

Schoenanthi ana ʒ v.

Passularum enucleatarum lʒ β.

Mellis lʒ ij.

Aquæ quantum sufficit.

Cōquantur secundum artem.

MEL cū additur huic Syrupo, tunc oportet esse optimum & aromaticum mel, ut antè etiam dixi. Idq; in omnibus Syrupis & Oxymelibus obseruandum est.

POTEST etiam cum Saccharo fieri hic Syrupus, quia pauci optimum & aromaticam mel emere & expetere consueuerunt.

DOMESTICA Calamintha, est quæ in agris & cultis locis nascitur: & vulgò vocatur Kornminze.

SILVESTIRIS autem Calamintha, est quæ in incultis locis & montibus prouenit, & appellatur Calamintha montana.

LIENOSIS plurimum confert, quibus durus est lien & pæne irresolubilis, & his qui frigida viscera habent, & asthmate laborant; præfertim in senibus, & in habentibus antiquas tusses. Si quis enim vel pectus, vel ventriculum, vel intestina crassâ, tenaci & irresolubili materiâ plena habeat, hoc Syrupo sanatur.

Syrupus de Sacco Endiuie simplex.

℞. Succu Endiuie depurati lʒ viij.

G 4

Sacchari

Sacchari Tabarzeth l' v. β.

Coquantur secundum artem.

ENDIVIA vera, est herba sativa, caulis, foliisque Cichorea similibus, maioribus tamen pinguioribusque; flores etiam similes sunt Cichorea. Allatum est semine eius ex Italia, & iam multis in locis apud nos seritur.

Valet principaliter ad omnes supercalefactiones hepatis, & aliorum membrorum nutritiuorum: & in morbo laterali maximè conuenit.

Syrupus de Endiuiâ compositus.

℞. Endiuiæ recentis Boraginis Scariole
Hepaticæ Melissæ Buglossæ Lactucæ
Eupatorii ana m. j.

Semen frigid. maiorum ana ℥ j.
Santali albi Santali rubri ana ℥ j.
Florum cordialium ana ℥ iiij.

Coquantur secundum artem, in sufficienti quantitate aquæ: deinde cola, & colaturæ adde

Succi Endiuiæ depurati l' j.
Vini Granatorum ℥ iiij.
Sacchari albi l' iiij.

Fiat syrupus secundum artem.

VALET præcipuè ad supercalefactiones hepatis, cordis, & aliorum membrorum nutritiuorum: & generaliter confert cuilibet complexionì calidæ; & est aperitiuus

ritius oppilationum, & confortativus membrorum debilitatorum à mala complexione calida: est etiam digestivus materialium cholericarum acutarum.

*Syrupus de Cichoreo cum Rhabarbaro,
Nicolai Florentini.*

℞. Endivię domesticę

Endivię silvestris. Cichorii

Taraxaci ana m ij.

Cicerbitę. Hepaticę Scariolę Lactucę

Fumiterrę Lupulorum ana m j.

Hordei non excorticati ℥ ij.

Vesicarię [*id est, Alkekengi*]

Glycyrrhizę Capillorum Veneris

Ceterach [*id est, Asplenii*]

Polytrichi Adianthos ana ℥ vi.

Radicum Fœniculi Radicum Apii

Radicum Asparagi ana ℥ ij.

Coquantur in aqua sufficiente, & percolentur; deinde cum Sacchari albi ℥ iiii fiat Sympus.

Pro cuius vnaquaque libra inter coquendum adiiciantur

Rhabarbari optimi ℥ iiij.

Spicę Nardi ℥ ij.

Colligato in linteolo raro; quod sæpe exprimatur, dum Sympus consistentiam iustam nanciscatur.

P. C. SCHOL.

A l' iij.] Hanc Sacchari quantitatem huic Syrupo esse indendam, eamq; abundè satis esse dicimus & censemus: quamquam Commentatorum nullus, quod sciam, huic multi vsus Syrupi pondus ullum exprimat, Colonienfium Dispensatoriolo excepto: quod cum l' v. & 3 viij. sumendas putat, medicamentum nimis imbecille tanta copia reddit: angente & malum, quòd Manipulos viridium herbarum (quales hic requiruntur) semunciales tantum, ut sunt puerorum, constituat.

B Caterum Spica 3 ij. hic quoque sufficere debent.

VALET contra omnem materiam venenosam, in alterando & mundificando eam, & propriè in anthrace & similibus: valet & in febre pestilentiali. Confortat cor & nutritiva, mundificat materias per urinam & secessum, & facit appetere cibum, ac inducit somnum.

*Syrupi è Cichoreo Nicolai Florentini, emendata descriptio
M. De Lobel.*

ET SI quorundam popularium medicantium, pharmacantium, ac medicastrosum fatali inscitia fallere solita, nulla monita in dignoscendis non contemnenda utilitatis, Seridis, sine Intubace; generis cunctis

cunctis familiis, audierit; ut non tantum Medicos doctissimos & pharmacopæos probos eluserit, sed etiam multis ansam dederit in hunc usque diem, magno agrotantium dispendio, parandi Syrupum à Cichoreo D. N. Florentini cum Rhabarbaro è solo succo Cichorei satiui, vel aliquot horum refrigerantibus temperatum herbis, quæ sanè instituto Nicolai Florentini minime respondebant (præscribitur enim eius Syrupus non modò ad refrigerandum hepatis & viscera, sed etiam tum ad hepatis, stomachi, splenis, aliorumque viscerum æstuationes ac inflammationes, tum ad referandas obstructions in febribus biliosis, & ad somnum conciliandum) veruntamen amicis quorundam petitionibus, (quia multi & quotidiani usus hic utilissimus Syrupus) neglectis herbarum confusis, ambiguis, & barbaris nominibus, eius secundum intentionem Nicolai, descriptionem sic castigamus, secuti ordinis seriem Rongalletii.

R. * Hordei integri ℥ iiij. A
Radicum Asparagi

Fœniculi

Paludarii [i. Apii Palustris] ana ℥ ij. B

Glycyrrhiæ ℥ j.

Intybi domestici vel satiui [id est, Endivia C
vulgatissima, latifolia, officinis vulgò Scar-
riola vocata]

Intybi sylvestris [i. Endivia silvestris officina-
ria, perperam recentioribus Lactuca silvest.]

Cichorei

Taraxaci [i. Dentis leonis] ana M ij.

Cicerbitæ siue Sonchi lenis

Hepaticæ siue Lichenis Lactucæ sativæ

Lactucæ silvestris soporiferæ Fumi terræ D

Lupulorum ana m j.

G 6

Adrian-

Adianthi [*sive Capillorum Veneris*]

Polytrichi

Asplenii [*sive Ceterach*]

Cassithæ ana ʒ vj.

Seminis Halicacabi [*sive Alkekengi*] ʒ iiij.

Si recens fuerit; alioqui sufficiet media quantitas.

Coquantur in aquæ & succi Cichorei æquis partibus in balneo aperto; deinde exprimantur, clarificentur, & syrupizentur in eodem balneo & vase lapideo aut vitreo; additis lib. iiij. paulo plus, minus, Sacchari albi.

Sub finem ebullitionis adduntur Rhabbari electi ʒ iiij. & Spicæ Nardi ʒ iiij. nodulo exceptorum & ligatorum.

* Preponuntur quæ diutius coquenda.

A ʒ iiij.] ex veteri exemplari cum Rordet. legimus.

B Palud.] magis aperit quàm Apium hortense.

C Intubi dom.] omnia exemplaria inserunt Scariolam: quæ tamen eadem est cum Endivia aut Intubo domestica.

D Lactuc. sil.] Lactucam agrestem officinæ Belgicæ Antuerpia facile sibi procurabunt; ubi semel sata maximo & importuno proventus luxuriat; potissimum in hortis nostris & optimorum pharmacopæorum Ioannis Coene, Oliverii Drijsch, & pia memoris P. Condekergi.

Oxyfac-

Oxysacchara simplex, D. Nicolai.

℞. Sacchari albi ℥ j.

Succi Malorum Granatorum acetosorum
℥ viij.

Aceti ℥ iiij.

Coquantur cum facilitate ad ignem in
vase stanneo, dum Syrupi crassamentum
adsiscat.Digerit materias cholericas phlegmati
mistas, quæ grauant stomachum & præcor-
dia, & faciunt tertianas duplas inordina-
tas, quas vocant erraticas, & similes quar-
tanis duplis.*Oxysacchara composita D. Nicolai
Præpositi.*

℞. Capillorum Veneris

Linguae ceruinæ [*id est, Phyllitidis*]Scolopendriæ [*id est, Asplenii*]

Polytrichi Hepaticæ Violarum

Radicum Fœniculi Radicum Rusci

Radicum Asparagi

Radicum Graminis ana ℥ j.

Hoc modo confice : In succo Malorum *
Granatorum, herbas & radices triduum
macerato : quarto die parum bullire fini-
to, cum forti expressione percolato. Po-
stremò cum Sacchari ℥ ij. ex arte, ad iu. *

ſtam craſſitiem concoquito.

Concalefacta corpora potum iuvat: longis febribus, quas ſanguis aut bilis creauit, & calori iecinoris auxilio eſt: & lienis obſtructiones tollit.

Syrupus de Iuiubis D. Meſue.

℞. Iuiubarum numero LX.

Violarum

Seminis Maluæ ana ℥ v.

Capilli Veneris Hordei mundati

Glycyrrhiæ ana ℥ j.

Seminis Cytoniorum

Seminis Papaueris albi

Seminis Melonum

Seminis Laſtucę

Tragacanthæ ana ℥ iiij.

Aquæ fontis ℔ iiij. aut q. ſ.

Sacchari ℔ ij.

Coquantur ſecundum artem.

S Y R U P U S iſte confert raucitati, tuſſi & pleuritidi.

Syrupus Violarum D. Meſue.

℞. Violarum ℥ ij.

Seminis Cytoniorum.

• Seminis Maluæ ana ℥ viij.

Iuiubarum

Sebeſten ana numero xx.

Aquæ

Aquæ Cucurbitæ quantum sufficit.

Sacchari ℥ j. ʒ.

Coquantur secundum artem.

CUCURBITA debet destillari cum adhuc est tenera, antequam induriscere incipiat.

Prodest pleuritidi & tussi à causa calida.

Syrupus de Succo Violarum.

℞. Violarum recentium iamiam lectatum quantitatem satis magnam, & decerpe ab iis purpurea foliola, & ab iis virides eorum cauliculos, quoniam herbaceam habent acrimoniam, & floridū colorem hebetant. Contunde deinde decerpta Violarum folia in mortario marmoreo, & exprime. mox

℞. Expressi succi ℥ ij.

Sacchari ℥ iiij.

SACCHARUM prius clarificetur, & ad iustam consistentiam coquatur: amoto deinde ab igne Saccharo, repseri finito, & succum infundito: & rursus lento igne ad spissitudinem coquito; & emicantem in coquendo spumam continuo auferto.

Quidam spumam non auferunt, ne color pereat. Sed cito corrumpitur cū spuma repositus.

Hic Violarum Syrupus in Misnia fit: præsertim Lipsiæ, ubi eum vocant Succum Violarum.

BILIS acrimoniam obtundit: ac ob lentorem thoracis vitiis est aptum.

Syrus.

Syrupus de Præssio D. Mesuæ.

- ℞. Præssii ℥ ij.
 Capilli Veneris
 Hyssopi ℥ j.
 * Calaminthæ Anisi Radicum Apii
 Radicum Fœniculi ana ℥ v.
 Seminis Maluę
 Seminis Fœnugræci
 Radicis Ireos ana ℥ iij.
 Seminis Lini
 Seminis Cytoniorum ana ℥ ij.
 Passularum enucleatarum ℥ ij.
 * Ficuum siccarum pinguium numero xv.
 Penidiarum l' j.
 * Mellis l' ij.
 Aquæ quantum sufficit.

Coquantur secundum artem.

M E L oportet esse aromaticum & optimum: potest tamen etiam cum Saccharo fieri.

Vitiis thoracis & pulmonis diuturnis, & à frigido tenaciq̃ humore excitatis, atque eradicatu difficilibus succurrit: hinc est quòd senibus & asthmaticis plurimum conducatur.

Syrupus de Glycyrrhiza, D. Mesuæ.

- ℞. Glycyrrhizæ rasæ ℥ ij.
 Capilli Veneris ℥ j.
 Hyssopi ℥ β.

Aquæ

Aquæ l' iiij.

Macerentur horis xxiiij. Deinde coquantur ad dimidias: colaturæ adde

Mellis optimi Penidiarum

Sacchari ana ℥ viij.

Aquæ rosarum ℥ vj.

Fiat Syrupus secundum artem.

Thoracem & pulmonem expurgat: ideoque diuturnæ tussi & pleuritidi auxiliatur.

Syrupus de Hyssopo D. Mesuæ.

℞. Hyssopi aridi Radicum Apii

Radicum Fœniculi Radicum Petroselinii

Glycyrrhizæ ana ℥ x.

Hordei mundati ℥ iiij.

Seminis Maluæ Seminis Cytoniorum

Tragacanthæ ana ℥ iij.

Capilli Veneris ℥ vj.

Iuiubarum

Sebesten ana num. xxx.

Passularum magnarum enucleatarum ℥ j.
℥ iiij.

Ficum siccarum

Dactylorum pinguium ana num. x.

Penidiarum albarum l' ij.

Confice secundum artem.

Ad vitia thoracis & pulmonis efficax est; humoresque excreatu difficiles extenuat & educit.

Syrupus

Syrupus de Eupatorio D. Mesue.

℞. Radicum Fœniculi Radicum Apii
 Radicum Endiuixæ ana ℥ ij.
 Glycyrrhizæ Schœnanthi
 Cuscutæ Absinthii
 Rosarum ana ℥ vj.
 Capilli Veneris Bedeguaris Suchahæ
 Florum aut radicum Buglossæ
 Anisi Fœniculi
 Eupatorii ana ℥ v.
 Raues Seni [*id est, Rhabarbari Orientalis*]
 Mastiches ana ℥ iiij.
 Spicæ Nardi Indicæ Asari
 Folii [*pro Folio pone Spicam Romanam*]
 ana ℥ ij.
 Aquæ quantum sufficit, aut l' viij.
 Succi Apii
 Succi Endiuixæ ana l' ij.
 Sacchari l' iiij.

Coquantur secundum artem.

Pro Bedegware & Suchaha, quæ hodie non cognoscuntur, licet accipere Carduum Benedictum, & Carolinam, id est, Cardopacia radicem.

Eupatorium, quod Mesue semper intelligit, est Gratiola, ut antè etiam dictum fuit aliquoties.

Frigidis iecinoris vitiis, ac eiusdem obstructionibus, aquæ inter cutem, ma-
 loque

loque corporis habitui succurrit. Humores enim crassos extenuat, roburque iecini adiiicit. Vrinæ mouet, & hypochondriorum tensionem demolitur.

Syrupus de Stœchade simplex.

℞. Florum Stœchadis ℥ xxx.
 Thymi Calaminthæ
 Origani ana ℥ x.
 Anisi ℥ vj.
 Passularum enucleatarum ℥ iiij.
 Aquæ quantum sufficit: coquantur secundum artem. Colaturæ adde
 Mellis optimi ℔ iiij. β.
 Condiatur cum
 Cinnamomi Calami aromatici
 Zingiberis ana ℥ j. β.
 Ligentur in findone, & in Syrupo suspendantur.

Syrupus de Stœchade compositus
D. Mesuæ.

℞. Florum Stœchadis ℥ xxx.
 Thymi Calaminthæ
 Origani ana ℥ x.
 Anisi Pyrethri ana ℥ vij.
 Piperis longi ℥ iiij.
 Zingiberis ℥ ij.
 Passularum enucleatarum ℥ iiij.
 Aquæ quantum sufficit
 Mellis

Mellis optimi ℞ v.

Coquantur secundum artem lento igne: colaturæ adde mellis prædictas ℞ v. & cum reponis, tunc condies sequentibus speciebus in sindone rara & munda suspensis.

℞. Cinnamomi Calami aromatici
Spicæ Nardi Indicæ

Croci Zingiberis Piperis nigri

Piperis longi ana ℥ j. ℞.

Contundantur grosso modo.

Ego in condiendo Syrupo de Stœchade utroque, pro Calamo aromatico malleim imponere Schœnanthum aut Galangam: nam vero Calamo aromatico iam caremus.

Iuuat omnes affectus frigidos cerebri & neruorum, vt paralyfim, epilepsiam, spasmus, spasmus cynicum, tremorem: ac ventriculū firmat.

Syrupus de Epithymo D. Mesuæ.

℞. Epithymi ℥ xx.

Myrobalanorum Citrinorum

Myrobalan. Indorum ana ℥ xv.

Emblicorum Bellericorum ana ℥ vj.

Cuscutæ

Fumiterræ ana ℥ x.

Thymi Buglossæ Calaminthæ

Glycyrrhizæ

Polypodii Agarici

Stœchados ana ℥ vj.

Rosæ

Rosarum Fœniculi
 Anisi ana ℥ ij. β.
 Prunorum num. xx.
 Passularum enucleatarum ℥ iiij.
 Tamarindorum ℥ ij. β.
 Aquæ quantum sufficit. *
 Sacchari ℞ iiij. Sapæ ℞ ij. *
 Coquantur secundum artem.

S A P A est mustum optimum ad tertias decoctum.

A T R A M bilem , & alios humores vstos vacuat : ob id morbos ex his nascentes , elephantiam , cancrum , vlcera maligna , fistulosa , pforam , lepram præcauet , curatque.

*Syrupus de Nymphaea D. Francisci
 Pedemontani.*

℞. Florum Nymphaeæ ℥ ij.
 Florum Ungulæ Caballinae aquaticæ
 Psyllii integri
 Acetosæ ana ℥ j.
 Seminis Cucurbitæ Seminis Citrulli
 Seminis Cucumeris
 Seminis Melonis ana ℥ iiij.
 Seminis Lactucæ Seminis Endiviae
 Seminis Scariolæ
 Seminis Portulacæ ana ℥ ij.
 Radicum Fœniculi ℥ j.
 Aquæ hordei quantum sufficit.

Sac-

Sacchari ℥ j.

Aceti albi

Succi Granatorum acetosorum ana ℥ ii.

Coquantur secundum artem : deinde aromatizentur cum

* Santali Citrini

Spicæ Nardi Indicæ ana ℥ j.

A *Due sunt Nymphaeae species : altera candidum, altera luteum florem habet ; & utriusque flores hunc Syrupum ingrediuntur. Nam Auctor huius Syrupi eam speciem, quæ albos habet flores, vocat Nenuphar ; alteram verò, quæ luteos fert flores, appellat Vngulam Caballinam aquaticam, à foliorum figura, & florum colore.*

SCARIOLA est species Endivia, quam nos in Germania vocamus Endiviam, (vulgò Gensdistel,) & habet spinulas in dorso foliorum.

P. C. SCHOL.

Vngula Caballina aquatica.] De Tussilagine hanc in propria sua significatione intelligi posse Fuchsius dextrè monet : apud aqua enim aut humentia loca plerumque nascitur.

BILIS fluxu feruorem extinguit: idcòque mirificè in ardentibus aliisque acutis febribus auxiliatur : somnum quoque conciliat.

Syrup.

Syrupus de Papauere simplex
D. Mesua.

*

℞. Capita Papaueris albi recentia
 Capita Papaueris nigri recentia ana ꝓ lx.
 Aquæ pluuiæ ℥ iiii.

Coquantur vsquequò remaneat tantum
 aquæ ℥ j. β. Colaturæ adde

Sacchari & Penidiarum ana ꝓ vj.

Fiat Syrupus secundum artem.

Valet ad catarrhum & tussim, causam
 insomniæ.

Syrupus de Papauere compositus,
D. Mesua.

℞. Papaueris albi
 Papaueris nigri ana ꝓ l.
 Capillorum Veneris ꝓ xv.
 Glycyrrhizæ ꝓ v.

Iuiubæ numero xxx.

Seminis Lactucæ ꝓ xl.

Seminis Maluæ

Seminis Cytoniorum ana ꝓ vj.

Coquantur in ℥ iiii aquæ vsque ad duas;
 & cum Sacchari & Penidiarum ana ꝓ viij

Fiat Syrupus secundum artem.

VALET ad tussim siccam, phthisin,
 catarrhum, insomniæ causam.

Syrupus

Syrupus de succo Myrtillorum.

A ℞. Succi Myrtillorum depurati ℥ viij.
Sacchari clarificati ℥ iiij.

Coquantur secundum artem.

Curandum est ut adferatur ex Italia, aut Narbonensi Gallia Myrtillorum succus, si quis volet hunc Syrupum conficere.

P. C. SCHOL.

A ℥ viij.] *Cùm hic Syrupus à Mesues, cui erroneè à Cordo adscribebatur, diversus sit, atque à Cordo ipso forsan concinnatus; malè legi hic ℥ viij Fuchsius temerè scribit.*

SYRUPUS Myrtillorum ventriculum & viscera roborat: ob id fluorem alui antiquatum sistit; & tussim mitigat.

Syrupus Myrtinus compositus.

℞. Myrtillorum 3 xx.

* Rosarum Santali albi

A Sumach Balauftiorum

* Berberis ana 3 xv.

* Mespilorum 3 l.

* Succi Granatorum acidorum vel mureorum

Succi Pomorum agrestium ana ℥ ij.

Omnia in dictis succis & aqua q. s. coquantur, & fiat Syrupus cum

* Sacchari ℥ iiij. secundum artem.

P. C.

P. C. S C H O L.

Rosarum.] Rosas Fuchsius rectè addit, & Cordo neglectas; simulq; ana ʒ xv legendum, & ʒ L, atque Sacchari ʒ iij, dextrè ait, ubi Cordus ʒ xxx, & ʒ C, ac Sach. ʒ v, nimis scripserat. Interim in aqua ʒ viij coquit Fuchsius; & succi Granatorum ac Cylonorum ana ʒ β. tantum addit.

Hic Syrupus sistit ventris fluorem, etiam antiquum, & secretum sanguinis.

*Syrupus de succo Acetosæ,
D. Mesuæ.*

℞. Succi Acetosæ depurati ʒ iij.
Sacchari clarificati ʒ ij.

Coquantur secundum artem.

FEBRIBVS biliosis & pestilentialibus saluber est: cordis & ventriculi flammæ calorem extinguit, ipsaq; roborat.

Syrupus de Sacco Boraginis.

℞. Succi Boraginis depurati ʒ viij.
Florum Boraginis recentium ʒ j.

Quam modicè efferveant, aut potius horis aliquot in succo clarificato ac calido macerentur; dein colentur, cumq; Sacchari ʒ iiij. fiat Syrupus.

H S Y C-

Syrupus Boraginis prius est clarificandus cum albuminibus ouorum; alioquin plus satis mucilaginosus fieret Syrupus.

P. C. SCHOL.

Stolidos cum his descripsisset Cordus huius & sequentis Syrupi conficiendi modos, ego eosdem suo nitori ex arte reddidi. Fecissem quidem & aliis locis quamplurimis, nisi falcem in alterius messem indere penitus, minimè consultum visum fuisset.

COR ipsum roborat, eiusque tremorem & syncopen sanat: maniacos & melancholicos iuuat.

Syrupus de Succo Buglossæ.

Rx. Succi Buglossæ depurati ℥ viij.

★ Florum Buglossæ recentium ℥ j.

★ Sacchari ℥ iiij.

Fiat eodem modo quo præcedens.

Intelligo hic eam Buglossam qua vulgò in usu est, non illam italicam maiorem.

Succus Buglossæ difficulter exprimitur: nam fit mucilago, dum tunditur Buglossa. idèo tusa dimittenda est per noctem in frigido loco; & postridie exprimendus succus, atque cum albuminibus ouorum clarificandus.

COR confortat, lætitiàmque generat.

Syrupus de Lupulo.

★ Rx. Succi Lupuli depurati ℥ ij.

Succi

Succi Fumiterræ depurati ℥ j.

Sacchari ℥ ij.

★

★

Coquantur secundum artem.

Potest etiam hic Syrupus fieri è solo Lupuli succo, ut Mesue placet in capite De speciebus Volubilis. Exprimendus autem est Succus Lupuli cum adhuc tenera sunt eius viticula & asparagi.

Refrigerat, & collectionum impetus lenit. Bilem regio morbo laborantibus detrahit, pituitam in aqua inter cutem exigit per aluum.

Iuleb Rosatum.

R. Aquæ Rosarum ℥ iiij.

Sacchari clarificati ℥ ij.

Fiat cum diligentia secundum artem.

FEBRIVM, thoracis, & ventriculi incendium, caloremque flammeum extinguit: sitim inexpletam sedat.

Iuleb Violatum.

R. Aquæ Violarum ℥ iiij.

Sacchari clarificati ℥ ij.

★

Coque vt Iuleb Rosatum.

Febres, phlegmonas, pleuritidem, asperitatem gutturis & thoracis, ac tussim mitigat.

Mina Cytoniorum simplex,
D. Mesua.

℞. Succi Cytoniorum depurati ℥ xij.

Coquantur ad medietatem, & affunde

A Vini veteris optimi ℥ v.

* Sacchari ℥ iij.

Coquantur secundum artem.

P. C. SCHOL.

A Vini ℥ v. Sacchari ℥ iij.] *Cordum hic*
Vini ℥ viij. Sacch. ℥ xij. perperam legentem, &
Fuchsius quoque animadvertit. quare veram
utrobique lectionem reposui.

VENTRICULUM roborat, & cibum
 in eo continet.

Mina Cytoniorum aromatica,
D. Mesua.

*

℞. Succi Cytoniorum acetosorum ℥ xx.

Vini veteris optimi ℥ x.

Mellis despumati optimi ℥ vj.

Potest tamen etiam cum Saccharo fieri.

Coquantur ad perfectionem; & aroma-
 tizentur in sindone ligatis sequentibus:

Cinnamomi electi

Cardamomi minoris [al. maioris] ana
 ℥ iij.

Garyophyllorum ℥ ij.

Zingiberis Mastiches ana ℥ j. β.
 Croci

Croci ʒ ij.
 Xyloaloës Macis ana ʒ j. β.
 Moschi ʒ j. ✱
 Gallix moschatax veræ ʒ ij.

Fiat secundum artem.

Mellis loco Saccharum sumi potest. ✱

VENTRICULUM, hepar, & cætera viscera roborat : appetentiam excitat, coctionem iuvat : vomitum & lienteriam sedat.

Mel Rosatum D. Mesue.

℞. Rosarum rubearum nondum penitus
 apertarum ℥ ij.
 Mellis optimi ℥ vj.

Coquantur lento igne secundum artem.

STOMACHUM confortat & mundi-
 ficat, & est digestivum materialium
 phlegmaticarum in stomacho & meseraï-
 cis contentarum.

Mel Rosatum aliud efficacius.

℞. Foliorum Rosarum rubearum nondum
 explicitarum contusorum ℥ ij.

Coquantur in aquæ cælestis ℥ iiij.

Colaturæ fortiter expressæ adde

Succi Rosarum rubearum depurati

Mellis optimi despumati ana ℥ iiij.

Coquantur secundum artem.

H 3

Oxy.

Oxymel simplex D. Mesue.

℞. Mellis optimi despumati ℥ iiij.

Aceti vini acerrimi

Aquæ clarissimæ ana ℥ ij.

Mel cum aqua despumetur iterum diligenter: & cum aqua fuerit consumpta, tunc adde acetum; & coque secundum artem.

HVMORES crassos, lentos ac pituitosos incîdit, extenuat, abstergit, atque adedò obstructions aufert, sputum educit, spiritumque faciliorem reddit.

Oxymel compositum, Mesue.

℞. Radicum Fœniculi

Radicum Apii ana ℥ iiij.

Radicum Petroselini Radicum Rusci

Radicum Asparagi Seminis Apii

Seminis Fœniculi ana ℥ j.

Coquantur in aquæ claræ ℥ vj. aut quantum sufficit.

Colaturæ adde

Aceti acerrimi ℥ j.

Mellis optimi despumati ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

HVMORES crassos & pituitosos incîdit, extenuat & abstergit: obstructions tollit iecinoris, lienis ac renum: vrinam mouet, sudoremque euocat.

Oxymel

*Oxymel Scilliticum simplex**D. Mesua.*

℞. Mellis despumati ℥ iij.

Aceti scillitici ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

HYMORES crassos, lentos, auulso contumaces separat & incîdit: ob id confert ventriculi & aliorum viscerum affectibus hos humores sequentibus: ructum acidum sanat, & vesicæ mollicationem, seu vrinæ incontinentiam. Asthmaticis quoque prodest.

Oxymel Scilliticum compositum.

℞. Radicum Apii

Radicum Fœniculi ana ℥ iij.

Radicum Petroselinî Radicum Rusci

Radicum Asparagi Seminis Apii

Seminis Fœniculi ana ℥ j.

Coquantur in aquæ ℥ vj. aut q. s. Deinde colentur:

Colaturæ adde

Aceri Scillitici ℥ j.

Mellis optimi despumati ℥ ij.

Fiat secundum artem.

Id potentius multo incîdit, tenuat, terget, obstructa aperit in diuturnis quartanis & quotidianis, quàm Oxymel compositum de radicibus.

H 4

Mel

Mel Anacardinum Azaravii.

℞. Anacardos recentes, terantur, & in aqua coquantur, donec melliginem quandam in rubeo colore fuscā emittant: eam aquæ innatantem auferro, & reponito.

Mel Emblicorum.

Mel Emblicorum, est mel in quo Emblicæ Myrobalani sunt conditi.

Alii ita vocant Emblicorum decoctum, ad mellis consistentiam inspissatum.

Mel Passularum.

℞. Vuarum passatum ℞ iiij. Infundantur eis aquæ ℞ xij. aut q. s. & macerentur horis xxij. deinde coquantur ad remanentiam tertię partis. Colentur, & colatura decoquatur ad crassitudinem mellis, & reponatur. hoc decoctum vocatur Mel passularum.

SYRVPORVM TRES SEQVENTES
VALERII CORDI DESCRIPTIONES
NUPER PRIMVM ACCESSERVNT.

Syrupus de Pyris Valerii Cordi.

℞. Succi Pyrorum moschatellinorum
Succi

Succi Pyrorum Palatinorum

Sacchari clarificati ana ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

Et quoniam Pyra Moschatellina citius
maturescunt, expressum eorum succum
clarificatum cum Saccharo decoctum re-
pones, donec etiam Palatina maturescant.
denum miscebis.

Syrupus de Cichorio Val. Cordi.

℞. Rad. Fœniculi Cichorii ana ℥ iiij.

Linguae ceruinę Scolopendrii

Capillorum Veneris

Trichomanes ana m j.

Aquæ Cichorii Succi eiusdem ana ℥ iiij.

Coquantur omnia secundum artem.

Colaturæ adde Sacchari clarificati ℥ iiij.

Et species sequentes petiæ illigatas
suspende in Syrupo:

℞. Rhabarbari ℥ ij.

Rad. Spicæ Romanæ ʒ j.

Fiat Syrupus.

Syrupus Refectivus, Val. Cordi.

℞. Dactylorum enucleatorum

Ficum siccatum pinguium

Xyloceratiorem enucleatorum

Vuarum Cubebarum passarum

Vuarum passarum vulgariū maiorum &
minorum

H 5 Tama-

Tamarindorum enucleatorum ana ℥ iij.

Musti generosi recentis

Succi Cydoniorum ana l' vj.

Incidantur fructus in partes, Passulæ minores & Xyloceratia modicè contundantur, vnumquodque per se. Deinde misceantur omnia, & in fictili denso affundantur eis succus & mustum, mace- renturque horis xxiiij. Postea coquantur lento igne ad consumptionem tertiæ par- tis, aut ampliùs.

Colaturæ affunde lactis Amygd. cum aqua rosacea l' ij. ex vna libra Amygdala- rum dulcium tritarum expressi.

Clarificetur deinde cum albuminibus ouorum xij.

Huic decocto clarificato adde Sacchari clarificati l' iij.

Coquatur ad perfectionem: & cum repo- nis, tū suspende in Syrupo sequētes species crassiusculè tritas, & in sindone ligatas:

℞ Cinnamomi interioris optimi

Macis Nucis moschatæ

Cardamomi Zingiberis

Galangæ Zedoariæ

Garyophyllorum ana ℥ ij.

Ligni Aloës ℥ iij.

Huiusmodi dilutum vel decoctum fructuum horum, vel alicuius eorum, vocant Arabes Nabuch; quo vtuntur pro vino & melle in ca- lidis regionibus.

H V N C

Hunc Syrupum composui diuitibus quibusdam in chronicis morbis, omnem cibum & potum auersantibus: & compendi mirum in modum vires reficere, alere, & iam desperatos, refocillatis viribus, sanitati restituere.

R O B.

Rob de Ribes simplex.

℞. Succī Ribes ℥ viij.

Coquatur per se ad spissitudinem mellis, & reponatur.

Rob de Ribes Compositum.

℞. Succī Ribes ℥ iiiij.

Sacchari optimi ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

VENTRICULUM firmat, vomitum biliosum reprimit, sitim restinguit, aliasque excretiones biliosas sistit.

Rob de Berberis simplex.

℞. Succī Berberis ℥ viij.

Coquatur per se usque ad mellis spissitudinem.

Rob de Berberis compositum.

℞. Succī Berberis ℥ iiiij.

H 6

Saccha-

Sacchari optimi ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

R o b ex Oxyacantha, seu de Berberis, easdem quas præcedens facultates obtinet.

Rob Nucum, D. Mesua.

℞. Succi Corticū viridiū iuglandiū ℥ iiij.

Mellis optimi ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

Destillationi tenuium humorum à capite, & inflammationem excitantium confert.

Diamorum, descriptione Nicolai.

℞. Succi Mororum Celsi ℥ β.

Succi Mororum Rubi ℥ j.

Mellis optimi despumati ℥ j.

Sapæ ʒ iiij.

Coquantur secundum artem.

Contra depascentia oris vlcera, ad dentium affectus & gingivarum noxas, atque ad omnia oris vitia gargarizatum proficit.

Diamoron aliud, D. Val. Cordi.

℞. Succi Mororum Rubi

Succi Mororum Rubi Idæi

Succi Mororum Celsi, siue de arbore,

Succi Fragorum ana ℥ ij.

Mellis despumati optimi ℥ iiij.

Coquan-

Coquantur lento igne secundum artem.

M O R O R V M omnium succus exprimens est antequam perveniant ad maturitatem. Porro Mora Rubi Idæi & Fraga citius maturescunt, quàm alia : idèò oportet, ut horum Succus colligatur, & cum Saccharo decoctus reponatur, donec alii maturescant. Sint autem succi uniuscuiusque ℥ ij. Sacchari ℥ j. ad quantitatem eorum, id est, Sacchari ℥ ij.

R V B V S Idæus est ille Rubus, quem nos vocamus Himpen : eius mora sine fructibus vocatur Himpeer.

*Medulla sine Pulpa, seu Rob
Cerasorum.*

R. Cerasorum acetosorum quantum volueris : coque per se, sine humore aliquo, & per cribrum setaceum manibus exprime, & ad spissitudinem iustam coque ; ac sine Saccharo repone, ut medullam Prunorum. Poterit qui volet etiam cum Saccharo conficere.

Diamarenatum simplex.

R. Amarena Cerasa quantum libuerit, & cum modico vino coque : cocta per cribrum manibus exprime : expressam deinde pulpam ad spissitudinem coque ; & deinde

℞. Inspissatæ pulpæ ℥ xij.

Sacchari clarificati & inspissati ℥ viij.

Confice secundum artem.

AMARENÆ sunt magna Cerasa, gustu
vinosa, quæ Germanicè vocantur Amarellen,
Ammerlinghe, & Amelber.

Diamarenatum compositum.

℞. Diamarenati simplicis iam confecti,
& adhuc calidi ℥ iiij.

Cui insperge sequentes species, in mi-
nutissimum pulverem tritas:

℞. Cinnamomi

Nucis moschatæ ana ʒ j.

Zingiberis Galangæ ana ʒ iiij.

Cardamomi Garyophyllorum

Macis Ligni Aloës ana ʒ ij.

Confice secundum artem.

Ad hunc modum potes etiam facere con-
fectiones ex Cynosbatis, & Cornis, hoc
est, Corni fructibus.

L O H O C H.

Lohoch sanum & expertum,

D. Mesue.

℞. Cinnamomi Hyssopi

Glycyrrhizæ ana ʒ iiij.

Iuiubarum

Sebe-

Sebesten ana numero xxx.
 Passularum enucleatarum
 Ficum siccarum
 Dactylorum pinguium ana ℥ ij.
 Fœnugræci ℥ v.
 Capilli Veneris m j.
 Anisi Fœniculi Ireos
 Seminis Lini
 Calaminthæ ana ℥ iiij.

Coquantur secundum artem in aqua clarissima ℔ iiij. ad consumptionem ℔ ij.

Colaturæ expressæ adde
 Penidiarum ℔ ij.

Coquantur ad perfectionem : postea insperge subsequencia , minutissimè incisa & tusa :

℞. Pincarum mundatarum ℥ v.
 Amygdalorum dulcium mundatorum
 Glycyrrhizæ Tragacanthæ *
 Gummi Arabici Amyli ana ℥ iiij. *
 Ireos ℥ ij.

Agitentur omnia simul celerrimè , donec albescant.

Tvssis vocisq̃ue asperitati à frigidityate natæ auxilio est : crassos in thorace & pulmone humores extenuat.

Loboch de Pino , D. Mesua.

℞. Pincarum ℥ xx. *
 Amygdalorum dulcium

Auel-

Aucellanarum afflatarum

Tragacanthæ Gummi Arabici

Glycyrrhizæ Succi Glycyrrhizæ

Amyli Capilli Veneris

Ireos ana ʒ iiij.

Carnium dactylorum ʒ xxxv.

Amygdalorum amarorum ʒ iiij.

Mellis passularum Butyri recentis

Sacchari Tabarzeth ana ʒ iiij.

Mellis Tabarzeth l' iiij. ʒ j. ʒ iiij.

Conterenda contundantur, & incidenda incidantur minutissimè, & cum melle excipiantur.

M E L Tabarzeth est optimum, sincerissimum atque odoratissimum mel, quale ex Danisco affertur.

P. C. S C H O L.

A Amygd.am. ʒ iiij.] Cùm Cordus hic peruersè ʒ iij. posuisset, ʒ iiij. tantum legendas esse, Fuchsio quoque adslipulante, dico.

T v s s i diurnæ, difficultati spiritus, & asthmati succurrit: humores in thorace crassos incêdit, & extenuat.

Lohoch de Papauere D. Mesuæ.

R. Papaueris albi ʒ xxv.

Amygdalorum dulcium Pinearum

Gummi Arabici Tragacanthæ

Succi Glycyrrhizæ ana ʒ x.

Amy.

Amyli ꝑ iiij. *
 Seminis Portulacæ Seminis Lactucæ
 Seminis Cytoniorum ana ꝑ iiij.
 Croci ꝑ i. *
 Penidiarum albarum ꝑ iiij.
 Syrupi de Papauere l' iiij.

Omnia contundantur & incidantur; atque cum Syrupo excipiantur, secundum artem. Porro iste Syrupus de Papauere sic fieri debet:

℞. Caputum Papaveris albi recentium
 Capitū Papaveris nigri recentiu ana ꝑ vj.
 Seminis Lactucæ
 Florum Violarum ana ꝑ j.
 Aquæ quantum sufficit, aut l' viij.

Coquantur; & colaturæ adde
 Sacchari l' iiij.

Coquantur ad spissitudinem.

*Hoc Lohoch de Papauere appellatur etiam
 alio nomine Diapapauer.*

Iuuat tussim, & gutturis asperitatem à catarrho calido, tenui (quem sputum liquidum indicat:) eum enim coquit, & crassat. Confert etiam febribus ardentibus, dolenti thoraci, pleuritidi.

Lohoch de Scilla, D. Mesuæ.

℞. Succi Scillæ
 Mellis despumati ana l' j.
 Coquantur secundum artem.

SCILLA.

SCILLA propriè succum non habet, sed mucilaginem; quæ sic est colligenda:

R. Scillas crudas tres aut quatuor: eius laminas puriores, plenas & nitidas, in partes incidito cultello eburneo: deinde in pila siue mortario scilili aut lapideo siue marmoreo atterito cum agitaculo, facto ex ligno Guaiaco siue Sanello: & deinde exprime, & utere.

E C L E G M A de Scilla, materiam crassam, lentam, coctu difficilem in partibus respiratoriis, expelli facilem strenuè reddit; & natam inde spirandi difficultatem, & thoracis dolorem leuat.

*Loboch de Pulmone vulpis,
D. Mesue.*

R. Pulmonis vulpini siccati
Succi Glycyrrhizæ
Seminis Anisi Seminis Foeniculi
Capilli Veneris ana ℥ j.
Sacchari clarificati ℥ xv.

Conterantur omnia tenuissimè, & cum Saccharo excipiantur.

A B S T E R G I T & consolidat vlcera pectoris & pulmonis, & præferendum est aliis remediis in phthisi.

* *Loboch ad Asthma D. Mesue.*

* R. Scillæ assatæ ℥ iij.

Radi-

Radicum Ircos 3 ij. *

Hysſopi

Prasſii ana 3 j.

Myrrhæ rubæ

Croci ana 3 β.

Cum mellis quantitate ſufficienti fiat Lo-
hoch.

Ad aſthma & tuſſim antiquam valet:
humorem enim traſſum tenuat.

LENITIVA, ET SOLVTIVA.

Flores Caſiæ fiſtula ſolutina.

℞. Cannas ſeu ſiliquas Caſiæ ponderoſas,
& quæ non reſonant concuſſæ: aperi eas,
& contentam in eis pulpam ſeu medullam
cum laminis & ſeminibus ſuis diligenter
euacua: exempta proiice ſuper inuerſum
& anguſtum cribrum, ſetis equinis con-
textum. Cribrum deinde pone ſupra bul-
lientis aquę vaporem, & auerſo cochlea-
ris conuexo Medullam Caſiæ hinc & inde
ducito, vt per cribrum paulatim excerna-
tur: & ſi quid excretum eſt, aut penetra-
uerit, conſeſtim ſubinde auferito, ne plus
quàm neceſſe eſt de vapore imbibat: idque
tam diu facito, donec quantum voles, col-
legeris. Porro cùm neceſſitas requirit, ſem-
per

per recentes exprime Casiæ flores : repositi enim acescunt.

Si quis Casiæ flores siue pulpam magis solutiuam reddere volet, in bullientem aquam proiciat folia Persici, aut flores Persici, & Prunellorum siluestrium, aut omnia hæc simul : horum enim vapor & distillata aqua soluit aluum, [sed debilibus ventriculis non conuenit.]

Mundificat sanguinem, & compescit omnem acuitatem, & sedat sitim, & propriè cum succo Endiuixæ aut Taraxaci, depurato secundum artem. Mundificat stomachum, & educit choleram & phlegma, sine nocumento & excessu, caret enim mordicatione. Et lenit pectus & guttur, ac resoluit apostemata acuta in eis. Et confert calefactioni renum, sumpta cum diureticis & infusione Glycyrrhizæ; & prohibet generationem lapidis in eis : & confert febribus calidis.

Diacasia cum Manna.

Rx. Prunorum Damascenorum ℥ ij.
 Florum Violarum m. j. ℥.
 Aquæ fontanæ ℥ xviiij.

Bulliant secundum artem vsque ad medietatis consumptionem : Cola; & in colatura dissolue

Pulpæ Casiæ ℥ vj.

Pulpæ

Pulpæ Tamarindorum ʒ j.

Mannæ optimæ Calabrinæ ʒ ij.

Syrupi Violarum ʒ iiij.

Sacchari Candi Sacchari Penidii ana ʒ j.

Sacchari Violati ʒ iiij.

Confice secundum artem.

Pulpa Tamarindorum fit ut Pulpa Casia, sine flores Casia.

Est pro delicatis, qui habent stypticum ventrem; non enim est ingrati saporis, nec molesta, sed salubris: lenit viscera, subducit aluum, purgat choleram, & mitigat febres.

Casia extracta sine foliis Sene.

R. Prunorum numero xij.

Violarum m. j.

Hordei mundi Anisi Polypodii

Seminis Carthami ana ʒ v.

Capillorum Veneris Thymi

Epithymi ana m. β.

Passularum exacinatarum ʒ β.

Seminis Fœniculi ʒ ij.

Seminis Portulacæ

Seminis Maluæ ana ʒ iiij.

Glycyrrhizæ ʒ iiij.

Fiat horum decoctio in sufficienti quantitate aquæ: colentur; in colatura dissolue

Pulpæ Casiæ l' ij.

Pulpæ Tamarindorum ʒ j.

Cin-

* Cinnamomi ℥ iiij.
Sacchari optimi ℞ j.

Coquantur ad perfectionem secundum artem.

Casia extracta cum foliis Senæ.

℞. Confectionis Casiæ extractæ sine foliis Senæ ℞ ij.

Pulveris foliorum Senæ ℥ ij.

Misce secundum artem.

F A C I L E soluit: lenit asperitatem intestinorum: remouet stypticitatem, & ventris onus subducit, & morbis chole-ricis & melancholicis auxilia præbet.

Casia extracta pro clysteribus.

℞. Violarum [id est, florum Violarum]

Violaris [id est, foliorum Violarum]

Maluæ Mercurialis Betæ

Parietariæ ana m j.

Fiat horum decoctio in sufficienti aqua, cuius beneficio Casia extrahatur, & can- næ eius interiùs lauentur. Deinde

℞. Pulpæ Casiæ cum hac decoctione ex-tractæ & ad spissitudinem coctæ ℞ j.

Sacchari ℞ j. β.

Coque ad perfectionem secundum ar-tem. Quidam addunt Diacridium, siue Scammoncam. Sed hoc nemo faciat in-sciis Doctõribus Medicis.

P A R I E-

PARIETARIÆ, videlicet vera, qua circa macerías & muros nascitur, sub fillicidiis rectorum; & non siluestris illius herba luteis floribus, qua dicitur Germanicè Tag und nacht.

Est lenitiua ventriculi, & lenis, & est medicina pro delicatis, carens acuitate & mordicatione, & omni excessu lædente.

Electuarium Lenitium.

℞. Passularum enucleatarum ℥ ij.
 Adianti nigri Violarum
 Hordei mundi ana m. j.
 Iuiubarum Sebesten ana num. xx.
 Glycyrrhizæ ℥ β.
 Prunorum enucleatorum
 Tamarindorum ana ℥ vi.
 Fol. Senæ Polypodii ana ℥ ij.
 Mercurialis m. j. β.

Decoquantur secundum artem in sufficienti aqua: cola; & in colatura dissolue
 Pulpæ Casiæ Pulpæ Tamarindorum
 Pulpæ Prunorum Sacchari optimi
 Sacchari Violati ana ℥ vi.
 Pulueris Senæ ℥ iiij. ℥ iiij. β.

Confice secundum artem.

ADIANTVM nigrum, est Capillus Veneris verus; qui Lugduno offertur.

Vsvs eius est in febris humoralibus & pleuresi: lenit enim & mollit intestina,

testina , & delet eorum stypticitatem:
facilè soluit sine molestia & læsione cho-
leram phlegmaticam & melancholicam.

*Electuarium Lenitium de Manna,
Nicolai Alexandrini.*

℞. Capillorum Veneris

Scolopendriæ [*hoc est, Ceterach vocata*]

* Hepaticæ [*hoc est, Lichens*] ana ℥ iiij.

Seminis Cucurbitæ Seminis Citrulli

Seminis Melonis Sem. Cucumeris

Violarum ana ℥ j.

Prunorum Damascenorum num. xx.

Coquantur in aqua ad dimidiās, deinde
percolentur cum expressione: in colato
dissoluantur

Mannæ optimæ puræ

* Sacchari Violacei

* Pulpæ Casiæ recens extractæ ana ℥ iiij.

* Tamarindorum

Sacchari Rosacei ana ℥ j.

Sacchari albißimi lb̄ iiij.

Concoquantur ad mellis consistentiam:
postremò species sequentes iniciantur:

Nucleorum Seminis Melonis

Seminis Cucumeris Seminis Cucurbitæ

Seminis Citrulli Florum Violarum

Florum Nymphææ Seminis Lactucæ

Seminis Scariolæ

* Seminis Portulacæ ana ℥ j.

Rhabar-

Rhabarbari electi

Foliorum Senæ ana ℥ j. ʒ j.

His accuratè commistis & subactis, conficiatur electuarium.

VITILE est ad purgandum sanguinem, ad choleram reprimendam & melancholiam : valet etiam ad hepar calefactum; & corpus vniuersum perpurgat.

Electuarium de Sebesten, D. Bartholomæi Montagnane.

℞. Sebesten sine nucleis

Prunorum siccorum enucleatorum

Tamarindorum ana ℥ . v.

Aquæ Violarum ℥ j.

Aquæ Ireos

Aquæ Angurię ana ℥ vj.

Succi Mercurialis deputati ℥ iiij.

Penidiarum ℥ iiij.

Diapruni simplicis ℥ j. ʒ.

Nucleorum seminis Cucurbitæ

Cucumeris Melonis

Citrulli ana ℥ j.

Diagridii ʒ iiij. ʒ.

Caro siue pulpa Sebesten, Prunorum & Tamarindorum minutissimè teratur, & cum aquis extrahatur. Semina verò minutissimè incidantur, & reliquis misceantur : & fiat secundum artem Electuarium.

ANGVRIA est Melon magnus, viridis:

I

alio

alio nomine vocatur Albateca, siue Batega, & Melon Indicus. Quidam per aquam Anguria intelligunt succum eius, & non malè: nam hic magis aluum lenit.

P. C. S C H O L.

A Aquæ Anguriæ.] Anguriam esse Melonem seu fructum magnum, ex viridi & subpallido foris interstinctum, siue variegatum anguis modo, unde illi nomen; oblongum, insipidum, cum laore, semine maiusculo, rubro, unà cum Francisci Alexandrini Apolline existimo; & falli Euehsium dico.

C O N F E R T febribus cholericis interpolatis, & continuis puris, & sedat acuitatem febrium, sitim & vigilias, & etiam amaritudinem remouendo, & educit materias acutas à viis vrinalibus & vesica.

*Medulla siue Pulpa Prunorum,
aut Diaprunum simplex.*

℞. Prunorum magnorum acetosorum & vinosorum quantitatem, quam volueris; & exemptis nucleis in fictili vitreato magno coquito: deinde per cribrum setaceum exprimito: expressam pulpam iterum lento igne ad perfectam & iustam spissitudinem coquito, & sine Saccharo reponito.

Porro si medullam Prunorum laxati-
uam

nam requiris, ex dulcibus Prunis, aut Prunis Hungaricis magnis exieccatis conficito.

Medulla Prunorum vinosorum, calorem & sitim in febris mitigat: & melius est ut conservetur sine Saccharo, Cerasorum modo inspissata.

*Diaprunum compositū, non laxativum,
D. Nicolai.*

℞. Prunorum Damascenorum electorum
[siue Hispanicorum] num. centum.

Coquantur in modica aqua, donec emollianter: excola: deinde decoctum eorum priuatim repones; ipsa verò pruna super inuersum & vasi impositum cribrum ponantur, & manibus hinc & inde ducantur, & premantur, donec omnis eorum pulpa penetrauerit, & cutis cum nucleis tantū remaneat. Collectam deinde pulpam, & excolatum eorum decoctum, in quo bullierit Violarum $\frac{3}{4}$ ℥, lento igne ad spissitudinem coquito. Melius esset, si Prunorum pulpa per se inspissaretur, & si cum decocto Prunorum & Violarum Pulpa Tamarindorum extraheretur.

Deinde cū inspissaueris,
℞. Pulpæ inspissatæ l' j.
Sacchari clarificati l' ij.
Pulpæ Tamarindorum

Pulpæ Casiæ ana ℥ j.

Agita omnia simul supra ignem : deinde insperge subsequentium specierum pulverem :

℞. Santali albi Santali rubri

Spodii Rhabarbari

Cinnamomi ana ℥ iiij.

Rosarum Violarum

Seminis Portulacæ Seminis Scariolæ

Seminis Berberis Succu Glycyrrhizæ

Tragacanthæ ana ℥ ij.

Seminis Cucurbitæ Seminis Cucumeris

Seminis Citrulli

Seminis Melonis ana ℥ j.

Confice secundum artem.

Dicitur etiam hæc confectio Diadamasenum, à Prunis Damascenis quæ capit.

Quidam ponunt Prunorum non num. centum, sed l' j. verùm malè : nam ex Nicolao Alexandrino omnes alii hanc compositionem desumpserunt.

Quædam exemplaria non habent Cinnamomum : sed Nicolaus Alexandrinus id ipsum ponit : & nisi ingrederetur Cinnamomi pondus, confectio hæc esset manca : nam Nicolaus Alexandrinus scribit totam confectionem habere l' iiij. & β. & sic est. Impressi tamen codices mendosi sunt : habent enim l' ij. & β. Ita pro ciphra 3. posuerunt 2. facili errore, non tamen condonando.

Nico.

Nicolaus Alexandrinus non ponit Semen Cucumeris: nam si posuisset, dixisset confectionem habere l' iij & β. & ζ j. Itaque hec ζ j. seminis Cucumeris, adiecta est à posterioribus: nihil tamen refert, cum potius conducatur.

*Per semina Cucubita, Cucumeris, &c. debet intelligi exempta eorum medulla. Idq̃ semper intelligendum est, cum pulveres horum seminum ingrediuntur in confectiones quas-
cunque.*

P. C. SCHOL.

Cinnamomi.] Cinnamomum ex hoc medicamento erroneè reiecit Euchsus, cum vetera plurima exemplaria id contineant: quod rationibus etiam constare, demonstrari posset.

D A T V acutas & peracutas [febres] patientibus, & maximè Caufoni & Synocho, in principio, & in augmento & statu ægritudinis. Et sine Diacridio potest exhiberi in omni hora diei: cum Diacridio verò, in aurora matutinali, & cum cautela, quoniam est solutivum forte.

*Diaprunum compositum laxativum,
[seu solutivum,] D. Nicolai.*

Rx. Diapruni non laxativi adhuc recentis
& calidis l' iij.

Scammoneæ præparatæ ℥ ij.

Misce, & repone.

I 3

Dia-

Diacathelicon Nicolai.

℞. Pulpæ Casiæ fistulæ

Pulpæ Tamarindorum

Senæ mundatæ ana ℥ ij.

Rhabarbari Violarum Polypodii

* Anisi ana ℥ j.

Penidiarum

* Sacchari Candi ana ℥ j.

Glycyrrhizę Seminis Cucurbitæ

Seminis Citrulli

Seminis Cucumeris

Seminis Melonis ana ℥ ij.

Conterenda conterantur, & seminum
quatuor maiorum nuclei incidantur: po-
stèa omnia simul conficiantur cum subse-
quenti syrupo:

* ℞. Polypodii ℥ iiij.

Coquantur in aqua cælesti q. s. addendo
Sacchari optimi l' ij.

*Nicolaus Alexandrinus hanc confectiorem
vocat Catholicum; è quo desumpta est: ic pau-
lò aliter eam describit: sed quia impressum
Nicolai exemplar in hac confectiione valdè mon-
desum est, malui ex concordia aliorum tradi-
tione hanc adscribere.*

CONFERT acutis & peracutis morbis:
emollit enim, alterat, roburque addit ie-
cinorosis & lienosis.

Ele-

*Electuarium Indum mains,
D. Mesue.*

℞. Cinnamomi Garyophyllorum
 Spicæ Indicæ Rosarum
 Casiæ lignæ veræ [*aut succedanei cili*]
 Macis
 Cyperi [*videlicet rotundi*] ana ℥ iiij.
 Santali Citrini ℥ ij. β.
 Ligni Aloës
 Nucis moschatæ ana ℥ ij.
 Turbith optimi ℥ l. [*id est, quinquaginta*]
 Sacchari
 Penidiarum ana ℥ xx.
 Galangæ
 Cardamomi maioris
 Cardamomi minoris Afari
 Mastiches ana ℥ j. β.
 Diagridii ℥ j. ℥ iiij.
 Omnia terantur, & cum oleo Amygdalino
 dulci fricentur, & cum subsequenti
 syrupo conficiantur:
 ℞. Succi Cydoniorum
 Succi Granatorum Succi Apii
 Succi Fœniculi, omnium depuratorum
 ana l' β.
 Mellis despumati optimi l' iiij. ℥ iiij. A
 Decoquantur succi cum melle, ad spissitudinem
 iustam, secundum artem.

P. C. S C H O L.

A l' iij. ʒ iij.] Cùm Mellis triplum ad reliquorum pondera Cordus plerumque requiratur, hîc Mellis l' iij. ꝑ. posuerat, ingredientia Sacchara pulueribus ceteris connumerans; quod alicubi tamen non effecit. Itaque num Sacchara pulueribus sint annumeranda, ut ea ratione Mel quoque triplicandum sit, nihil hîc Fuchsius, nihil Dessennius, nihil Apollo fatu dignum; ut nec in Amygdala, Pineas, Dactylos recipientibus medicamentis; cùm alioquin futilibus interdum paginas repleant. Ceterùm (ut hîc id obiter dicam) huius iam narrati dubii, Diaphœniceon admodùm est controuersum [f. decisio incerta.]

EXCREMENTA humorum, maximè pituitosorum ac putridorum, è ventriculo & aliis nutritoriis instrumentis educit: crassos in iis etiam flatus dissoluit, malaque hinc nata sanat; verbi gratia, inflationem ventriculi, colicos & renum dolores.

*Electuarium Indum minus,
D. Mesua.*

A R. Turbith optimi	ʒ	vj.	
Sacchari tantundem		Macis	
Garyophyllorum	Piperis	Zingiberis	
Cinnamomi electi			
			Carda-

Cardamomi maioris

Nucis moschatæ ana ʒ viij.

Scammonæ correctæ ʒ xiij.

Mellis optimi despumati triplum, hoc
est ℞ ij. ʒ j. ʒ j. *

P. C. SCHOL.

Turbith ʒ vi.] Mihi, Desseñnio, alijsq; A
videtur Cordus hic mutilus, Turbith tantum
sex drachmas huic medicamento indexes, cen-
tum drachmas in Mesue scriptum fuisse dicen-
tibus multū. Ego verò cum nulla ratione cen-
tum drachmas admittere queam, medicamenti
inscriptionis ratione habita, qua Indum mi-
nus appellatur, vix quinquaginta drachmas ad-
mittendas esse concedere possum, ut in Indo ma-
iori: nō in ambabus idem Scammonii pondus
citra controuersiam cerneretur. De decem tan-
tum drachmis aut duodecim, deq; viginti quin-
que drachmis legentibus quibusdam exempla-
ribus nunc nihil dico. Tanta est hoc in pondere
hic varietas.

Interim si Turbith pondus (præter Cordi
mentem) augetur, augenda quoque erit, pro
triplicitatis ratione, mellis quantitas.

Н а в е т intentionem maioris.

Confectio Hamech maior,
D. Mesue.

℞. Myrobal. Citrinorum ʒ iiij.

Cebulorum Indorum

℥ ʒ

Rha-

Rhabarbari ana \mathfrak{z} ij.

Agarici Colocynthis

Polypodii quercini ana \mathfrak{z} xviiij.

* Absinthii Thymi

* Senæ ana \mathfrak{z} vj.

Violarum \mathfrak{z} xij.

Epithymi \mathfrak{z} ij.

Anisi Fœniculi

Rosarum ana \mathfrak{z} vj.

Succi Fumi terræ l j.

Prunorum num. lx.

Passularum maiorum enucleatarum \mathfrak{z} vj.

Infundantur omnia in feri quantitate
sufficienti, & ponantur in vitreato vase
angusti orificii, bene obturato, & dimit-
tantur per dies quinque, [aut tres potius.]

Postea ad ignem ferueant vna atque altera
ebullitione : deinde colentur. In parte
colaturæ dissolue

Pulpæ Casiæ \mathfrak{z} iiij.

* Pulpæ Tamarindorum \mathfrak{z} v.

Mannæ \mathfrak{z} ij.

Agitentur simul, & adiiciatur

* Sacchari in altera colaturæ parte clarifi-
cati l j. β .

Coquantur simul ad mellis spissitudi-
nem: deinde aspergatur subscriptarum spe-
cierum puluis:

Scammoneæ bonæ \mathfrak{z} j. β .

Myrobal. Citrinorum Chebulorum

Indorum ana \mathfrak{z} β .

Belle.

Bellericorum

Emblicorum

Rhabarbari

Seminis Fumi terre ana ʒ iij.

Spicæ Nardi Indicæ

Anisi ana ʒ ij.

Confice secundum artem.

MORBUS omnibus ex flaua bile & pituita salsa natis, nempe impetigini, scabiei, elephantix & cancro succurrit. In summa, omni fœditati cutis à biliosis, & adustis humoribus procreatæ conuenit. [Melancholicis quoque vtiliter datur.]

*Confectio Hamech minor**D. Mesus.*

℞. Myrob. nigrorum [id est, Indorum]

Chebulorum

Epithymi ana ʒ l.

Fumi terre Absinthii ana ʒ x

Thymi Calaminthæ

Polypodii quercini

Agarici Glycyrrhizæ

Buglossæ ana ʒ x.

Stœchados Arabicæ

Chamædryos [videlicet vere]

Chamæpityos [id est, Iuxta moschata]

Bedeguaris [eius loco sume Carduum benedictum]

Anisi ana ʒ v.

Prunorum Iuiubarum

℥ 6

Sebe-

Sebesten ana num. lxx.

Passularum enucleatarum ℞ j.

★ Decoquantur in aqua sufficienti vsque ad tertias. Colentur, & colaturæ addantur Sapæ ℞ ij.

Mellis despumati ℞ j.

Scammonæ correctæ ℥ ij.

Coquantur lento igne vsque ad mellis spissitudinem.

P V R G A T Melancholiam, & vstos humores alios: ob id confert mania, melancholia, vertigini, obliuioni, & vitiis cutis, qualia sunt psora, id est, scabies, morphæa, cancer, elephantia, impetigo: & morbus Gallicus.

Diaphœnicon D. Mesue.

℞. Dactylorum Hieron enucleatorum, ac tribus diebus in aceto maceratorum ℥ ij. ℥ ij.

Penidiarum ℥ j. ℥ j.

Amygdalorum [dulcium] ℥ v.

Turbith ℥ v. ℥ ij. β.

★ Scammonæ [i. Diagridii] ℥ ij. aliis ℥ ij. ℥ ij.

★ Zingiberis Piperis longi

Foliorum Rutæ

Cinnamomi Macis Ligni Aloës

Anisi Fœniculi Dauci

Galangæ ana ℥ j. ℥ v.

★ Mellis despumati triplum, hoc est, ℞ j.

℥ ij. ℥ vj.

Fiat

Fiat secundum artem electuarium.

P. C. SCHOL.

Mirum est in hoc tam frequentis usus, tamq̃
dubiosa atque difficilis compositionis medica-
mento, adeò ut etiam à duobus Pharmacopœis
vix eodem concinnetur modo; mirum inquam,
hic silere, nihilq̃ serii dicere (ut Fuchsiū si-
leam) Francisc. Apollinem, eundemq̃ tam in-
spidum esse, ut quid per Amygdala absolute
hic posita, intelligendum; quantum Scammo-
nii (nam admodum diuersa est lectio) quan-
tum Mellis, in quo hoc loco grandior, quàm in
quouis alio medicamento, cardo versari debe-
ret, sumendum sit, nihil Apolline dignum pro-
ferat, aut ridicula indicet atque scribat: cum
tamen plurimis locis, verborum ac vocum ina-
nium multas myriades temerè ac futiliter effun-
dat. Quoniam verò (quantum ad Mellis quan-
tatem attinet) seneque hic vniuersali regula
abuti velle dicat Franciscus: per quam si Mel-
lis triplum intelligat, nonne libra nouem Mel-
lis hic sumenda erunt, admodū à tribus procul?
Num igitur ad auctoris mentem composi-
tionem hanc se restituisse, ut inquit, gloriari de-
bet? Hunc itaque, hunc Apollinem consulat
Pharmacopœus oportet, ut radiis eiusdem illu-
minatus (nam undique ferè est sibi similis) un-
dequaque etiam cacutiat atque exorbitet.

Febribus compositis & diuturnis auxi-
liatur. Bilem enim flauam & pituitam du-
cit. Colicis cruciatibus mirificè confert:

item doloribus ventriculi, & aliis malis
ex crudo humore ortis.

Diaphœnicon in forma solida.

℞. Dactylorum infusorum in aceto tribus
diebus ac noctibus numero ʒj.

Seminis Ligustici ʒ ij.

Pincorum nucleorum

Amygdalorum dulcium ana ʒ xv.

Turbith ʒ xij.

Diagridii ʒ xj.

Sacchari Candi ʒ ij.

Piperis longi Zingiberis

Foliorum Rutæ

Cinnamomi Macis Fœniculi

Anisi Dauci Galangæ

Ligni Aloës ana ʒ j.

A Sacchari lʒ j.

Fiat confectio in rotulis, secundum ar-
tem.

*Ista confectio solida Diaphœnicum plerisque
medicis est vsui.*

P. C. S C H O L.

A P j.] *Mutilum in hac Sacchari quantitate
esse Cordum, si ad præcedentis Diaphœnici,
aliâsve cum Saccharo paratorum medicamen-
torum rationes contuleris, necesse est; Typogra-
phi forsan vitio. In eandem nihilominus na-
sam satis imprudenter, immò pueriliter cecide-
re*

dere Fuchsius & nonnulli alii : ita cecum ceco
duce labitur.

Diasena D. Nicolai.

R. Senæ ℥ iij.
 Auellanaꝝ tostataꝝ num. l.
 Serici tosti ℥ ij.
 Lapidis Armeni loti ℥ j.
 Lapidis Lazuli loti ℥ iij.
 Sacchari ℥ vj.
 Cinnamomi ℥ j.
 Garyophyllorum Galangæ Piperis
 Spicæ Nardi Indicæ Ocymt
 Foliorum Garyophyllorum
 Cardamomi
 Croci Zingiberis Zedoariæ
 Florum Rotifmarini
 Macropiperis ana ℥ ij.
 Mellis despumati l' ij.

LAPIS Armenus, est similis lapidi Lazuli, sed non est tantopere ceruleus, sed magis viridis.

FOLIA Garyophyllorum sunt similia foliis Lauri, & odorem atque saporem habent Garyophyllorum: eorum loco sume Garyophyllos ipsos.

Succurrit melancholicis, mania vexatis, & quartana tristitiaque affectis, liepnosis, & omnibus malis ex atra bile procreatis.

Bene-

Benedicta laxativa D. Nicolai.

℞. Turbith electi

Sacchari ana ʒ x.

A Diagridii Esulæ Hermodactylorum

Rosarum ana ʒ v.

Garyophyllorum

Spicæ Nardi Indicæ

Zingiberis Croci

Saxifragiæ Macropiperis

Amomi [*sumatur Acorus verus eius loco,
vel Calamus aromaticus*]

Cardamomi minoris Seminis Apii

Salis Gemmei Galangæ Macis

Carui Fœniculi Seminis Asparagi

Seminis Rusci [*id est, Brusci*]Granorum solis [*id est, Milii solis*] ana ʒ j.

Mellis despumati optimi triplum, hoc

* est, lʳ j. ʒ v. ʒ v.

Confice secundum artem.

*Per semen Asparagi & Rusci intellige carnem
& pulpam eius: reiectis nucleis ossibus.*

P. C. SCHOL.

A Esulæ.] Nullo pacto placent Fuchsii alio-
rumq; sententia, hic Esula ʒ x. esse sumendas
arbitrantium: etenim cum Cordo ʒ v. suffi-
cere bonaratione dico. Brevis undique esse cogor.

Humores pituitosos, potissimum
ad articulos decumbentes, elicit. A reni-
bus quoque & vesica purgat.

Electua-

*Electuarium Eleſchoſ ſine Epilcopi,
D. Meſue.*

℞. Scammoneæ Antiochenæ [vel Dia-
gridii]

Turbith optimi ana ʒ vj.

Garyophyllorū Cinnamomi Zingiberis

Myrob. Emblicorum Nucis moſchatae

Polypodii ana ʒ ij. β.

Sacchari ʒ vj.

Mellis deſpumati triplum, id eſt ʒ x. ʒ j.

P. C. S C H O L.

Sacchari ʒ vj.] *Præter exempla ex Meſue,
præterq̃ rationes, Fuchſius & Franciſcus
Alexand. hic ʒ vj. legunt.*

BILEM flauam & pituitam elicit: fla-
tus quoque expellit: doloribus articulo-
rum, lateriſq̃ prodeſt, itemq̃ue colicis
cruciatibus: ad renes etiam & veſicam de-
cumbentes humores expurgat.

Electuarium de Pſyllio D. Meſue.

℞. Succı Bugloſſæ domesticæ

Succı Bugloſſæ agreſtis Succı Endiuix

Succı Apii, omnium coctorum & deſpu-
matorum ana l' ij.

Succı Fumi terræ ʒ iiij.

In quibus macerentur per xxiiij. horas
ſubſequentia:

℞. Cu-

R. Cuscutæ Anisi Senæ ana \mathfrak{z} β .
Capilli Veneris m. j.

A Afari \mathfrak{z} iiij.

Spicæ Nardi Indicæ \mathfrak{z} ij.

Bulliant aliquantulum, adiiciendo

Violarum \mathfrak{z} iiij.

Epithymi \mathfrak{z} ij.

Hæc postquam modicè bullierint, colentur : & colaturæ iniiciantur

Psyllii seminis integri \mathfrak{z} iiij.

Macerentur per xxiiij horas, singulis horis agitando : deinde sume expressæ à

Psyllio mucilaginis l' iiij.

Sacchari albissimi l' ij. β .

Coquantur lento igne ad perfectionem, addendo pulueris

* Trochiscorum Diarhodon

de Spodio

de Rhabarbaro ana \mathfrak{z} j.

de Berberis \mathfrak{z} β .

* Scammonii in Cytonio malo cocti \mathfrak{z} iiij.

Conficesecundum artem.

Per Buglossam domesticam potes intelligere Boraginem, vel magnam illam Italicam Buglossam.

P. C. S C H O L.

A Afari \mathfrak{z} iiij.] Sic legendum esse, ritè quoque Fuchsius monet. Cordus enim, Afari, Spica ana: \mathfrak{z} ij perperam hic legebatur.

F L A V A M bilem euocat, febribus ardentibus & curatu difficilibus auxiliatur; dolori

dolori capitis & vertigini à biliosorum humorum & euaporationibus procreatis, morbo regio, & iecori supra modum calefacto.

Electuarium Rosatum D. Mesue.

R. Succi Rosarum rubearum perfectarum
℞ iij.

Sacchari Tabarzeth [*id est, albi*] ℞ j. β.

Mannæ puræ & recentis ℥ vj.

Scammonæ Antiochenæ ℥ j. β.

Coquantur sensim ad ignem molliusculum, dum ad mellis consistentiam usque densescant: deinde insperge

Trochiscorum de Spodio ℥ j.

Trochiscorum de Berberis ℥ iij.

Galliæ moschatæ veræ

Croci ana ℥ ij.

Reponatur in vase vitreo.

Est cholagogum clemens: ob id salubre biliosis affectibus, arthritidi calidæ, cephalalgia calidæ, vertigini, oculorum dolori, ictero.

*Electuarium de Succo Rosarum
D. Nicolai.*

R. Succi Rosarum rubrarum

Sacchari albißimi ana ℞ j. ℥ iij.

Diagridii ℥ j. ℥ iij.

San-

Santali rubri Santali albi
 Santali citrini ana ʒ ʒj.
 Spodii de Ebore ʒ iiij.
 Caphuræ ʒ j.

Succus Rosarum cum Saccharo ad iustam consistentiam coquatur, deinde triæ species adiiciantur.

Hæc compositio potest fieri in forma solida.

Expellit flauam bilem citra molestiam: ad morbos articulorum ex biliosis & calidis humoribus natos, ad febresque tertianas confert.

Diaturbith cum Rhabarbaro,

D. Montagnane.

℞. Turbith optimi
 Hermodactylorum ana ʒ j.
 Rhabarbari ʒ x.
 Diagridii ʒ iiij.
 Santali albi Santali rubri Violarum
 Zingiberis ana ʒ j. β.
 Mastiches Anisi Cinnamomi
 Croci ana ʒ β.
 Sacchari albißimi triplum, hoc est P j.
 ʒ ij. ʒ ij.

Potest fieri in liquida & solida substātia.

Est Cholagogum, Phlegmagogum, & Melanogogum. [Verminosus & hydropicis vtile.]

Dia-

*Diaturbith maius D. Petri de
Tusignano.*

*

℞. Turbith optimi ℥ j.
Diagridii
Zingiberis ana ʒ iiij.
Cinnamomi
Caryophyllorum ana ʒ ij.
Galangæ Piperis longi
Macis ana ʒ j.
Sacchari albissimi ℥ viij. ʒ v.

EDUCIT phlegmaticos humores, &
purgat, & calefacit.

*Diaturbith minus Zezaris, ex Mesua **
cap. de Turbith.

*

℞. Turbith albi & gummosi ʒ x.
Zingiberis ʒ v.
Mastiches ʒ iiij.
Sacchari albissimi ℥ vi. ʒ vj.

LEVITER purgat phlegma à stomacho.

Diacarthamum D. Arnoldi
de Villanova.

A

℞. Specierum Diatragacanthi frigidi ℥ β.
Pulpæ Cytoniorum ʒ j.
Medullæ seminis Carthami ʒ iiij.
Zingiberis albi ʒ ij.

*

Dia.

Diagridii 3 ij.

B Turbith 3 vj.

* Mannæ granatę 3 ij.

Mellis rosati colati 3 j.

* Hermodactylorum 3 iiij.

Sacchari albißimi 3 x. 3 iiij.

Fiat in liquida substantia.

Cùm autem species reseruare volueris, mel rosatum non conuenit addere.

P V L P A sine caro Cytioniorum hic requiritur exsiccata.

P. C. S C H O L.

A Diacarthamum.] Cùm apud diuersos auctores diuersimodè legatur Diacarthami descriptio, atque hæc quoque ab Arnoldi variare dicat Franciscus Alexander; Arnoldo tamen hanc acceptam feremus, tantisper dum eiusdem genuinam descriptionem Franc. Apollo in Arnoldi nobis libris monstrauerit. Interea quoniam hanc utilem repererint multi, eam conficere Officine possunt.

B Mannæ 3 ij.] 3 ij. hic legi debere vel pueri animaduertent, ita ut à tot tantisq; viris (qui alioquin se satis emundæ naris esse putant) id non esse olfactum, stupeeam. Sed innumera huiusmodi hocce in libello restituta conspicias, ab aliis ne cogitata quidem; quorum rationes in aliud tempus seruamus.

P R O D E S T in euacuatione cholerae & phlegmatis.

Hiera

Hiera Picra simplex D. Galeni. Λ

℞. Cinnamomi
 Xylobalsami [*aut succedanei eius*]
 Asari Spicæ Nardi Indicæ Croci
 Mastiches Chiæ ana ʒ vj.
 Aloës non lotæ ʒ c.
 Mellis despumati ℞ iiij. ʒ iiij.

Cùm hæc confectio magis confortatiua
 quàm solutiua esse debeat, cum aloë lota
 conficienda est.

P. C. S C H O L.

*Vt ex ipsissima Galeni mente confectio hæc A
 paretur, qualiq; modo à peritis medicis hodie
 confici iubetur: Croci ʒ v. & Aloës ʒ xc. tan-
 tùm imponenda sunt.*

CONTRA biliosos, putres, marcidosque
 humores, qui ori ventriculi insederunt, re-
 medio est; item iis quorum faciem pallor
 decolorauit: iis quoque quorum oculis
 obiectæ culicum aut pilorum imagines
 obuersantur. Alui recrementa mediocriter
 mouet, ad iecur vsque progrediens: lædit
 quibus iecur calidius exhibet negotium;
 & stomachum iuuat.

Hiera picra cum Agarico.

℞. Specierum Hieræ simplicis sine Aloë
 Agarici

Agarici Trochiscati ana ʒ iiij.
 Aloës non lotæ ʒ j.
 Mellis despumati ʒ vj.

Hiera Picra composita D. Nicolai.

R. Cinnamomi
 Spicæ Nardi Indicæ
 Croci Schœnanthi Asari
 Xylocassie
 Xylobalsami } quorum loco sumantur suc-
 Carpobalsami } cedanea, ut supra.
 Violarum Absinthii Epithymi Agarici
 Rosarum Turbith Colocyntidis
 A Mastiches ana ʒ ij.
 Aloës non lotæ ʒ x. ʒ ij.
 Mellis despumati ʒ viij.

.. P. C. SCHOL.

A Ana ʒ ij.] Fuchsius ana ʒ β. legi vult, Cor-
 dum reprehendens; cū in idem recidant: con-
 cluduntur enim simplicia omnia unico ana: &
 Aloës ad pondus omnium legunt Nicolai exem-
 plaria. Inaxis itaque est Fuchsi reprehensio.

FACIT ad diuersas capitis, & aurium,
 & oculorum distemperantias: stomachum
 quoque optimè purgat: affectiones hepa-
 tis emendat: splenis duritiam & densita-
 tem emollit & extenuat. Renibus & vesi-
 cæ prodest, & matricis distemperantiam
 emendat.

Hiera-

*Hieralogodium, seu potius Hiera
Logadii, D. Nicolai.*

℞. Pulpæ Colocynthidis
 Polypodii ana ʒ ij.
 Euphorbii Polii montani minoris
 Cocci Gnidii ana ʒ j. β. ḡ vj.
 Absinthii
 Myrrhæ Troglodyticæ ana ʒ j. ḡ xij.
 Centauræ minoris Agarici
 Hammoniæ
 Folii [aut succedanei eius]
 Spicæ Nardi Indicæ Scillæ assatæ
 Diacridii ana ʒ j.
 Aloës Comarum Thymi
 Casiæ lignæ Chamædryos Bdellii
 Prassii ana ʒ ij. ḡ xiiij. **A**
 Cinnamomi Opopanacis Castorei
 Aristolochiæ longæ Leucopiperis
 Macropiperis Melanopiperis Croci
 Petroselinii Macedonici
 Sagapeni ana ʒ β.
 Hellebori nigri
 Hellebori albi ana ḡ vj.
 Mellis despumati triplum, hoc est ʒ x. *
 ʒ iiij. ʒ j. ḡ iiij.

*Quadam exemplaria habent Colocynthis
 ʒ ij. sed maximo errore: nos itaque veram com-
 positionem Nicolai Alexandrini sequimur, qui
 habet hanc proportionem.*

K

Cocci

Cocci Gnidii debent esse 3 j. β. ḡ xij. s. Alexandrinum Nicolaum sequi volumus impressum, qui habet 3 xvij. & hac compositio habet decimam partem Nicolai: itaque si 3 j. β. & ḡ xij. multiplicantur per decem, erunt 3 xvij.

Nota 3 ij. & ḡ xiiij. sunt decima pars drachmarum nouem: in Nicolao autem Alexandrino impresso non nouem, sed undecim legitur: sed hoc factum est vitio librariorum, xj. pro ix. ponentium, quamuis impressus codex pro xj. habeat 11. id est undecim per ciphras scriptum. Quod autem legendum sit ix. & non xj. indicat degradatio ponderis in tota hac confectioe.

P. C. SCHOL.

A 3 ij. ḡ xiiij. } Fuchsius sinistrè ex Myrepsso legit hic 3 j. tantum.

B Cocci Gnidii debent esse 3 j. β. ḡ xij. } In Nicol. Alex. non aduertit mendum Cordus. Non enim 3 xvij. sed 3 xvj. legendum esse, & ratio & Myrepsus Fuchsi docent: quare in contextu 3 j. β. ḡ vj. rectè à Cordo posita sunt, prater suam ipsiusmet existimationem.

EX TERMINAT diuturnas & inueteratas passiones, id est, maniam, & omnes melâcholias atque epilepsias. Scoromaticos, id est vertiginosos & spumantes, caducos, & qui sibi præmordent linguam, cephalalgicos, hemicranicos, & qui ita vexantur ex capitalibus commotionibus,

ut videantur quasi demonium habere, qui appellantur spatici, data purgat, ne incendium aut lipothymia generetur corpori, quod superscriptis passionibus subiacet; quibus inuitis etiam medetur. Paralyticis & tremulis subuenit. Datur indigestis, cardiacis, pleuriticis, hepaticis, spleneticis. Elicit menstrua. Nephreticos, arthriticos, & ischiadicos subleuat: Venena & venenatas passiones & morsus admodum persanât: Lepras & varias zermas emendat. Est autem sine ullo periculo; neque alias molestias infert accipientibus: daturque de ea res in mense pondus drachmarum trium, cum mulsæ cyathis iij. & salis cochleari.

Hiera Pachii, ex descript. Nicolai Alexandrini.

℞. Stœchados	Marrubii	
Chamædryos	Agarici	
Colocynthidis	ana	℥ x.
Opopanacis	Sagapeni	
Petroselini	Mali terræ	
Piperis albi	ana	℥ v.
Cinnamomi	Spicæ Nardi	
Myrrhæ	Folii	
Croci	ana	℥ iij.
Mellis despumati triplû, id est	℥ cclxxxv.	
qui faciunt	℥ iij. 3 iij.	℥ v.

Arida omnia in tenuissimum puluerem

K 2 iupdito:

tundito : liquores vetò , opopanacem , sagapenum , electa & pura in mortario tundito. deinde in feruenti mortario cum melle despumato feruenti adhuc vnito , ac reliquis misceto , cum omnino leuigata fuerint. Cùm verò mel ad dissoluendos hos liquores accipies , de suprascripta quantitate sumito , nihil addendo.

M A L V M terre , id est , radix Aristolochie rotunda vere.

Scribonius Largus mirum in modum effert huius Hiera virtutes , quemadmodum etiam Marcellus. Itaque non abs re fuerit tutò ea vti , cùm & nos eius efficaciam aliquoties experti simus.

✕ *hac nota significat Romanis scriptoribus denarium. Est autem denarius pondus Romanum , drachmâ paulò grauius. Nam drachma octo faciunt unciam , cùm denarii septem constituent unciam : non rarè tamen indifferenter pro drachma accipitur , sed malè.*

Compositio hæc sanat morbo comitiali correptos , furiosos , scotomaticos , cephalalgicos : facit ad deprauatam in vtramlibet partem. Ad Tetanum , & Cynicum spasmus , præcipuè verò ad pectoris & lateris dolores prodest , ex qualibet causa factos siue latente & occulta , siue manifesta. Præterea neruorum tensionibus mirificè conuenit : Prodest ad articulationum morbum , ad spinæ totius & lumborum dolo-

dolorem. Duritias in mammis mulierum cum dolore consistentes, ex toto interdum sanat. Ad stomachicos evidenter conuenit. Remediat enim eos quibus frequenter acescit cibus, aut assidue naseant aut salina abundant. præcipuè verò Melancholicis benefacit, &c.

*Catharticum Imperiale, D. Nicolai
Alexandrini.*

R. Diagridii

Sacchari ana ʒ viij.

Cinnamomi Nardi

Saxifragiæ

Polypodii ana ʒ iiij.

Garyophyllorum

Zingiberis

Celticæ [idest, Spica Celtica]

Macropiperis Melanopiperis

Cardamomi

Amomi [eius vice sume nostrum Calamum aromaticum] ana ʒ iiij.

Mellis despumati ℥ j. ʒ iiij. ʒ viij.

SAXIFRAGIA, quam Græci describunt, mediam habet figuram, & magnitudinem inter Pulegium & Thymum. Germanicè vocatur Stinplai, [aut Steinpokey.]

CAPUT optimè purgat, os bene olens reddit: ex stomacho & toto corpore utramque bilem deducit.

K ʒ

Pul-

Pulvis medicaminis Turbith,
D. Avicenna.

R. Zingiberis albi
 Mastiches ana ʒ x.
 Turbith subtiliss. pulverizati ʒ i.
 Sacchari Tabarzeth quantum eorum est.
 Commisceantur.

PURGAT humores phlegmaticos: datur pueris, mulieribus, senibus, & humidis, delicatis & otiosis.

Pulvis Senæ preparata,
D. Montagnana.

R. Senæ mundatæ ʒ xij.

Zingiberis

Macis ana ʒ iij.

Cinnamomi

Tartari ana ʒ j. β.

Hæc in pulverem redacta commisceantur.

Dosis ʒ j. ante cœnam.

PURGAT caput mirabiliter.

Pulvis aut Tragea laxativa.

R. Turbith ʒ j.

Zingiberis Cinnamomi

Mastiches Galangæ

Cardamomi minoris

Garyo.

Garyophyllorum

Anisi Hermodactylorum

Diagridii ana ℥ β.

Foliorum Senæ ℥ ij.

Sacchari ℥ iiij.

Misceantur in pulverem contrita.

Purgat choleram, phlegma & melancholiam.

Pulvis Sternutatorius.

℞. Radicum Pyrethri ℥ β.

Castorei ℥ β.

Hellebori albi

Hellebori nigri ana ℥ j.

Maioranæ m. j.

Misceantur : fiat pulvis lege artis.

Nasalia.

℞. Calaminthæ

Maioranæ Radicis Ireos

Seminis Nigellæ Castorei

Seminis Staphysagriæ ana ℥ j.

Hellebori albi Pyrethri

Nucis moschatæ Myrrhæ rubæ

Euphorbii ana ℥ ij.

In pulveres singula conterantur : deinde cum Ladani ℥ vj. & melle modico formentur nasalia.

SUPPOSITORIA.

Suppositoria simplicia conficiuntur ex melle & sale simul coctis ad debitam crassitiem.

Species ad Glandes, aut Suppositoria acuta conficienda.

℞. Hellebori albi
 Granorum Colocyntidis ana \mathfrak{z} j. β .
 Esulæ præparatæ
 Hermodactylorum ana \mathfrak{z} j.
 Specierum Hieræ picræ simplicis Galeni
 \mathfrak{z} ij.
 Misceantur puluerizata.

PILULÆ.

Pilula Alephangine, D. Mesue.

℞. Cinnamomi Cubebarum
 Ligni Aloës
 Calami aromatici Macis
 Nucis moschatæ
 Cardamomi
 Caryophyllorum Asari
 Mastiches Schoënanthi
 Spicæ Indicæ
 Carpobalsami [aut succedanei eius] ana \mathfrak{z} j.
 Abân-

Abſinthii ſicci Roſarum ana 3 v.

Conterantur groſſo modo, & infundantur in aquæ P duodecim, & coquantur lento igne in duplici vaſe, uſque ad conſumptionem duarum partium, id eſt, ad remanentiam tertiæ partis: deinde exprimantur fortiter, & colentur. In colaturæ P duabus diſſolve Aloës Succotrinæ multoties in vitreo vaſe lotæ, cum aqua pluuiali, & iterum ſiccata, l j. agitentur ſimul continuè in Sole: deinde addantur pulueris Myrrhæ, Maſtiches ana 3 v. Croci 3 iij. Deinde quod reliquum eſt colati decocti ex aromatibus etiam affundito, & exiccentur ad Solem vel in ſtuſa, admiscendo ſubinde quod denſatum eſt, liquido: & linteo puro vas obtegatur, aduerſus incidentium muſcarum & ſordium iniurias. Poſtremo reponatur maſſa, & fiant Pilulæ parvæ, cum neceſſitas requirit.

P I L U L A Alephangine compoſita ſunt à Meſue, ut confortent potiùs ſtomachum & cerebrum, quàm ut alium ducant. Propterea Aloën toties lotam requirit, & nullum ſolutionum medicamentum eiſ admisceat, ſed confortantia omnia, niſi quiſ ſolum Aſarum excipiendum eſſe contendat.

Iſtæ Pilulæ ubique ſunt in frequenti uſu, ſed rariffimè ut decebat conficiuntur. nam detrahunt ponderi & numero aromatum, & augent

pondus Aloës : quidam etiam impurissimam Aloën admiscunt , aut ipsius Aloës sordes. Porro miror cur Mesue iubeat ut decoquantur aromata, cū tamen omnia aromata tenuissimis essent viribus, quæ faciliè inter decoquendum resolvuntur : adeò etiam , ut deinde ipsum decoctum aut colatura , prorsus non sapiat aromata quæ incocta fuerant. Sed quia ita preparari hanc massam voluit Mesue , in nulla re immutabimus eius placitum.

Quidam confectioni huius massa Pilularum Alephanginarum consulentes , dimidiam aromatum partem cum aqua decoquunt , & Aloën in colatura dissolunt : alteram autem partem aromatum in minutissimum pulverem redactam , inter exiccandum masse admiscunt ; non absurda admodum ratione, si aromata decoctionem sustinerent.

VENTRICULUM, cerebrum, & sensoria humoribus crassius , putridis , pituitosis purgant, & inde natum dolorem dissipant : ventriculum roborant , & concoctionem eius iuvant.

Pilula Assaieret, D. Avicenna.

R. Specierum Hieræ picræ , descriptione

Galenī ℥ j.

Mastiches

Myrobal. Citrinorum ana ℥ β.

Aloës optimæ ℥ ij.

Syrup.

Syrapi de Stœchade q. s.

Fiat Massa

BILEM flauam & pituitam sine molestia è ventriculo potissimum vacuant. Quapropter iis qui caput è ventriculo dolent, conueniunt; nec non in subtilibus catarrhis.

Pilula Arabica, D. Nicolai.

℞. Aloës optimæ ʒ iiij.

Radicis Bryoniæ

Myrobalanorum Citrinorum

Myrob. Chebulorum Myrob. Indorum

Myrob. Bellericorum Myrob. Emblicorū

Mastiches Diacridii Asari

Rosarum ana ʒ j.

Castorei ʒ iiij.

Croci ʒ j.

Succi Fœniculi q. s.

Fiat Massa.

VALENT ad capitis dolorem, vertiginem, hemicraniamque. Lætitiā generant, mentisque vigorem conseruant; Visum acuunt, auditumque amissum reparant: Ac stomachum à vitiosis humoribus purgant.

Pilula Arthritica sine Arthetica,

D. Nicolai.

℞. Hermodactylorum Turbith

K 6

Agar

- Agarici ana ℥ iiij.
 * Colocynthis Cassiæ lignæ veræ
 Spicæ Nardi Indicæ
 Caryophyllorum
 Xylobalsami [aut succedanei eius]
 Carpobalsami [aut succedanei eius]
 * Macis Galangæ
 * Zingiberis Mastiches
 * Assæ foetidæ Fœniculi
 Anisi Saxifragiæ
 Seminis Asparagi
 Seminis Rusci [id est, Brusci]
 Rosarum
 Granorum solis [id est, Milii solis]
 Salis gemmei ana ℥ β.
 * Scammonii ℥ ij.
 Aloës optimæ ad pondus omnium
 Succi Fœniculi q. s.

Fiat Massa.

Ex Asparagi & Rusci seminibus tantum pulpa illa carnosæ accipi debet, abiectis corneis seu ossæis seminibus: idq; semper est observandum.

V A L E N T ad podagram, aliosque articulorum dolores.

Pilule de Agarico D. Mesua.

- * R. Agarici ℥ iiij.
 Ireos
 * Prassii ana ℥ j. Turbich ℥ v.
 Mieræ picræ ℥ iiij.

Colo:

Colocynthis

Sarcocollæ ana ʒ ij.

Myrrhæ ʒ j.

Sapæ quantum sufficit.

Fiat Massa.

Ego consulerem, ut Hiera picra nondum melle commissa acciperetur, hoc est, species eius aromatica cum Aloë tantum mista: intelligenda autem est Hiera picra simplex Galeni.

SAPA est mustum optimum, ad tertiam decoctum.

Auxiliantur asthmaticis, & aliis thoracis vitiis à crassis & pituitosis humoribus natis.

Pilula Aurea, D. Nicolai.

℞. Aloës : Diacridii ana ʒ v.

Rosarum

Seminis Apii ana ʒ ij. β.

Anisi Fœniculi

Mastiches ana ʒ j. β.

Croci

Pulpæ Colocynthis ana ʒ j.

Mucilaginis [seu infusionis] Tragacanthæ q. s.

Fiat Massa.

CAPVT expurgant, aciem oculorum exacuunt, flatus ventriculi & intestinorum dissolunt, ac citra molestiam aluum deiciunt.

Pilula Aggregatina, D. Mesue.

- ℞. Myrobal. Citrinorum
 Raueð. Seni ana ʒ iiij.
 Succi Eupatorii
 * Succi Absinthii ana ʒ iiij.
 Diacridii ʒ vj.
 Myrobal. Chebulorum
 Myrobal. Indorum
 Agarici Colocynthidis
 Polypodii ana ʒ ij.
 Turbith optimi
 * Aloës ana ʒ viij.
 Mastiches Rosarum
 Salis gemmei Epithymi
 Anisi Zingiberis ana ʒ j.
 Electuarii de succo Rosarum Mesue q. s.
 Fiat Massa.

RAUEÐ Seni, id est, Rhabarbarum Orientale optimum.

SUCCI Eupatorii & Absinthii debent esse inspissati, ut Aloë.

Per Eupatorium hoc loco intelligendum est Eupatorium quod Mesue describit, quod idem est cum Gratiola. Germanicè vocatur Weyssaurin: copiosè nascitur ad Albin. igitur hic erit faciendus eius succus.

VALENT ad diuturnas febres, & vitia capitis, ventriculi & iecinoris. Humores item biliosos & pituitosos educunt.

Pilula

Pilula Benedictæ, D. Nicolai.

℞. Specierum Benedictæ laxatiuæ ʒ vi.
Mellis Rosati quantum sufficit.

Fiat Massa.

HVMORES pituitosos, potissimum
ad articulos decumbentes, eliciunt: à re-
nibus quoque & vesica purgant.

*Pilula Cochiae D. Rhasis 9 ad
Almansorem.*

℞. Specierum Hieræ picræ Rhasis ʒ x.
Colocynthidis ʒ iiij. ʒ j.
Scammonææ ʒ ij. β.
Turbith Stœchadis ana ʒ v.
Syrupi de Stœchade quantum sufficit.
Fiat Massa.

STOËCHAS cùm simpliciter & indefinitè
ponitur, semper est intelligēda Stœchas Arabica.

Cephalicæ [Pilulæ] rectiùs appellan-
tur, quòd scilicet caput magna efficacia
expurgent, ex eoquæ ac neruis humores
crassos euacuent.

*Hiera picra Rhasis, 9. ad Almansor.
ad faciendum Pilulas Cochias.*

℞. Rosarum rubearum
Spicæ Nardi Indicæ

Mastiches
Xyle

Xylobalsami [*aut succedanei eius*]

Carpobalsami [*aut succedanei eius*]

Cinnamomi

★ Xylocastæ veræ [*id est, Cassia lignea*]

Asari [*videlicet radicem eius*] ana ʒ j. ʒ vj.

Aloës ʒ vj. ʒ ij.

Fiat Pulvis.

Pilula de Colocynthide, D. Mesue.

R. Pulpæ Colocynthidis ʒ vj.

Myrobal. nigrorum [*id est, Indorum*]

Myrobal. Citrinorum

Sagapeni Bdellii mollis

★ Sarcocollæ ana ʒ v.

Aloës ʒ vj.

Nigellæ Cymini Carmeni

Origani Persici

Nasturtii albi Salis gemmei

Absinthii ana ʒ j.

Succi Porri quantum sufficit.

Fiat Massa.

CYMINVM Carmenum, *id est, Orientale, ex Armenia regione.*

ORIGANVM Persicum, *idem est quod Creticum Origanum, & est Maiorana simile.*

NASTURTIVM album, *id est, Thlaspi, Germanicè Wegekressen: significat etiam Merretich.*

VALENT ad affectus pituitosos & melancholicos, vt albos curatu difficiles, & iuncturarum dolores.

Pilula

*Pilula de Eupatorio maiores
D. Mesua.*

℞. Myrobal. Citrinorum
Succi Eupatorii Mesuæ
Succi Absinthii ana ʒ iiij.
Raued Seni [*id est, Rhabarbari*] ʒ iiij. β.
Mastiches ʒ j.
Crocī ʒ β.
Aloës bonæ ʒ v.
Succi Endiuivæ quantum sufficit.
Fiat Massa.

MIRIFICE profunt in febribus intermittētib; biliosis, morbo regio, iccinorisq; obstructionibus.

Pilula de Euphorbia D. Mesua.

℞. Euphorbii
Colocynthidis Agarici
Bdellii mollis
Sagapeni ana ʒ ij.
Aloës ʒ v.
Succi Porri quantum sufficit.
Fiat Massa.

Ad emittendam hydropicorum flavam aquam, & materiam tumoris discutendam valent: Opem quoque afferunt lumborum doloribus, & podagræ humida causa concitata.

Pilula

Pilule Fætidae maiores, D. Mesua.

℞. Sagapeni Hammoniaci
 Opopanacis
 Bdellii mollis Colocynthidis
 Seminis Rutæ
 Aloës Epithymi ana ʒ v.
 Hermodactylorum
 Esulæ minoris ana ʒ ij.
 Scammonææ ʒ iiij.
 Cinnamomi Syriacæ Nardi Indicæ
 Croci Castorei ana ʒ j.
 Turbith ʒ iiij.
 Zingiberis ʒ j. β.
 Euphorbii ʒ ij.
 Succī Porri [præsertim foliorum] q. s.
 Fiat Massa.

VACUANT pituitam crassam, crudam: ob id conferunt affectibus inde natis, arthritidi, podagræ, gonagræ, dolori spinæ & aliarum iuncturarum, ventriculi, colico, alphis, elephantia, & albaras.

Pilule Fætidae, D. Rhafis.

℞. Specierum Hieræ picæ Rhafis ʒ x.
 Colocynthidis interioris ʒ v.
 Euphorbii ʒ ij. β.
 Castorei Piperis Assæ fœtidæ
 Saga.

Sagapeni Opopanacis Seitaragi
 Sinapi ana ʒ i.
 Centaureæ minoris Elaterii ana ʒ v.
 Gummi, siue lachrymæ & liquores omnes
 densati, in succo Rutæ q. s. dissoluantur:
 deinde admistis reliquis fiat Massa.

SEITARAGI, siue Seytari Indum, est
 herba similis Thlaspi maiori, id est Merretich:
 Latine vocatur Lepidium maius: Germanicè,
 Roskressen, Psifferwurtz, Romischkressen, &
 Maurkressen: accipiendæ autem sunt radices
 eius, aut semina.

ELATERIVM, id est, succus fructuum
 Cucumeris asinini exsiccatu.

Pilula de Fumo terræ, D. Avicennæ.

ʒ. Myrobal. Citrinorum
 Myrobal. Chebulorum
 Myrob. nigrosum [id est, Indorum] ana ʒ v.
 Aloës ʒ viij.
 Scammoneæ ʒ v.
 Succus Fumi terræ clarificatū quantum suf-
 ficit, vt formetur ter hæc massa: nam
 cum primò fuerit siccata massa, plus
 succi est addendum; & rursus exicce-
 tur; idque tertio est faciendum.

EDVCVNT è corpore humores bilio-
 sos, acres & salios: ideoque aduersus om-
 nia cutis vitia valent.

Pilula

Pilula de Hermodactylis maiores.
D. Mesue.

℞. Hermodactylorum
 Myrobal. Citrinorum
 Aloës Turbith Colocynthidis
 Edellii mollis Sagapeni ana ʒ vj.
 Castorei Sarcocollæ Euphorbii
 Opopanacis Seminis Rutæ
 Seminis Apii ana ʒ iiij.
 Croci ʒ j. β.
 Succī Caulium quantum sufficit.
 Fiat Massa.

Aduersus podagram & arthritin prosunt.

Pilula Indæ Haly, D. Mesue.

* ℞. Myrobal. nigrorum [*id est, Indorum*]
 * Hellebori nigri Polypodii ana ʒ v.
 Epithymi Stœchados ana ʒ vj.
 Agarici Lapidis Lazuli loti
 * Colocynthidis
 * Salis Indi [*aut Salis gemmei*] ana ʒ iiij.
 Succī Eupatorii inspissati
 Spicæ Indicæ ana ʒ ij.
 Garyophyllorum ʒ j.
 Hieræ picæ simplicis Galeni ʒ xij.
 Succī Apii quantum sufficit.
 Fiat Massa.

VALENT ad affectus melancholicos,
 can-

canctum, elephantiam, albos nigros curatu difficiles, melancholicum morbum, & inde ortum timorem & mœrorem, quartanam, iſterum ſpleneticum, & dolorem ſplenis.

*Pilule Hiera ſimplicis, Galeni,
lib. 6. Tuenda val.*

R. Aloës ʒ l.

A

Cinnamomi

Xylobaſami [aut ſuccedanei eius]

Aſari Spicæ Nardi Indicæ Croci

Mastiſches Chiæ ana ʒ iiij.

Mellis Roſati quantum ſufficit.

Fiat Maſſa.

P. C. SCHOL.

Pilulis hiis, ut ex Galeni ipſiſſima ſententia A conficiantur, & veluti apud peritiores hodie uſus obtinuit, Aloës ʒ xlv. & Croci ʒ ij. ſ. tantum hic indenda ſunt.

ADVERSUS vitia ventriculi ex humoribus bilioſis & pituitosis nata, proſunt.

*Pilule de Hiera compoſita,
D. Nicolai.*

R. Cinnamomi

Spicæ Nardi Indicæ Croci

Schœnanthi Aſari Xylocastię

Xylobaſami [aut ſuccedanei eius]

Carpo-

Carpobalsami [aut succedanei eius]

Violarum Absinthii

Epithymi Agarici

Rosarum Turbith Colocynthis

Mastiches ana ʒ j. [al. ʒ ij.]

† Aloës ad pondus omnium, hoc est ʒ ij.

Fiat Massa cum aqua Endiviæ.

OPREM ferunt vitiis capitis, nervorum-
que ab humoribus pituitosis procreatis.

Pilula Hieræ, cum Agarico.

℞. Specierum Hieræ simplicis Galeni

Agarici Trochiscati ana ʒ iiij.

Aloës bonæ ʒ j.

Mellis Rosati quantum sufficit.

Fiat Massa.

AUXILIANTVR stomachicis, asthmaticis, & aliis stomachi ac thoracis vitiis à crassis & pituitosis humoribus natis.

*Pilule de Lapide Lazuli, siue Cyaneo,
D. Mesue.*

℞. Lapidis Lazuli abluti ʒ vj.

Epithymi Polypodi ana ʒ viij.

Scammonæ Hellebori nigri

Salis Indi, aut Gemmei ana ʒ ij. ʒ.

Agarici ʒ viij.

Garyophyllorum Anisi ana ʒ iiij.

* Specierum Hieræ simplicis Galen ʒ xv.

Succi

Sacci Endiuix quantum sufficit,

Fiat Massa.

VALENT ad affectus melancholicos,
ex bile vsta natos.

*Pilula de Lapide Armenio,
D. Mesue.*

℞. Lapidis Armenii loti & præparati

Hieræ picræ ana ʒ v.

Epithymi Agarici

★

Polypodii ana ʒ viij.

Scammoneæ coctæ in Cytonio ʒ iiij.

Garyophyllorum ʒ j.

Salis Indi [aut Gemme] ʒ j. β.

Cum succo Endiuix conficiatur Massa.

MELANCHOLIAM, & bilem vstam
multiplicem vtramque clemēter vacuant;
ob id morbis inde natis conferunt.

Pilula de Mezereo D. Mesue.

℞. Foliorum Mezerei præparatorum ʒ v.

Myrobal. Citrinorum ʒ iiij.

Myrobal. Chebulorum ʒ iiij.

Confice cum Thereniabin vel Tama-
indis in aqua Endiuix dissolutis q. s.

THERENIABIN siue Tereniabin, est
Manna Orientalis, quæ Græcis vocatur Dros-
meli & Aëromeli.

SEROSVM excrementum valenter pur-
gant, seu aquas: ob id hydropem sanant.

Pilula

Pilula Lucis maiores, D. Mesne.

Rosarum Violarum Absinthii
Colocynthis Turbith Cubebarum
Calamiaromatici

Nucis Moschatæ

Spicæ Nardi Indicæ Epithymi

Carpobalsami [*aut succedanei eius*]

Xylobalsami [*aut succedanei eius*]

Seselios Seminis Rutæ

Schoenanthi Asari

Mastiches Garyophyllorum

Cinnamomi

Anisi Fœniculi Apii

Cassæ lignæ [*videlicet veræ*]

Croci Macis ana ʒ ij.

Myrobal. Citrinorum

Myrobal. Chebulorum

Myrobal. Indorum

Myrobal. Bellericorum

Myrobal. Emblicorum

Raued Seni [*hoc est, Rabarbari*] ana ʒ v.

Agarici Senæ ana ʒ v.

Euphrasiæ ʒ vij.

Aloës Succotrinæ ad pondus omnium,

id est ʒ viij. & ʒ ij.

★ Succī Fœniculi quantum sufficit.

Fiat Massa.

EXCREMENTA capitis pituitosa
educunt, visumque roborant.

Pila.

- * melle simplici liquidiusculo per diem & noctem, & rursus exiccetur: deinde formetur Massa cum succo Artemisiæ, aut cum Syrupo de Stœchade.

P. C. SCHOL.

- A Eo quòd Cordus bis eandem pilularum hæc descriptionem posuerat, ponderibus tantum in altera quadruplicatis, nos unam earum tamquam frustraneam expunximus.

Præservant stomachum ab omni agitudine: leniter purgant, & maximè confortant, & non permittunt humores corrumpi; & qui eis utuntur, præservantur à doloribus stomachi, capitis, ventris, & matricis: conferunt tristibus & melancholicis: & vitia matricis corrigunt.

Pilula de Aloë & Mastiche,
D. Nicolai.

℞. Aloës ʒ j. Mastiches ʒ β.
Garyophyllorum
Rosarum rubearum ana ʒ j.
Croci Diacridii ana ʒ ij.

Conformetur Massa cum succo Fœniculi aut Absinthii.

Respiciunt virtutem naturalem: purgant incolumiter stomachum à phlegmatibus & à cholera.

Pilula

Pilula de Aloë lota.

℞. Aloës lotæ cum succo Rosarum rubearum \mathfrak{z} j.

Agarici Trochiscati \mathfrak{z} iij.

Mastiches \mathfrak{z} ij.

Specierum Diamoschi dulcis \mathfrak{z} β

Cum vino Maluatico cogantur in massam.

VENTRICULUM, cerebrum, viscera reliqua, oculos, vterum putridis humoribus purgant, & roborant.

Pilula de Rhabarbâro,

D. Mesuæ.

℞. Raved Seni [*id est*, *Rhabarbari*] \mathfrak{z} iij.

Succi Glycyrrhizæ Succi Absinthii

Mastiches ana \mathfrak{z} j.

Myrobal. Citrinorum \mathfrak{z} ij. β .

Seminis Apii

Seminis Fœniculi ana \mathfrak{z} β .

Trochiscorum diarhodon \mathfrak{z} iij. β .

Hieræ picræ simplicis \mathfrak{z} x.

Aquæ Fœniculi quantum sufficit.

Fiat Massa.

IN febribus diuturnis, iecinoris obstructionibus, & aquæ inter cutem initiis conferunt.

*Pilulæ Pestilenciales Rufi, quæ aliter
De tribus vocantur.*

- R. Aloës electæ ℥ ij.
 ★ Myrrhæ optimæ ℥ j.
 ★ Croci sinceri ℥ β.

Confice cum vino aromatico.

MIRIFICÆ aduersus pestiferæ luis
contagia populatim grassantia pollent.
Humores etiam ventriculo infarctos edu-
cunt.

*Pilulæ de Sarcocolla Haly,
D. Mesuæ.*

- R. Sarcocollæ ℥ iiij.
 Turbith ℥ iiij.
 Colocynthidos
 Zingiberis ana ℥ j. β.
 Salis Gemmei ℥ j.
 Aquæ Rosarum q. s. Fiat Massa.

PITUITAM vacuant: ob id pituitosis
affectibus commodant.

★ *Pilulæ Sine quibus esse nolo,
D. Nicolai.*

- R. Aloës optimæ lotæ ℥ xiiij.
 Myrobal. Citrinorum
 Myrobal. Chebulorum

Myro-

Myrobal. nigrorum [*id est*, Indorum]

Myrobal. Bellericorum

Myrobal. Emblicorum

Rhabbari Mastiches Absinthii

Rosarum Violatum Senę Agarici

Cuscutæ ana ʒ j.

Scammoneæ præparatæ ʒ vj. β.

Dissolvatur Scammonea in succo Fœniculi sufficienti; & cum hac dissoluta Scammonea formetur Massa.

Mirabiliter purgant choieram, phlegma & melancholiam : valent propriè ad cataractas, & obscuritates oculorum, visum custodientes : & aurium dolorem sanant, & iliosis conferunt.

Pilula Stomachica Aikindi, D. Mesnæ.

R. Myrobal. Citrinorum

Myrobal. nigrorum

Myrobal. Chebulatorum ana ʒ iij.

Rosarum Mastiches ana ʒ ij.

Cardamomi Ligni Aloës

Santali Citrini Cubebarum

Garyophyllorum Schœnanthi

Nucis moschatæ ana ʒ j. ★

Raued Seni [*id est* Rhabbari] ʒ β.

Turbith ʒ vij.

Aloës ad pondus omnium.

Fiat Massa [cum vino odorifero & melle.]

L 3

Cere-

Cerebrum, & ventriculum corruptis humoribus purgant, ventriculum roborant, concoctionem iuvant, appetentiam excitant.

Pilula Stomachicæ D. Mesuæ.

℞. Myrobal. Citrinorum Aloës
 Turbethi ana ʒ x.
 Rosarum Spicæ Indicæ
 Mastiches ana ʒ ij. β.
 Anisi ʒ j. β.
 Salis Indii [*aut salis Gemmei*]
 Croci ana ʒ j.

Formetur Massa cum succo Absinthii.

Biliosos & pituitosos vacuant humores, eos potissimum qui caput & ventriculum obsident.

*Pilula Imperiales Magistrales,
 seu incerti auctoris.*

℞. Cinnamomi
 Amomi [*eius loco sumatur Acorus verus*]
 Anisi Mastiches
 Cardamomi minoris
 Zingiberis Zedoariæ Maceris
 Nucis Moschatæ
 Garyophyllorum Croci
 Cubebarum Ligni Aloës Turbethi
 Tereniabin [*id est, Manna*] Agarici
 Folio-

Foliorum Senæ

Spicæ Indicæ [*addunt alii*]

Myrobal. Citrinorum

Myrobal. Chebulorum

Myrobal. Indorum *

Myrobal. Bellericorum

Myrobal. Emblicorum ana ʒ j.

Rhapontici veri [*id est, Rhabarbari,*] ad
pondus omnium

Aloës quantum totum æquat.

Conficiantur cum Syrupo Rosato aut
Violato.

MODICVM soluunt; & plurimum
confortant stomachum, & omnia inte-
stina frigida: muniunt virtutes naturales,
remouent frigiditatem, clarificant san-
guinem & spiritum.

Pilule de Opopanace D. Mesuæ.

℞. Opopanacis Hermodactylorum

Sagapeni Bdellii mollis Ammoniaci

Colocynthidos ana ʒ v.

Croci Castorei

Myrrhæ rubræ Zingiberis

Piperis nigri Macropiperis [*id est, longi*]

Cassie lignæ Myrobal. Citrinorum *

Myrobal. Bellericorum

Myrobal. Emblicorum ana ʒ j.

Scammoneæ ʒ ij.

Turbethi ʒ iiij. Aloës ʒ - xij.

L 4

Cogan-

Cogantur in massam cum infusione gummi in aqua caulium.

VALENT ad paralyfim, spasmus cynicum, gonagram, podagram, & aliorum articulorum dolores, morbosque partium nervosarum frigidos.

Pilula de Quinque generibus Myrobal.
D. Nicolai.

℞. Quinque genera Myrobalanorum

Agarici Diacridii Colocynthidos

A Senæ ana ℥ β.

Epithymi Turbethi Anisi

Marathri [seu Fœniculi] Mastiches

Lapidis Lazuli præparati ana ℥ ij.

Aloës ℥ j.

Fermeur massa cum succo Absinthii.

P. C. S C H O L.

A Ana ℥ β.] Cum Cordus hic ana ℥ β. depravatè posuisset, Fuchsius aquè malè ℥ ij. β. legendum putat.

EDUCUNT humorem cholericum, phlegmaticum & melancholicum; & clarificant sanguinem.

Pilula de Oëto rebus, sine Oëtomera,
D. Nicolai.

℞. Aloës Diacridii ana ℥ ij.

Interioris Colocynthidis Epithymi

Aga-

Agatici Mastiches Dauci Cretici
Myrob. Chebulorum Absinthii ana ʒj.
Cum succo Solani conformetur massa.

PURGANT humores crassos à capite
visum clarificant ; & catarractas oculorum
prohibent.

Pilula de Serapino, D. Mesue.

R. Sagapeni Ammoniacy Opopanacy
Bdellii ana ʒ ij. Sem. Apii Ammios *
Harmalæ [*id est* , *feminis Ruta siluestris*]
Anisi ana ʒ j.
Acori [*id est* , *Calami aromatici*]
Cassie lignee veræ Calaminthæ A
Centaurii [*minoris scilicet*]
Polii Costi Salis gemmei ana ʒ β. *
Aloës ʒ vj. Colocynthidos ʒ v.

Cogantur in massam cum aqua aut suc-
co Matricariæ.

NOTATO : Ingreditur secundum Mesuem
Scitaragum Indum. sed Clementius Clementi-
nus loco eius posuit Cassiam ligneam.

P. C. SCHOL.

Cassie] Scitaragi Indi (quod Lepidium hoc A
loco interpretandum) apud Mesuem legi , rectè
olfecit Fuchsius ; fallig. Cordum & Clementi-
num dextrè censet.

POLLENT ad ischiadem , podagram,
& reliquarum iuncturarum dolorem , ac
etiam uteri ; mensesque promouent.

L 5

Pilula

Pilule de Bdellio maiores, D. Mesuæ.

℞. Bdellii ℥ xij. Ammios ℥ iiij.

Myrob. Chebulorum Myrob. Indorum

Myrob. Bellericorum Myrob. Emblicorū

* Conchularum venerearum adustarum

Succini aut Karabæ ana ℥ ij. β.

Maceretur Bdellium in succo foliorum
Porri, & conficiatur massa.

VALENT ad fluxum hæmorrhoidum &
ulcerum in eis, & ad menses immodicos.

Pilule de Cynoglossa D. Nicolai.

* ℞. Cynoglossæ rad. Opii

Seminis Hyoscyami ana ℥ iiij.

Myrrhæ Troglodyticæ ℥ vj.

Turis masculi ℥ v.

Garyophyllorum ℥ ij.

Cinnamomi Syracis rubei ana ℥ ij.

Cum aqua rosarum conficiatur massa.

MAGNAM vim obtinet in tenuibus si-
stendis destillationibus, ac doloribus mi-
tigandis.

Pilule Bechicæ.

℞. Pineorum nucleorum

* Amygdalorum ana ℥ j. β.

Glycyrrhizæ ℥ vj.

Succi

Succi Glycyrrhizæ ℥ iiij.

Cum aqua Rosarum conformetur massa.

ADVERSUS tussim veterem pollent,
& gutturis ac faucium asperitatem.

Pilule Alephangine D. Valerii Cordi.

℞. Myrobalan. Chebulorum

Myrobalan. Citrinorum

Myrobalan. Indorum

Myrobalan. Bellericorum

Myrobalan. Emblicorum ana ℥ j.

Acori veri Galangæ Zedoariæ

Doronici Romani Radicularum Asari

Dictamni nostratis radicum Absinthii

Rosarum ana ℥ iiij.

Contendantur omnia crassiusculè, & Myrobalani per se macerentur priùs in aquæ clarissimæ fontanæ ℞ iiij. per horas xxiiij. deinde coquantur donec ferè tertia pars aquæ sit in vaporem resoluta: postea coque etiam radices & aromata lento igne in duplici vase, cum aquæ clarissimæ ℞ vj. & affunde his antea coctas Myrobalanos cum suo iusculo: ultimò Rosas adiiciendo, coquantur vsque ad tertias. Coletur postea validè exprimendo. Hinc in colatura dissolue

Aloës optimæ & lotæ, ac rursus exiccatae
℞ iiij.

Ponantur omnia in vitrea patina ad so-

lem, aut in stufam; & agitentur sæpius, ut concrefcens in margine Aloë liquido commisceatur: cum verò mellis fpiſſitudinem fuerint cōfecuta, tunc adde ſequentiū ſpecierum puluerem minutiffimè tritum:

℞. Galāgæ Cyperi Zedoariæ Doronici
Ligni Aloës Cinnamomi Schœnanthi
Nardi Celticæ radicularum

Nucis Moſchatæ

Macis Cubebæ Cardamomi

Garyophyllorum ana ꝑ iiiij.

Mastiſches

Succini [*id eſt, Caraba*] ana ꝑ .vj.

Myrrhæ Croci ana ꝑ iiiij.

Agitentur optimè cum Aloë ſpecies, & fiat maſſa cum diligentia.

MYROBALANI omnes hoc pondus debent habere, exemptis nucleis ſive lignis.

PILVLÆ iſtæ Alephangine ſunt efficaces, imò efficaiores prioribus. Relinquimus tamen unicuique liberum arbitrium, alterutram vel utramque componendi.

Hoc loco non debet poni Diſtamnus Creticus, ſed radices Diptamni, quæ vulgò in uſu ſunt, & propriè cortex radicum eius. Germanicè vocatur *Aſchvvurtz*, propterea quòd folia eius ſunt ſimilia *Fraxina ardori*: & hæc eſt vera *Fraxinella*, vulgò ab Italis dicta.

Aloën lauandi modus in poſtrema huius libri parte, quæ eſt De preparatione ſimplicium medic. docetitur.

TROCHISCI.

Trochisci de Vipera, D. Andromachi.

℞. Carnis viperinæ, cū anetho, sale & aqua
coctæ ℥ viij. *

Panis tritici purissimi, triti & cribrati, ℥ ij.

Formentur trochisci cum iusculo, in
quo decoctæ fuerint carnes Viperinæ; &
inungantur cum Opobalsamo, aut Oleo
Macis aut Garyophyllorum, aut Nucis
moschata: sed Oleum Garyophyllorum
propius accedit ad naturam Balsami. Sic-
centur in loco vmbroso, libero, vento quā
perflabili.

VIPERA est serpens, quem recentiores vo-
cant *Tirum*, Itali verò *Marassam* & *Scurzio-*
nem, ut scribit *Nicolaus Leoniceus*. Ingre-
diuntur autem hi Trochisci in *Theriacam*. Apud
nos verò nondum licuit videre hoc serpentum
genus. Igitur ex Italia peti debent veri Tro-
chisci de Vipera.

Trochisci Scillitici Andromachi.

℞. Scillæ assatæ P j.

Farinę Orobi ℥ viij.

Formentur Trochisci secundum artem.

• • • • •

L 7

Tra-

Trochisci Hedychroi, D. Aëtii.

℞. Mari [*sive Maiorana*, aut loco eius *Dictamnus Cretici*]

Asari Sampsuchi

Aspalathi [*eius loco sumatur semē Agni casti*]

Opobalsami [*eius loco accipiatur Oleum Garryophyllorum*]

Schoenanthi

Calamiaromatici [*eius loco sumatur Galāga*]

Phu Pontici ana ʒ j. ḡ xv.

Xylobalsami Cinnamomi

Costi ana ʒ j. β.

Myrrhæ Troglodyticæ

Folii [*aut succedanei eius*]

Spicæ Nardi Indicæ Croci

Cassia ana ʒ iiij. β. ḡ xv.

Amomi [*aut succedanei eius*] ʒ ij. ḡ xiiij.

* Mastiches ʒ β. ḡ vij. β.

Vini veteris odorati dulcis quantum sufficit : formentur Trochisci.

M A R V M herba est non dissimilis Maiorana : Eius loco accipitur Dictamnus Creticus.

S A M P S V C H V S, id est, Maiorana. Quidam habent Amaracum, quod idem est. Non enim debet hoc loco accipi Matricaria, aut Costula foetida, quæ etiam vocatur Amaracus.

A S P A L A T H V S est cortex quidam odoratus. Eius loco accipe Lignum Aloës, aut Santalum Citrinum odoratissimum, aut semē Agni casti.

F O L I V M

FOLIUM] Pro Folio sume Spica Romana
radicum , Macis , ana partes aequales.

Hi Trochisci appellantur ab Arabibus Alin-
daracaron ; à recentioribus verò , ut Nicolao,
sunt parum immutati, & vocantur Diacoralli.

Trochisci Hedychroi, D. Galeni.

℞. Corticum radicum Aspalathi [ipsius lo-
co sumatur semen Agni casti]

Calami aromatici [sume eius loco Galangã]

Costi Asari Xylobalsami Phu

Amaraci [hic significat Maioranam]

Mastiches ana 3 vj.

Schœnanthi Cinnamomi ana 3 xij.

Amomi Cafiæ *

Rheu pontici [eius loco sume Rhabarbarum]
ana 3 xv.

Nardi Indicæ

Folii ana 3 xvj. *

Myrrhæ Croci ana 3 xij. *

Omnia subtilissimè trita cum vino Fa-
lerno , in Trochiscos formentur : qui in
vmbra exsiccantur , & Opobalsamo aut
Oleo Garyophyllorum inuncti reponan-
tur.

G A L E N U S in libello De Theriaca ad Pam-
philianum scripto , ad hunc modum præcipit
conficiendos esse Hedychroos Trochiscos. Sunt
enim proximis non ignaviores.

Pro Aspalatho, quo caremus, licet accipere
semen

Semen Agnicasti, aut Lignum aloës, aut Santalum citrinum odoratum. Oportet etiam diligenter advertere, ne pro Aspalatho Asbalium legatur aut accipiatur.

Pro Amomo vero, quocaremus, pone Carpesum, aut vocatum Calamum aromaticum.

Pro vino Falerno, accipe aliud quodvis vinum generosissimum.

P. C. SCHÖZ.

Troch. horum descriptionem in Cordo vitiatè positam, hic ex Andernaci versione restitui.

Trochisci Hedychroi alii, Galeni.

℞. Mari Amaraci [*id est, Maiorana*]
 Afari Aspalathi ana ʒ ij.
 Schœni [*id est, Squinanthi*]
 Calami odorati Phu Pontici
 Xylobalsami [*aut succedanei eius*]
 Opobalsami [*aut succedanei eius*]
 Cinnamomi Costi ana ʒ iij.
 Myrrhæ
 Folii Malobathri [*aut succedanei eius*]
 Nardi Indicæ Croci
 Cassiæ ana ʒ vj.
 Amomi [*aut succedanei eius*] ʒ xij.
 Mastiches Chiæ ʒ j.
 Vini Falerni quantum sufficit.

Formentur Trochisci, & in vmbra exiccantur, Opobalsamo aut oleo Garyophyllorum vincti.

Pro

Pro Maro, sume Diſſamnum Creticum.

ASPALATHI loco ſume Lignum Aloës,
aut Santalum Citrinum, aut ſemen Agni Caſſi,
ut Galenus de Succedaneis dicit.

Pro Calamo, ſume Galangam.

Pro Opobalſamo, ſume oleum Garyophyl-
lorum.

Pro Malobathro, ſume Spica Romana radi-
cis; aut Spica Romana Radicum, & Maci-
ana partes aquales.

CASIA, id eſt, Caſia lignea aromatica, A
ſimilis Cinnamomo.

AMOMI loco ſume vocatum Calamum
aromaticum.

MASTICHE Chia, id eſt, Maſſix è Chio
inſula, qua eſt optima.

HÆC eſt genuina Hedychroi compositio,
ut Galenus dicit; & hac debet ingredi Theria-
cam Andromachi ſenioris.

GALENVS primo libro de Antidotis ad
hunc modum carmine deſcribit compositiorem
Hedychroi magmatis, ubi Theriaca compositio-
nem docet. Non tamen diligenter diſtinguit pon-
dera rerum. Nam omnia coniungit coniunctio-
nibus copulativis, & & hoc eſt, QVÆ ET.

Trochiſci Cyphi, D. Damocratis. A

R. Carnium Vuæ paſſæ albæ & pinguiſ-
ſimæ

Terebinthinæ coctæ ana 3 xxiiij.

Myr.

Myrrhæ

Schoeni [*id est*, *Schœnanthi*] ana ℥ xij.

Calami vnguentarii ℥ ix.

Cinnamomi ℥ iiij.

B Bdellii Onychis Nardi Spicæ

Casię optimæ [*quæ est similis Cinamomo*]

Cyperi purgati

Arceuthidum maximarum & pinguissimarum ana ℥ iiij.

Aspalathi ℥ ij. β. Croci ℥ j.

Mellis optimi

Vini ana quantum satis est ad formandum & incorporandum.

MELLIS & Vini parum debet addi, ut tantum cum his conficiantur Trochisci.

CARNES Vuæ passæ atque Iuniperi baccas recentes & pingues minutissimè conscindito tunditoq; deinde Bdellium Myrrhamq; affuso vino diluito: postea reliqua omnia in tenuissimum puluerem redigito: ac demum adhibito modico mellis despumati optimi, Trochiscos formato.

Arabes hos Trochiscos vocant Cochion.

Per Vuas passas hic intellige eas quas vocant Vuas Cybibas, vulgò Cibeben.

TEREBINTHINÆ coctæ. Quomodo coquatur Resina Terebinthina, ostendam inferius in tractatu De preparatione medicamentorum.

CALAMVS vnguentarius, id est, aromaticus verus; pro quo sume Galangam; quia
hodie

hodie caremus vero Calamo aromatico.

ONYCHIS, id est, Blatta Byzantia electa.

CYPERVM purgatum precipit accipiendum, quoniam plerumque fibris sordidis sunt obsita radices eius.

ARCEUTHIDES, sunt bacce Juniperi. hic autem debent accipi Juniperi magna grandes bacce: quoniam autem caremus ipsis, vulgaris & minoris Juniperi baccas accipere licet.

Pro Assalatho sumatur semen Agni Casti, ex mente Galeni de Succedaneis.

P. C. SCHOL.

Troch. hi apud Galenum leguntur l. 2. Antid. A

Onychis, Bdellii.] Fuchsius unà cum B
 Cordo duas hic distinctas res legit, intelligit ac
 defendit mordicus. Matthiolus verò atque
 Franciscus contrà, unà cum Andernaco &
 Martiano Rota Galeni interpretibus pro unica
 eadèmq; re, ambas eas voces intelligendas esse
 strenuè contendunt, & Unguim Bdellii tanquàm
 Bdellium ungui simile, legendum esse sentiunt
 atque volunt.

Trochisci Ramich, D. Mesue.

Rz. Succì Acetosæ [aut loco eius succi Cydo-
 niorum austerorum] \mathfrak{z} xvj.

Rosarum \mathfrak{z} j.

Granorum Myrti \mathfrak{z} ij.

Bulliant parum, & colentur: colaturæ
 addan-

*

addantur Gallarum iamiam tenuissimè
tritarum ℥ iiij.

Coquantur denudò aliquantulum: dein-
de inspergatur sequentium specierum mi-
nutissimus & optimè commistus pulvis:

Rosarum ℥ j.

Santali Machoziri ℥ j. ʒ. ij.

Gummi Arabici ℥ j. ʒ. iiij.

Carnium Sumach Spodii ana ℥ j.

* Succi Agrestæ ʒ viij.

* Succi granorum Myrti multum tritorum
℥ iiij.

* Ligni Aloës

Garyophyllorum

Mastiches [al. Macis]

Nucis Moschatae ana ʒ iiij.

Misceantur omnia optimè, deinde ex-
siccantur: exsiccata rursus in tenuissimum
pulverem terantur; & formentur Trochisci
subtiles, cum Camphoræ aureo vno, &
aqua Rosarum q. s. Exsiccantur in umbra
libera: exsiccati reponantur.

VENTRICULUM, cor, hepar, im-
becilla firmant: & lubrica viscera ac inte-
stina, choleram morbum sistunt, acrimo-
niam obtundunt, animum reddunt tran-
quillum, omnem hæmorrhagiam cohi-
bent: ob quam naribus sanguine fluenti-
bus flando impelluntur, aliis medicamen-
tis miscentur.

Trochisci de Cappare, D. Mesua.

℞. Corticum radicum Capparis
 Seminis Agni Casti ana ʒ vj.
 Seminis Nigellæ veræ Calaminthæ
 Succī Eupatorii, *idest*, Gratiolæ]
 Acori *
 Amygdalorum amarorum
 Sem. Nasturtii Ammoniacy
 Foliorum Rutæ
 Radicis Aristolochiæ rotundæ veræ ana
 ʒ ij.
 Cyperi
 Scolopendriæ ana ʒ j.

Formentur Trochisci cum Hammonia-
 co prædicto in aceto dissoluto, & exiccati
 reponantur.

SCOLOPENDRION est *Ceterach*, &
 non *Lingua cornina*.

P. C. SCHOL.

Troch. de Capp.] Compositionem hanc A
 apud Cordum mancasse cum Euchsus me-
 ritò conqueratur, nos eam hic ex vetustis par-
 tim exemplaribus, partim ex Minoritarum in
 Mesuem (ex quibus pleraque alia) restitutio-
 nibus, sue integritati reposuimus. Qui, in-
 quam, Fraterculi hoc nomine herclè plurimum
 laudis ac præmii merentur, quòd extra profes-
 sionem etiam ea in re plura præstiterint soli,
 quàm innumerī alii; quamquam eos cassitare
 QUAM-

quandoque, & iudicio carere interdum satis sit in confesso: laborem interim indefessum, quem in restituendo impenderunt, negotiumq; ipsum tam ingens, tantiq; commodi nobis præsitum haud exosculari, magniq; efferre praconiis non debemus. Immeritò itaque nimisq; quàm deceat, à quibusdam exagitantur boni fratres.

A d splenis duritiem & flatus eius dissipandos valent.

*Trochisci de Eupatorio
D. Mesue.*

R. Tereniabin [idest, Manne]

Succi Eupatorii ana ℥ j.

* Rosarum ℥ β. Spodii ℥ iiij. β.

Spicæ Nardi Indicæ ℥ iiij.

Rhabarbari Asari

Anisi ana ℥ ij. β.

Formentur Trochisci cum aqua Cuscutæ, & in vmbra libera ventoq; perflata exiccati reponantur.

Pro Spodio sumatur Ebur combustum.

EUPATORIVM Mesue, intelligendum est *Gratiola*.

OBSTRUCTIONEM & tumorem præter naturam hepatis & lienis sanant, ac inde natas febres antiquas, & harum rigorem, icterum, ac incipientem hydroperem.

Tro-

Trochisci Diani, seu potiùs, Diaion, A
D. Nicolai.

R. Florum Violarum viridium ʒ. v.
 Amyli ʒ iiij.
 Seminis Papaveris albi ʒ ij. ʒ j.
 Rhabarbari ʒ j. ʒ ij.
 Seminis Plantaginis ʒ j.
 Balsami [loco eius Oleũ Garyophyllorũ] ʒ j.
 Rhodostagmatis quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

DIANI, vel DIAVI, aliàs vocantur
 hi Trochisci, sed corrupto nomine.

PER VIOLAS, hoc loco oportet intelli- B
 gere Violas albas, quæ hodie vocantur Cheyri
 Citrini, vulgò Gelbe Violen.

Per Balsamum intelligitur Opobalsamum.

RHODOSTAGMA, id est, Aqua Ro-
 sarum.

P. C. SCHOL.

Troch. Diani.] Horum Troch. duas descri- A
 ptiones in idem recidentes, alterius pondere
 tantum triplicato, mendoq; in Rhabarbari pon-
 dere sublato, temerè Cordus posuerat. Mancè
 enim ibidem ʒ j. quod & Fuchsius ritè ani-
 maduerterat, positus erat, cum ʒ j. ʒ ij. ut
 restitui, legendum sit.

Per Violas.] Malè id sentit Cordus, ut & B
 Fuchsius docet: non enim Dialencoion, hoc
 est, ex Violis albis, quas Cheyri vocamus, sed
 Dia-

Diaion, hoc est, ex Violis nigris seu Martiis dictis, appellantur hi Trochisci. Viola itaque Martia virentes hic intelligenda veniunt.

EXCALFACTIONES mitigant, al-
numque emolliunt.

Trochisci de Lacca, D. Mesue.

℞. Laccæ mundatæ

Succi Glycyrrhizæ

Absinthii

Berberis

Succi Eupatorii [*id est, Gratiola*]

Rhabarbari Aristolochiæ longæ

Costi Asari

Amygdalorum amarorum

Rubæ Tinctorum

Anisi Apii

Schœnanthi ana ʒ j.

Formentur Trochisci dragmæ pondere
cum aqua Eupatorii.

*Mesue intelligit suum Eupatorium, id est,
Gratiolam.*

Trochisci de Lacca valent ad obstructio-
nes hepatis & lienis, & inde natas febres
varias antiquas, & ascitem per urinas mo-
uent.

Trochisci Diarhodon D. Nicolai.

℞. Rosarum viridium ʒ iiij.

Spodii [*id est, Eboris combusti*] ʒ ij.

San-

Santali rubri ʒ j. β. Ḡ vij.

Santali albi ʒ j. Ḡ xij.

Croci ʒ ij. Ḡ viij.

Camphoræ Ḡ xij.

Aquæ Rosarum quantum sufficit, formentur Trochisci.

Ista compositio debet administrari in magnis confectionibus ipsius Nicolai.

Trochisci de Rhabarbaro

D. Mesuæ.

℞. Raved boni [*id est*, Rhabarbari] ʒ x.

Succi Eupatorii [*id est*, Gratiolæ] ʒ iiij.

Rosarum ʒ iiij.

Spicæ Nardi Indicæ Anisi

Rubiæ tinctorum Seminis Apii

Absinthii Asari ana ʒ j.

Amygdalatum amaratum ʒ iiij.

Formentur Trochisci autem unius pondere, cum aqua Cuscutæ.

VALENT ad hepatis obstructionem, dolorem, tumores præter naturam, affectus inueteratos eiusdem, & hydropem, & icterum, & formæ corruptionem.

Trochisci de Berberis D. Mesuæ.

℞. Berberis ʒ ij.

Spodii Xyloaloës

Seminis Acetosæ Mastiches

M Gallia

Gallię Moschataę verę

* Spicę Nardi Indicę ana ʒ i.

Rosarum ʒ v.

Gummi Arabici ʒ iiij.

Aquę Rosarum quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

TROCHISCI de Berberis seu Oxycanthę valent ad intemperiem calidam, fluorem alui, & hepatis dolorem.

Trochisci Gallia Moschata,

D. Mesue.

℞. Xyloaloës crudi ʒ v.

Ambrę ʒ iiij. Moschi ʒ j.

Mucilaginis Tragacanthę cum aqua Rosarum factę quantum sufficit.

Formentur Trochisci parui.

CEREBRVM, corq̃ue roborant : vomitum & alui profluuium sistunt : oris atque aded corporis totius odorem commendant.

Trochisci Alient Moschata,

D. Nicolai.

* ℞. Ladani purissimi ʒ iiij.

Styracis Calamitę ʒ j. ʒ.

Styracis rubrę ʒ j.

Ligni Aloës ʒ ij. Ambrę ʒ j.

Camphorę ʒ j. Moschi ʒ ʒ.

Aquę

Aquæ Rosarum quantum sufficit.

Formentur Trochisci secundum artem.

STYRAX rubra, hic non significat Thymianum, aridum illud & nigrum corticem; sed resinam Syriacis; qua subrufa aut flava est, id est, optima Syrax.

VALENT pueris patientibus asthma & constrictionem pectoris, & etiam non valentibus lac retinere. Fit inde optimum fumigium & odoriferum: & assumuntur etiam ad pretiosissimas medicinas.

*Trochisci de Agarico D. Mesue,
cap. de Agarico ex Haly.*

℞. Agarici electi ℥ iiij.

Salis gemmei ℥ j.

Syrupi acetosi simplicis quantum sufficit.

Formentur Trochisci, & reponantur in calido siccoque loco.

PURGANT ex cerebro & capite phlegma crassum cum cholera mistum. Et præcipuè educunt ex pectore crassos humores, putridos & viscosos.

*Agaricus Trochiscatus D. Mesue,
cap. de Agarico ex Galeno.*

℞. Agarici electi ℥ iiij.

Vini infusionis Zingiberis q. s.

Formentur Trochisci.

Succi Artemisiæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci secundum artem.

MENTHASTRUM est siluestris *Mentha*, pilosis & hirsutis foliis.

PYLEGIUM *Cerninum*, idest, *Dictamnus Creticus*.

PROVOCANT menstrua; & sedant passiones, quæ ex retentione menstruorum proueniunt.

Trochisci de Alkekengi, D. Mesua.

R. Fructuum Alkekengi ʒ iij.

Seminis Citrulli Seminis Albatechæ

Seminis Cucurbitæ ana ʒ iij. β.

Boli Armeniaci *

Gummi Arabici Turis

Sanguinis Draconis Papaueris albi

Amygdalorum amarorum

Succi Glycyrrhiæ

Tragacanthæ Amyli

Pinearum ana ʒ vi.

Seminis Apii Charabis

Boli [aut eius loco Terre sigillate] *

Hyoscyami Opii ana ʒ ij.

Succi Alkekengi quantum satis fuerit ad
formandum Trochiscos.

Fiunt & hi Trochisci sine Opio

ALBATECHA, sine Batega, est Melon
magnus Indus, viridis & subniger.

TROCHISCI Alkekengi seu Halica-

M. 3

cabi

tibi valent ad renum & vesicæ ulcera, & natam inde dysuriam.

Trochisci de Rosis, D. Rhasis.

- * R. Rosarum ʒ iiij.
- * Ligni Aloës
- * Spicæ Nardi Indicæ Mastiches
- Cassia lignæ [aut succedanei eius]
- Florum Squinanthi Cinnamomi
- Absinthii ana ʒ j.
- Vini veteris quantum ad formandum Trochiscos satis fuerit.

Sunt efficaces ad multos affectus, præsertim ad ventriculi dolorem, malam coctionem, febres antiquas, hydropem incipientem, & illos maximè quibus forma corrumpitur.

Trochisci de Camphora, Mesæ.

- R. Rosarum ʒ iiij.
- Spodii Glycyrrhizæ ana ʒ ij.
- Seminis Cucurbitæ Seminis Citrulli
- Seminis Cucumeris
- Seminis Melonis
- Tragacanthæ Croci
- Gummi Arabici
- Spicæ Nardi Indicæ ana ʒ i.
- Santali citrini ʒ ij. β.
- Ligni Aloës Cardamomi Amyli
- Cam-

Camphoræ ana ʒ ij.

Sacchari Tabarzeth

Tereniabin [*id est, Manna*] ana ʒ ii.

Mucilaginis Psyllii cum Aqua Rosacea factæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

T R O C H I S C I Camphoræ conferunt ad febres ardentes, bilis & sanguinis feruorem, ventriculi & hepatis intemperiem calidam, & ab his sitim inextinctam: icterum quoque ac phthisim & hecticam curant.

Trochisci de terra sigillata,

D. Mesue.

℞. Sanguinis Draconis

Gummi Arabici assati

Trochiscorum Ramich

Rosarum rubrarum Seminis Rosarum

Amyli assati Spodii Acaciæ

Lapidis Hæmatitidis Hypocistidis

Florum Balaustiorum Boli Armeniaci

Terræ sigillatæ [*vel Boli Armeni*]

Corallii rubri Charabiis ana ʒ ij.

Margaritarum Tragacanthæ

Papaueris nigri ana ʒ j. ʒ.

Seminis Portulacæ assati

Cornu ceruini vsti Turis

Gallarum Cypressi

Croci ana ʒ ij.

M 4

Aquæ

Aquæ Arnoglossæ quantum sufficit.

* Formentur Trochisci.

Et quandoque adduntur Opii ℥ ij.

S P O D I I.] *Pro Spodio sume Ebur combustum preparatum.*

S E M E N Rosarum hic significat Antheram, id est, luteos apices, qui sunt in Rosis: hi exiccati rubescunt.

G A L L Æ Cypressi, etiam vocantur Nuces Cypressi.

P. C. SCHOL.

Mesues exemplaria Gallas absolutè scriptas habent.

S V N T admodum efficaces ad sputum sanguinis, cum aqua Plantaginis poti; ad fluorem verò sanguinis è naribus, fronti illiti; ad menses immodicos, vtero injecti vel pubi illiti; ad mictum sanguinis, in vesicam injecti; & ad alias hæmorrhagias, parti sanguine fluenti impositi.

Trochisci de Spodio, Mesua.

R. Rosarum rubearum ℥ xij.

Spodii ℥ x. Seminis acetosæ ℥ vj.

* Seminis Portulacæ

Coriandri præparati & tosti

Pulpæ Sumach ana ℥ ij. β.

* Amyli assi Florum Balaustiorum

Baccarum Berberis ana ℥ ij.

Gummi Arabici assati ℥ j.

Agre-

Agrestæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

VALENT ad febres biliosas cum alui fluore: inflammationem ventriculi & hepatis, & sitim continuam sedant.

Trochisci de Absinthio, D. Mesua.

R. Rosarum Absinthii

Anisi ana ʒ ii.

Raued [id est, Rhabarbari]

Succi Eupatorii [id est, Gratiola]

Asari Seminis Apii

Amygdalorum amarorum

Spicæ Nardi Indicæ Mastiches

Folii ana ʒ j.

Succi Endiuixæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci secundum artem.

*Pro Folio accipe radices Spica Romana, aut radicem Spica Romana & Macis ana partes æquales.

OBSTRUCTIONES ventriculi & hepatis, & ab his dolorem, & febres antiquas tollunt: ciētās partes reliquasque nutritorias roborant; ac appetentiam excitant.

Trochisci Albandi, D. Mesua.

R. Pulpæ Colocynthidis ʒ x. A.

Incidantur minutissimè, & fricentur cum Olei Rosacei ʒ j.

M 5

Deinde

Deinde sume Tragacanthæ
Gummi Arabici Bdellii ana ʒ vj.

Macerentur hæc in Aqua Rosacea, donec liquefiant & dissolvantur: deinde cum parte resolutarum lachrymarum formantur ex prædicta Colocynthide Trochisci: qui siccantur, & cum fuerint siccati, contundantur minutissimè; & rursus formantur Trochisci cum reliquo diluto lachrymarum, atque reponantur.

Trochisci Colocynthidos in Hieram Hermetis, & Compositiones alias iniciendi loco Colocynthidos: suntq; salubriores quàm ipsa Colocynthidis.

P. C. SCHOL.

§ x.] Cordum hic falli Bernardus Dessenius in suis illis verbosis Commentariis, miserè exclamat, è quòd § x. pro ʒ x. ut ipse inquit, hic posuerit: cum ipsemet hac in re (ut & plerisque aliis locis) iudicio vacuus, toto erret cælo. Verùm in alio Dispensariolo Senatus sui iussu emissio, dextrè resipuit, à suis collegis forsàn monitus. Proinde quid Fuchsius, artis nostræ (ut & plurimis aliis locis liquet) nescius, in Pharmaceuticas rationes, hoc loco suis annotationibus imaginando deliret, nescio. Mihi breuitati studendum est.

Trochisci Bechii albi.

R. Sacchari albissimi ꝑ j.
Sacchari Candi optimi

Sac.

Sacchari Penidii ana \mathfrak{z} iiij.

Ireos \mathfrak{z} j. \mathfrak{z} vij.

Amyli \mathfrak{z} ij. β .

*

Mucilaginis Tragacanthæ albiſſimæ cum
Aqua Roſacea factæ quantum ſuf-
ficet.

Formentur Trochiſci parui, & ſignentur.

AUXILIANTUR tuſſiculosis, & dif-
culty ſpirantibus.

Trochiſci Bechii nigri.

R. Succı Glycyrrhiæ \mathfrak{z} iiij.

Syracıs Calamitæ \mathfrak{z} j. β .

Sacchari Candi \mathfrak{z} ij. β .

Specierum Diaireos Salomonis

Specierum Lohoch ſani ana \mathfrak{z} β .

Sacchari Penidii \mathfrak{p} β .

Sacchari albiſſimi \mathfrak{l} ij. \mathfrak{z} iiij.

Mucilaginis Tragacanthæ cum aqua Hyſ-
ſopi factæ quantum ſufficit.

Formentur Trochiſci, & ſignentur.

ABSCISSÆ vocis iacturam reſar-
ciunt: & proſunt his qui patiuntur tuſſim
calidam & ſiccam: leniunt pectus, & fa-
cilitant ſputum.

TROCHISCORVM DVÆ
SEQUENTES VALERII CORDI
*descriptions nuper his ultimis
editionibus accesserunt.*

Trochisci de Lacca Val. Cordi.

℞. Laccæ electæ ℥ iiij.

Ligni Guaiaci scobina in minimam scobem seu rasuram detriti ℞ j.

Coquatur lignum Guaiacum in ℞ iiij aquæ cælestis ad consumptionem ferè dimidiæ partis : In colatura deinde coquitur ad Rad. Rubiæ tinctorum ℥ iiij. donec remaneat ℞ j β. Dein iterum colato, & colaturæ iniice prædictas ℥ iiij Laccæ ; & ad ignem coquito , donec Lacca dissolvatur. Postea colato & exprimito , & abiice superfluitates Laccæ. Colaturam dein ad spissitudinem aliquam coquito ; & insperge sequentes pulveres :

℞. Aristolochiæ longæ

Radicis concauæ

Rhabarbari Costi veri ana ℥ ij.

Zedoariæ Galangæ Asari radicem

Curcumæ Cinnamomi Ligni Aloës

Nucis moschatæ Schœnanthi ana ℥ j.

Samphoræ ℞ j.

Misceantur omnia optimè, & formantur Trochisci drachmæ unius pondere.

R. A.

RADIX concava, Holvuriz, qua falsò appellatur Aristolochia rotunda.

Hos Trochiseos composui aliquibus obstructione splenis hepatisque laborantibus; & præsentì auxilio id malum curauerunt.

Trochisci de Succino, Valerii Cordi.

℞. Ambræ excellentissimæ
 Succini albissimi ana ʒ j.
 Succini Phalerni
 Succini cerei ana ʒ iiij.
 Succini nigri Camphoræ
 Margaritarum non perforatarum
 Margaritarum perforatarum ana ʒ ij.
 Onychis Dentaliorum
 Entaliorum Umbilici marini
 Lapidum cancrorum
 Synodontum Ligni Aloës
 Cinnamomi
 chænanthi Nucis moschatæ
 Cubebarum
 Cardamomi Croci
 Cyperi rotundi
 Zedoariæ Doronici ana ʒ j.

Conterantur omnia minutissimè, & conficiantur Trochisci cum mucilagine Tragacanthæ albissimæ in aqua Maioranæ dissolutæ.

A.M.B.R.A est Succinum Orientale.

SUCCINUM est quod Arabibus vocatur *Carabe*, Germanis *Agstein* sine *Bernstein*: *Sudanis*, *Gentor*: *Gallis*, *Ambre*. Est enim *Succinum* nihil aliud quàm *Ambra Germanica*.

Phalernum, id est, flavum & clarissimum, & omnino pellucidum.

Cereum, id est, quod cera colorem habet, non adeò pellucidum est.

Nigrum Succinum alio nomine vocatur *Gagates lapis*, Germanicè *Svartzzer Agstein*, oder *Svartzzer Bernstein*.

Inter emendum album *Succinum*, vitare oportet scobem & ramenta: nam hæc salent pro albo *Caraba* vendi. Cum enim *Cereum* aut *Phalernum Succinum* tornatur, candida ramenta remittit. Ideoq; integras glebas candidi *Succini* emere oportet. Est enim valdè pretiosum.

Onychis, id est, *Blatta Byzantia*.

Umbilici marini, Germanicè *Meerbonen*.

Lapidum Cancrorum, id est, quos vocant *Oculos cancerorum*.

Synodontes lapides sunt in capite *Synodontis* piscis inuenti: qui si haberi non possunt, quoniam piscis marinus est, pro iis accipiantur lapilli qui bini inveniuntur in capitibus piscium fluviatilium, quos *Raulperszen* Germanicè vocant.

Hi Trochisci faciunt ad calculum, ad tumentem ventriculum, vertiginem, epilepsiam, apoplexiam, tremorem & imbecillita-

cillitatem cordis, ad paralyſim, ſi dentur in aquis appropriatis, cum Betonicæ floribus, aut Lauendulæ, aut Tiliæ: & ad ſuffocationes & ſtrangulationes vteri valent.

OLEA.

Oleum ex ligno Iuniperi.

Fiſtile vas in foueam ponatur: ſupra id aliud fiſtile anguſti oriſicii inuerſum ponatur, recentibus Iuniperi lignis minutimque incifis plenum: cui ſubducatur lamina ferrea foraminibus peruia, vt deſtillet liquor, & ne ligni ſegmenta delabantur. Bene autem aptentur, & luto ſapientiæ circumlinantur fiſtilium oriſicia, ne quidquam exſpiret. Poſteà inferius fiſtile uſque ad collum ſuperioris obruito terra, & factò pauimento ignem circa & ſupra fiſtile ſuperius accendito; atque ardere ſinito aliquot horas. Poſtremò liquorem qui deſtiliauit, aufero. Cuius uſus eſt purgandis ſordidis vlceribus.

EMENDAT cutis infeſtiones, ſerpinginem, cancrum, vlcera maligna, qualia quæ in tibijs & cruribus quorundam, malum mortuum recentiores vocant.

Oleum

Oleum ex Juniperi baccis.

Oleum à Juniperi baccis elicetur per artem distillandi, ut Vinum sublimatum. Quia verò minoris emitur quàm ut ab aliquo Pharmacopola preparari queat, confectionem eius non indicabimus.

Oleum Nardinum simplex, D. Mesuae.

℞. Spicæ Nardi aromaticæ ℥ iiij.
Vini Aquæ ana ℥ ij. β.
Olei Sesamini ℥ j. β.

Coquantur in duplici vase, donec vinum & aqua in vaporem resoluantur: coletur deinde Oleum; & colatum reponatur, abiecta Nardi Spica.

VAS duplex, Gracè vocatur *DIPLOMA*: constat duobus crateribus, altero alteri imposito, ita ut in unum aromata & oleum coniiciantur; in alterum verò aqua fundatur, quæ subiectis prunis calefacta suo tepore unguenta & olea decoquit. Est autem hoc notandum in omnibus aromaticis oleis quæ decoquuntur.

CALIFACIT, tenuat, digerit, modicè adstringit: proinde affectus omnes frigidos & flatulentos cerebri, ventriculi, hepatis, lienis, renum, vesicæ, vteri
magno-

magnoperè iuuat: naribus iniectum, caput purgat, corporis colorem & odorem commendat.

Oleum Nardinum compositum,
D. Mesuae.

℞. Spicę Indicę ℥ iiij.
Sampſuchi [*id est, Maiorana*] ℥ ij.
Xyloaloës Enulę Folii Indi
Calami aromatici [*eius loco sumatur Galăga*]
Foliorum Lauri
Cyperi Schœnanthi
Cordumeni ana ℥ j. β. *

Contundantur omnia grosso modo:
deinde affunde illis

Aquę fontanę
Vini ana quantú sufficit, i. circiter ℥ xiiij. *
Olei Sesamini ℥ vj.

Macerentur per noctem: deinde coquantur in Diplomate, id est, duplici vase, secundum artem.

PRO Folio Indo, recipe Spica Romana
radicum, Macis ana ℥ vj. [non ℥ vj.]

Oleum Costinum, D. Mesuae.

℞. Costi amari [*optimi & veri*] ℥ ij. *
Casię [*aut succedanei eius*] ℥ j.
Summitatum Sampſuchi ℥ ij. *
Vini quantum sufficit

Olei

* Olei Sefamini ℞ ij.

Macerentur duabus noctibus, deinde coquantur in duplici vase secundum artem.

CASIA, *Aromatica vera*, & *Cinnamomo similis accipi debet.*

CALEPACIT, obstructa aperit, nervosum genus roborat, ut nervos, musculos, tendones, ligamenta, ventriculum: præter hæc, hepar & capillos. Canitiem ob id moratur, & corporis colorem ac odorem commendat.

Oleum de Piperibus, D. Mesuæ.

℞. Macropiperis [*id est, longi*]

Melanopiperis [*id est, nigri*]

A Leucopiperis [*id est, albi*] ana ʒ iiij.

Myrobal. Chebulorum

Myrob. Bellericorū Myrob. Emblicorum

Myrobal. Indorum ana ʒ v.

Radicum Arii

Radicum Fœniculi ana ʒ iiij. β.

Sagapeni Opopanacis

B Ammoniacy ana ʒ ij. β.

C Turbith albi ʒ ij. Zingiberis ʒ iiij.

Caulis foliorum recentium

Thymi viridis Rutę viridis ana m. j.

Coquantur secundum artem in aquę quantitate sufficienti ad tertias. Colaturę adde olei de Cherua ℞ ij. & iterum coque ad consumptionem aquę.

P. C. SCHOL.

Ana ʒ iiij.] Cordus malè ʒ iiij. hic habebat.

Ammoniacy.] Hyoscyami fœdè in Cordo B legebatur.

ʒ ij.] ʒ xij. vitiosè Cordus scripserat, ut C hac omnia ritè à Fuchsio quoque dicuntur: quamquam à Monacho hausta esse non dubitem.

IVVAT morbos neruorum frigidos, ut paralyfin, spasmus, spasmus cynicum, tremorem, epilepsiam: adhæc ischiadem, & cæteras arthritidis differentias, & vteri, coli, renum, vesicæ affectus frigidos. quia calefacit, tenuat, terget: ob id obstructions aperit, calculum frangit.

Oleum Mandragoræ, D. Nicolai.

R. Olei P v.

Succi malorum Mandragoræ ʒ viij.

Succi capitum Papaueris hortensis ʒ vj.

Succi Hyoscyami albi ʒ iiij.

Succi Violarum

Succi Cicutæ tenerrimæ ana ʒ ij.

Opii Stryacis ana ʒ j.

Confice sic: misce simul omnes succos oleo; atque in vitreo vase, obstructo orificio, Soli exponito per decem dies. Vndecimo die coquantur in duplici vase vsque ad con-

ad consumptionem succorum : deinde ubi refrigerari cœperit, cola : & colato oleo adde Styracem & Opium ; & confice secundum artem.

STYRAX quidem sincerus & purus facile in oleo dissolvitur :

OPIVM verò sincerum in oleo dissolui non potest. Igitur tenuissimè tritum inspergatur oleo, & sæpè misceatur : nam nisi in aqua aut vino dissolvatur, non commiscebitur oleo.

Non habentur apud nos *Mandragora* pomma : ergo loco succi *Mandragora* pomorum accipe infra scriptam decoctionem :

Rx. radicum *Mandragora*, id est, Corticum radicum eius l j. Contundantur, & coquantur in aqua sufficienti ; & colatum decoctum succis adde.

Ad nimios dolores capitis valet, & phreneticis malè dormientibus, fronti illitum, & naribus iniectum, vehementer opitulatur : pulsibus brachiorum & plantis pedū illitum, quocumque modo vigiliis fatigatū celerrimè obdormiscere facit.

Oleum Mastichinum, D. Mesue.

Rx. Olei Rosacei ℥ xij.
Vini odoriferi ℥ iiij.
Mastiches electæ ℥ iiij.

Coquantur secundum artem usque ad consumptionem vini.

CERE.

CEREBRVM, nervos, iuncturas, ventriculū, hepar corroborat: tumores du-
ros lenit, dolores sedat.

Oleum de Euphorbio D. Mesuæ.

R. Euphorbii \mathfrak{z} β .

Olei Cheyrini \mathfrak{z} v.

Vini odoriferi tantundem. Coque secundum artem usque ad consumptionem vini.

IVVAT maximè frigidos cerebri & nervorum affectus, cephalalgiam, hemi-
craniam, lethargum, naribus immixtum.
Articulorum quoque & hepatis, & splenis
dolores, illitum lenit.

*Oleum Castorei, D. Iacobi
de Manliis.*

R. Castorei Styracis calamitæ

Galbani Euphorbii

Cassæ lignæ veræ Croci

Opopanacis

Carpobalsami [*aut succedanei eius*]

Spicæ Nardi Indicæ

*

Costi ana \mathfrak{z} iij.

Cyperi Schœnanthi Macropiperis

Melanopiperis Sabinæ

Pyrethri ana \mathfrak{z} ij. β .

Olei ℞ iij.

Vini odoriferi ℞ ij.

Con-

Confice sic : Galbanum & Opopanacem in vino seorsim dissolue : deinde reliqua omnia contusa cum oleo & vino coquito ad consumptionem vini in duplici vase. Postcà cola, & dissolutum & expressum Galbanum cum Opopanace oleo adfunde : & iterum coque ad consumptionem vini : & repone, sæpius miscens in posterum, ut Galbanum & Opopanax in vasis fundo subsidentes, oleo commisceantur.

Est optimum contra omnes ægitudines frigidas, præsertim nervorum & iuncturarû : medetur paralyfi, spasmò, tetano ; & sedat acerrimos rigores, & frigora febrium, si spina dorû linatur.

*Oleum Scorpionum simplex,
D. Mesuæ.*

- * R. Scorpiones numero xx. vel xxx. secundum eorum magnitudines.

Olei Amygdalorum amarorum P ij.

- * Macerentur in vase vitreo stricti orificii per dies xxx caniculares ad solem, vel pluribus diebus : postcà colatum ad vsum reponere.

LAPIDEM renum & vesicæ frangit & expellit, lumbis, pubi, peritonæo illitum, aut per meatum urinarium iniectum.

Oleum

*Oleum Scorpionum compositum,
D. Mesua.*

℞. Aristolochiæ rotundæ

Gentianæ Cyperi

Corticum radicum Capparis ana ℥ j.

Olei Amygdalorum amarorum ℥ j. ꝑ.

Macerentur in oleo contusæ radices ad Solem feruidum diebus viginti : deinde coquantur aliquantulum in duplici vase, iniectis ad vltimum Scorpionibus num. xv. postea iterum serenis diebus xxx ad Solem macerentur. Postremò excolatum oleum reponatur.

ARISTOLOCHIA rotunda non est Holvuntz, sed radix lutei coloris, odore & sapore Aristolochia longe. Affertur ex Italia.

VALET contra venena, & pestilentiam.

Oleum Formicarum, Nicolai.

℞. Formicarum alatarum quantum vis

Olei quantum sufficit.

Macerentur æstate ad solem diebus xl. postea excolatum oleum repone.

VALET ad confortandum coitum, vnguendo partes destinatas generationi.

Oleum

Oleum Lumbricorum terrestrium.

℞. Vermium terræ ℥ β.

Olei oliuarum ℥ ij. Vini ℥ ij.

Bulliant omnia simul, & fiat oleum: deinde percoletur & referuetur.

NERVOS in frigidatos confortat; & utile est doloribus iuncturarum.

Oleum Vulpinum, D. Mesuae.

℞. Vulpem, detracta pelle, & abiectis interaneis: incidatur in partes, & coquantur in Aquæ fontanæ &

Aquæ marinæ ana ℥ iiij. ℥ iiij.

Olei veteris clari ℥ iiij. ℥ ix.

Salis ℥ iiij. Intercoquendum adiace Anethi Thymi ana ℥ j.

Coquantur autem quousque ab ossibus recedat caro, & aqua consumatur: deinde coletur oleum, & excolatum ad vsus suos referuetur.

Qui prope mare non habitant, sumant aquam salsam, id est, Muriam; siue aquam fontium salserum, ubi salina fuerint. Porro ad coquendam Vulpem non sufficit aquarum praescriptarum quantitas: ideo accipe quantum abundè satis fuerit, & fortiter ultimè oleum exprime.

AD podagras, reliquasque arthritidis spe-

species, ac dorsi, renumque dolorem est efficacissimum.

Oleum de Cappare.

℞. Corticis radicum Capparis ʒ j.

Corticum Tamarisci

Foliorum Tamarisci

Seminis Agni casti

Scolopendriæ [*id est, Asplenii*]

Cyperii ana ʒ ij.

Rutæ ʒ j. Aceti

Vini optimi ana ʒ ij. ★

Olei maturi ℥ j.

Coquantur in duplici vase usque ad consumptionem vini & aceti.

VALET duritiei, oppilationi, & dolori splenis, ac omni eius ægitudine.

Oleum de Lateribus, D. Mesue.

℞. Laterem aut tegulam rufam antiquissimam, ex rufo luto ductam: eam confringe in frusta mediocria, & in prunis vrito, donec tota excanduerint: deinde è prunis exempta fragmēta restinguito in oleo claro veteri, & dimittito quousque se oleo impleuerint: postea oleo exempta in tenuissimum pulverem contundito, atque in Retortam aut Cucurbitam vitream indito, & secundum

N artem

artem luto chymistico iuncturas vitrorum claudito, & subtus accensis prunis oleum elcito; & elicitedum reponito.

C O N V E N I T omnibus morbis frigidis. Est enim calidum, penetratiuum, resolutiuum: mollit dura, & discutit tumida. Opitulatur his qui patiuntur epilepsiam, vertiginem, obliuionem, paralyfin, spasmus, dolorem dorsi & genuum, podagram, vel alios iuncturarum & neruorum morbos: medetur spleni, vesicæ & renibus.

Oleum Terebinthinæ.

R. Resinæ Terebinthinæ aut Laricæ, quam in Germania Terebinthinam vocamus, ℞ iiii.

Eam pone in capacem Retortam, siue Cucurbitam vitream, & per artem destillatoriam elice eius oleum, ita vt Cucurbita aut Retorta arenæ imponatur Primò autem cum aqua exhibit oleum tenue & clarum, secundò aurei coloris, vltimò fuscum & crassum. Horum vnumquodque per se auferto, & reponito.

C O N F E R T omnibus ægitudinibus frigidis, & maximè neruorum.

*Oleum Tartari, seu Vini Facum
exsiccatarum.*

R. Tartari puri ℞ iiii.

• Pone

Pone in ollam, & vñ in fornace cum lateribus aut regulis aut físilibus, vel per se, donec omninò excandescat Tartarum. Postea impone in sacculum laneo panno factum, & suspende in cellario: tum destillabit ex eo clarus quidam liquor; quem repone. Porro reverà hic humor non est oleum, sed acerrima aqua.

V A L E T ad faciem tergendam, & erugendam.

Oleum Cydoniorum, D. Mesua.

R. Cydoniorum non excorticatorum
Succi Cydoniorum ana quantum sufficit.

Incidito Cydonia; & impone in vas vitreum, & affunde succum. Affunde etiam oleum omphacinum, hoc est, immaturum, ut excedat eius quantitas succi mensuram. Postea stringe vasis orificium, & ad Solem omnia macera, aut in æstuario diebus quindecim: dein se coque in duplici vase, & abiice posthac Cydonia, & adde recentia: & rursum macera & coque: inde etiam tertio recentia Cydonia impone; & prædicto modo omnia perage. Tum repone diligenter obstructum, ne exspiret.

Hodie tanta diligentia non fit hoc oleum: igitur rogo ut maiorem diligentiam impendant.

EST optimum contra debilitatem stomachi, vomitum & fluxum: sistit sudorem: restaurat resolutionem, lapsas vires: corroborat nervos & vires: confortat digestivam.

Oleum Sampsuchinum.

℞. Foliorum Sampsuchi m. iiij.
 Serpylli m. ij.
 Foliorum Myrti m. j.
 Abrotoni Sisymbrii ana m. β.
 Casia lignea veræ ℥ ij.
 Olei omphacini quantum sufficit.

Concidito & contundito omnia, & vitreo vasi impone; ac infunde oleum, ut supra species emineat. Tum obstructo vasis orificio macera ad solem vel in æstuario diebus octo. Postea exprime, & expressum oleum infunde recentibus speciebus: & hoc etiam tertio facito.

Folia vera Myrti accipi debent, quæ ex Italia & Narbonensi Gallia afferuntur.

SISYMBRIUM, id est, *Mentha aquatica*. Est & aliud *Sisymbrium* in montibus nascens, multò odoratius: quod melius esset, si ubique haberi posset.

OMPHACINUM, id est, ex immaturis olivis expressum.

LASSITUDINI utile est; & morbis cerebri & nervorum prodest: ob id in balneo

balneo inunctum, paralyſim iuuat, & ſpaſmum cynicum, vulgò torturam oris, naribus iniectum: & auribus immiſſum, à flatu tinnitum diſſipat: menſes ciet: ac morſui ſcorpionis prodeſt.

Oleum Vitellorum ouorum.

℞. Oua recentia numero centum; coquito donec penitus indurentur. poſteà vitellos eorum exime, & comminutos * aſſa in ſartagine, mouendo donec ruſeſcant, & pinguedinem quandam remittant: deinde offam feruentem iniice in ſacculam pilis contextum, & exprime: quodque expreſſum fuerit oleum, reponere.

EXPERIENTIA plurima probatum eſt, cutim expurgare: impetiginem, ſerpiginem, & alia cutis vitia perſanare: capillos regnere: & vlcera maligna & fiſtuuloſa curare.

Oleum Hyperici, Iacobi de Manliis. *

℞. Summitatum Hyperici iam iam maturiſcentis ʒ iiij.

Macerentur in vino odorifero diebus iiij.

Bulliant deinde in vaſe duplici, obthurato orificio vaſis. Poſteà exprime; & recentis Hyperici par pondus iniice; & ite-

N 3 rum

rum macera, & coque, & exprime. Tum etiam tertio recens Hypericum adde: & si vinum minuitur, adde aliquid. Postea
 * R. Terebinthinæ claræ ℥ iiij.

Olei veteris clari ℥ vj. Croci ʒ j.

Coquantur in duplici vase vsque ad consumptionem vini: postea exprime, & à sedimento purgatum oleum repone.

CALIDUM est & siccum, stypticum: ob id cōsolidat vulnera incisorum nervorum, & combustionem ignis: sedat dolores femoris & vesicæ: & prouocat urinam.

Oleum Irinum.

R. Olei ℥ vj. Vini P j.

Lauetur oleum ter in aqua calida: deinde effusa aqua, adde vinum; & insperge Macis ℥ iiij.

Cardamomi Zedoariæ ana ℥ ij.

Macerentur in loco aliquo calido, obstructo vasis orificio per dies octo: postea in duplici vase coquito, vsque ad consumptionem vini dimidii. Postea exprime oleum; & insperge ei puluerem subtilem

Iridis Illyricæ ℥ ij.

Macera, vt priùs, diebus octo: deinde exprime oleum, & recentis Iridis contusæ par pondus iniicito: tunc rursus ad solem aut loco calido diebus viij macerato, &

to, & rursum exprime. Postremò etiam
 tertio exprime, & aliam Iridem adde, &
 similiter omnia perage: deinde in dupli-
 civase oleum vnà cum vltimò insperfa Iri-
 de aliquamdiu coquito. Ad vltimum dein-
 de exprime, & reponne oleum: cumque vi-
 deris subsidere ad fundum vasis Iridis
 puluerem, leuiter cola.

*Cum ita permutatur crebrò Iris, oleo singu-
 lis vicibus aliquid decedit: idè boni ponderis
 ꝑ vj. olei accipiuntur.*

ATTENUAT, resoluit, maturat, & di-
 gerit malos humores phlegmaticos pe-
 ctoris & pulmonis: faciliat sputum &
 anhelitum: sedat tussim & frigidos dolo-
 res hepatis, splenis, & maximè matricis:
 resoluit dura apostemata, & mollit duri-
 ties: & confert spasma, doloribus iun-
 cturarum, & foetori narium.

*Oleum Irium, D. Nicolai
 Alexandrini.*

A

℞. Olei sextarios x.
 Aquæ sextarios iiij.
 Radicum Iridis ꝑ iiij. ʒ iiij.
 Crini domestici radicis ʒ xv.
 Cyperi viridis radicem ʒ vj.
 Helenii ʒ iiij. Anchusæ ʒ ij.
 Cinnami Assæ Spicæ ana ʒ j.
 Contundantur radices & aliæ species;
 N 4 & ma-

& macerentur in oleo & aqua diebus quinque ad solem vel loco calido, obstru-
cto vasis orificio : postea supra lentas pru-
nas in duplici vase coquito, donec aqua
consumpta fuerit ; deinde refrigerari si-
nito. Vltimò exprimito ; & cùm aliquid
subsederit, sensim excolato oleum.

*Nicolai Alexandrini Latinum & impressum
exemplar ita tradit huius olei confectionem.*

SEXTARIUS Romanus, mensura est
que habet olei uncias ponderales xvj. $\frac{3}{4}$ v. $\frac{3}{4}$ j.

CRINON domesticum, id est, Liliū odo-
ratum album, quod in hortu plantatur.

Non ubiq; habentur radices Cyperi virides:
idè aridas sume, & vino asperge tritas.

HELENII, id est, Enula Campana, vi-
delicet radicem eius.

ANCHYSA, est Buglossa silvestris, ru-
bra radice, quam aliqui hodie non rectè Alcan-
nam vocant. Tinguuntur ea radice unguenta,
& cera.

B CINNAMVM, idem est quod Cinnamo-
mum.

C ASSÆ] Ego hîc non dulcem Assam, sed
fœtidam ponerem : licet tamen utriusque $\frac{3}{4}$ β .
accipere.

P. C. SCHOL.

A Oleum Irinum Nicol. Alex.] Cùm My-
repsi descriptio ab hac Nicolai diversa sit, te-
merè Euchsîus hanc erroneam dicit.

Cin-

Cinnamum.] *Cinnamomum* imò *legendum*: B
aliquantulum nempe differunt, ut alibi dixi-
mus.

Alſæ.] Num buius loco *Casia*, cum *Fuchſio*, C
legendum sit, videndum Interea fallitur Cor-
dus, Azam hic fœtidam intelligendam pu-
tans.

V S V R P A T V R ad djuturnum catar-
 rhum, naribus illitum. Ozænas & putre-
 dines narium aufert: tinnitum aurium,
 cum aceto & ruta & amygdalis amaris
 commistum, & auribus iniectum, tollit:
 asthmaticis, gargarismo adhibito, opi-
 tulatur: hæmorrhoidas veteres inunetum,
 siue colo iniectum, educit.

Oleum Moschelinum, D. Nicolai.

℞. Olei puri P viij.

Aquæ F iij.

A

Folii [*aut succedanei eius*]

Spicæ Nardi Indicæ

Costi [*odorati & veri*]

Mastiches ana ℥ iij.

Styracis calamitę Croci

Myrrhæ Troglodyticæ

Xylocinnamomi [*in eius penuria corticis Cin-* B
namomi]

Casia lignæ veræ ana ℥ j. β.

Carpobalsami [*aut succedanei eius*]

Garyophyllorum Bdellii ana ℥ j.

N 5

Mo.

C Moschi ʒ vj.

Nuces Indicas num. iiij.

Confice sic : Folium , aut eius succedaneum , Myrrham , Cassiam , Carpobalsamum , & Bdellium tere , & per biduum in aqua & oleo macera : postea coque supralentum ignem in duplici vase, usque ad consumptionem aquæ : deinde reliqua omnia intenuissimum pulverem redacta insperge , excolato & expresso oleo ; & iterum macera , & coque parumper : ultimò deinde Moschum admisce ; & repone, & pátete vt aromata subsidant. Ea interdum oleo commisce , agitato vase.

Ex Nicolao Alexandrino dasumptum est hoc oleum : apud quem non puri, sed Panici olei legitur , id est , in Aphrica nati, quod omnium optimum & dulcissimum existit.

Pro Folio sume radicularum Spica Romana, Macis ana ʒ j. ʒ.

Pro Xylocinnamomo sume Cinnamomum electum.

D *Nux Indica hic non significat grandem illam nucem qua ubique Indica nux vocatur, sed nucem Moschatam. Nam veteres Græci eam appellarent Caryon sine Carydion Indicon, id est, Nucem sine Nuculam Indicam: vocatur etiam Caryon Myrepicon, id est, Nux unguentaria sine odorata : & Moschocaryon, hoc est, Moschata nux. Quod diligenter in hoc oleo notandum est.*

P. C. SCHOL.

Aquæ] Fuchsius vinum aquæ loco sumen. Adum sâtis aptè dicit.

Xylocinnamomi] Nicolai Alexandrini B exemplar Xylocinnami legit.

Moschi 3 vj.] Nimia certè quantitate: C quare forsàn 3 iij. legenda erunt, ut pro duobus ij. inferiùs in unum contractis, u scriptores olim cecutientes legerint.

Nux Indica.] Noces Indicas hodie passim D vocatas Fuchsius hoc loco intelligendas, non Noces Moschatas vulgò appellatas, contendit: eo quòd hæc veteribus Græcis cognitæ non fuisse constet. Verùm id ipsum & de Garyophyllis ac Moscho, hanc compositionem quoque ingredientibus, dici possit: quod non perpendit Fuchsius. Posterioris etenim seculi compositionem hanc esse, quod omniâ hic commemorata cognovit, est indubitatum.

Ε s τ optimum ad omnem frigiditatem corporis, potissimùm ventriculi, & ad dolorem lateris, foris inunctum. Stranguriosis & colicis, & ad omne nervorum vitium illitum optimè facit. Miscetur epithematibus & emplastris quæ ad stomachi & renum affectiones adisciscuntur.

Oleum Rutæ.

R. Rutæ recentis incisæ & concusæ quan-

N 6

tum

tum libuerit, pone in vase vitreo; & affunde olei veteris clarissimi sufficientem mensuram; & macera ad solem, aut in loco calido aliquo, diebus quindecim: deinde in duplici vase coquito, & abiecta Ruta recentem iniicito, & iterum quindecim diebus macerato: postea simili modo coquito & exprimito, & tertio recentem Rutam iniice; macera quoque & cola.

Ita debet preparari oleum hoc & aliquot sequentia.

E S T calidum, apertium, resolutivum, & mitigativum dolorum: calefacit renes, vesicam, matricem; & sedat dolores eorum, & maximè colicam, si venter vngatur, & fiat ex eo solo clyster: præterea opitulatur nervis, confert spasmo, & expellit frigidos humores.

Oleum Anethinum.

Oleum Anethinum fit ex floribus & foliis Anethi, & oleo veteri claro, eodem modo quo Rutaceum Oleum.

S E D A T dolores, aperit poros, & resolvit vapores & apostemata, tumores & durities: & mitigat dolores & rigores febrium: prouocat somnum & sudorem.

Oleum

Oleum Chamæmelinum.

Oleum Chamæmelinum siue Chamomillæ, vt vocant, fit ex floribus Chamæmeli, id est, Chamomillæ, & oleo veteri claro, vt Rutaceum oleum.

VALET ad plura: aperit poros, resoluit vapores, sistit fluentes humores, corrigit malas qualitates, confert nervis & membris nervosis; & apprimè mitigat dolores.

Oleum Lilinum.

Oleum Lilinum, siue Liliorum, fit ex Liliis albis odoratis recentibus, & oleo veteri claro, vt oleum Rutaceum.

SEDAT frigidos dolores pectoris, renum, vesicæ, matricis, & colicam: est enim calidum, resolutivum: mitigat tussim, & efficaciter resoluit, & citiùs maturat apostemata.

Oleum Narcissinum.

Oleum Narcissinum fit primo Vere ex recentibus floribus albi Narcissi, qui vocatur Germanicè Mertzenblum, Weysshornungsblü, weyssaprillenblum, Weyss Iosepsstebe. Fit vt Rutaceum.

V A L E T ad emolliendas vuluæ duritias, præclusionesque.

Oleum Ligustrinum, D. Mesuæ.

Oleum Ligustrinum, quod Græci vocant Cyprinum, Arabes autem oleum de Alcanna, fit ex floribus recentibus Ligustri, florente vite, aut paulo pòst, & oleo veteri clarissimo, ad modum Rutacei olei.

Ligustrum est arbuscula salicis ferè folio floribus parvis candidis, veluti spumosis & mucosis: Germanicè vocatur Reynwayden & Muntboltz. Nasquitur copiosè ad Rhenum, & in Misnia, Hessia, Suevia, Wittenbergensi agro, Thuringia, & circa Nurembergam, non longè à Kalckreut.

P A R T E S nervosas roborat, & capillos à canitie vindicat.

Oleum Sambucinum,

Oleum Sambucinum fit ex floribus Sambuci, & oleo veteri clarissimo, quemadmodum etiam oleum Rutaceum.

L E N I T, abstergit, & mundificat cutim: medetur icteritiæ, & maximè hepati infirmo, oppilato: & plurimùm confert doloribus iuncturarum.

Oleum Iasminum.

Oleum Iasminum, quod Arabes vocant Iasc.

Iaseminum, & oleum de Zambach, fit ex floribus Iasminis, siue Iaseminis, siue Zambachi, & oleo veteri claro, vt oleum Rutaceum.

Est Iasme flos similis Violis aut Cheyri, admodum odoratus: nascitur in frutice, qui multis viticulis ascendit pergulas & concamerationes, vt vitis Colitur in Italia & Gallia.

O P I T V L A T V R corporibus quæ calefactionem laxationemque desiderant.

Oleum Cheyrinum.

Oleum Cheyrinum fit ex Leucoiis luteis, hoc est, ex Cheyris citrinis, & oleo veteri claro, vt Rutaceum oleum.

Cheyri Germanicè dicuntur Gelbe-Violem.

D O L O R E S neruorum aliarumque partium corporis mitigat; eaque quæ in thorace, renibus & vesica sunt, discutit.

Oleum Myrtillorum.

Oleum Myrtillorum fit ex Myrtillis, hoc est, baccis vetæ Myrti, & oleo omphacino, hoc est, immaturo, eodem modo quo Rutaceum.

Myrtus vera apud nos non nascitur: neque habemus semper virides Myrtillos, sed aridos: vt plurimum enim ex Hispania & Italia offeruntur: idèò necesse est vt vino odorato aspergantur.

R E-

REFRIGERAT & adstringit: ideoq. cœliacis affectibus subuenit : sanat igne ambusta: pustulas erumpentes illitu emēdat : attritus hyeme concitatos, & intertrigines illitum corrigit. Sedis rimas, condylomata, luxatos artus persanat, & sudores coërcet.

Oleum Myrtinum.

Oleum Myrtinum fit ex foliis veræ Myrti, & oleo Omphacino, id est, immaturo : quemadmodum oleum Myrtillorum.

Quoniam verò Myrti vera recentia folia apud nos haberi nequeunt, idè sume folia Myrti vera quæ ex Italia & Narbonensi Gallia & Candia afferuntur denuò, & asperge ea confusa vino veteri odorato, ut dictum est proximè in oleo Myrtillorum.

CEREBRUM, nervos, cor & ventriculum roborat.

Oleum Menthæ.

Oleum Menthæ fit ex Mentha crispa fatiua, & oleo omphacino, id est, immaturo, eodem modo quo Myrtinum aut Rutaceum oleum.

VENTRICULUM refrigeratum & imbecillum calefacit: firmat nauseam, vomitum-

mitumque reprimat : appetentiam excitat , coctionemque iuvat.

Oleum Absinthii.

Oleum Absinthii fit ex Absinthio Pontico , & oleo omphacino claro , quemadmodum oleum Rutaceum.

Absinthium Ponticum nos non habemus, quod videlicet non adeo calidum est , sed suavioris odoris , & valde adstringens. Nostrium vero Absinthium sine rusticum Absinthium calidius est ; & nihil ferè adstringit, ut etiam Galenus scribit : ideo corrigendum est cum Rosis , quæ dimidium eius pondus aquant.

CALEFACIT , ac roborat ea quæ sunt refrigerata, potissimum verò ventriculus : excitat appetentiam , obstructions aufert , lumbricosque enecat.

Oleum Rosaceum.

Oleum Rosaceum siue Rosarum , fit ex Rosarum rubearum nondum penitus apertarum decerptis foliis , & oleo Omphacino , id est , immaturo , eodem modo quo Rutaceum oleum.

REFRIGERAT & astringit: inflammationibus præsidio est , æstuantem ventriculum restinguit ; erosiones intestinorum clysteribus inditum , & dolores dentium, si eo colluantur, sanat.

Oleum

Oleum Violaceum.

Oleum Violaceum siue Violarum, fit ex floribus Violarum [Martiarum,] & oleo Omphacino, id est, immaturo, quemadmodum Rutaceum & Rosaceum.

REFRIGERAT, incandescentibus inflammationum feruoribus vtile est.

Oleum Nenupharis albi.

Hoc oleum fit ex recentibus floribus Nenupharis, quæ albos flores producit; & oleo Omphacino, quemadmodum Violaceum.

NYMPHÆATVM oleum vires habet Violari: refrigerat tamen magis quàm Violatum, & minùs quàm Papauerinum: hypnoticis, & intemperaturam partium, vt renum, calidam sanantibus vtiliter miscetur; & Veneris tentiginem prohibet, genitali inunctum: somnum etiam conciliat.

Oleum Nenupharis Citrini.

Hoc oleum fit ex luteis, siue Citrinis Nymphææ, hoc est, Nenupharis floribus, & oleo Omphacino, vt Violaceum oleum.

Oleum

Oleum Populinum.

Populinum oleum fit primo Vere ex oculis Populi arboris contusis, & oleo veteri clato, loto in aqua calida aliquoties, eodem modo quo Rutaceum aut Anethinum oleum.

Oleum Populinum, D. Nicolai Alexandrini.

℞. Olci ℥ lxxvj. (faciunt ℞ vij. ℥ ij.)
Vini ℞ iiij.

Gemmarum Populi arboris recentium,
Veris initio collectarum ℞ iiij.

Gemmæ Populi diutissimè terantur, & macerentur in vino & oleo diebus septem, & quotidie sæpè agitentur. Octava deinde die supra lentas prunas in duplici vase coquito, usque ad consumptionem vini: deinde exprimatur oleum: & reponatur.

Porro hoc oleum efficacius erit, si secundò & tertio recentes Populi gemmæ addantur.

Gemma Populi, id est, oculi Populi.

EXPEDIT ad capitis dolorem, arthriticis, nephriticis, & podagricis, & ubicumque dolor sit,

Oleum

Oleum Amygdalorum dulcium.

Rx. Amygdala dulcia sicca, non tamen rancida: contundantur minutissimè: postea in sartagine aliquantulum torrefacias, affuso aquæ Rosaceæ modico: postea prælo exprime.

LENIT asperitates pectoris, gutturis & pulmonis, duritiem & siccitatem iuncturarum: est suaue in cibis; & confert hecticis & phthisicis: impinguat, auget sperma: sedat tussim & ardorem urinæ, vesicæ & vuluæ excoxiatæ, cum fistula injectum.

Oleum Amygdalorum amarorum.

Fit hoc Oleum eodem modo quo ex dulcibus Amygdalis.

APERIT oppilationes, & discutit ventositates & vapores: sed potissimum medetur surditati, sibilo & dolori aurium: lenit duritiem neruorum, & delet maculas faciei.

Oleum Balaninum.

Oleum Balaninum fit ex Balano Myrsifica, id est, Glande vnguentaria, quam Arabes vocant Granum Ben. Fit autem ex
tuso

tuso affatoque , affusa Rosacea aqua , fructu isto.

Fructus hic ipse Auellana magnitudinem habet , colorem candicantem , & figuram ut plurimum triangularem. Cortice tenui claudis pinguem quendam nucleum , fungosa & alba tunica inuolutum. Affertur ex Syria & Arabia.

O L E V M Balaninum repurgat maculas , varos , lentigines , cicatricum nigritias , fucos : aluum soluit ; sed ventriculo aduersatur : dolores aurium emendat. Item si sonant aures , vel strepitum , aut sibilum edunt , cum adipe infusum auxiliatur. *

Oleum de Cherua.

Oleum hoc fit ex pingui quodam semine, quod Arabes Cherua, Græci Crotona, Latini Ricinum vocant. Fit autem eodem modo quo oleum Amygdalorum.

Planta quæ semen hoc prædabit , vocatur à recentioribus Cataputia maior , ab Italis Palma Christi , & Mira solis ; à Germanis Wunderbaum , Zeckensame , & Heydnisch Sprinkerner.

PRODEST pforis , vlceribus capitis erumpentibus , sedis inflammationibus , vuluis quæ occlusæ conuersæque strangulant , cicatricibus fœdis , aurium doloribus:

bus : potu aluum ciet , si quis aquis grauat-
tur : lumbricos eiicit.

Oleum Papaueris.

E semine vtriusque Papaueris tam albi
quàm nigri exprimitur oleum , eodem
modo quo ex Amygdalis, Balano Myre-
pfica, & Cherua.

IMPINGVAT, asperam arteriam le-
nit ; febrium ardorem mitigat , & inso-
mniarum.

Oleum Hyoscyami.

Hoc oleum exprimitur ex Hyoscyami
semine, eodem modo quo ex Papauere.

Oleum Spicae.

Oleum Spicae fit per destillationem, ex
maiori Lauendula, quae Spica vocatur.

Hoc oleum apud nos maioribus sumptibus fit,
quàm in Gallia Narbonensi : ideo potius emen-
dum est à mercatoribus , qui illud è Gallia af-
ferunt.

CALEFACIT, ac discutit.

Oleum Laurinum.

Oleum Laurinum apud nos non facile
fieri potest : quoniam verò in magna co-
pia

pis affertur ex Italia & aliunde, ideò facile emitur à Materialistis.

CALIDUM est & apertivum : mitigat colicam & frigidos dolores ventris , stomachi , capitis , hepatis , splenis , renum , matricis , nervorum , iuncturarum : denique omnibus ægritudinibus frigidis confert.

Oleum Sesaminum.

O L E U M Sesaminum exprimitur è Sesami semine, eodem modo quo de sem. Papaveris.

Sesamum verum affertur ex Alexandria Ægypti Venetias ; nunc ex Italia & Hispania : unde ematur sincerum ; nam adulteratur oleo Nucum & Papaneris ; sed odore & sapore facile deprehenditur à peritis dolus.

O L E U M Sesaminum impinguat, auget sperma, lenit guttur & omnem asperitatem & duritiem : & clarificat vocem.

Petroleum Flavum.

PETROLEUM clarum, quoddam est album, quoddam verò aurei coloris. Defluit autem ex petris in Italia & plerisque aliis locis, unde ad nos affertur.

CALEFACIT, siccatur : essentiæ tenuitate in altum penetrat, digerit: proinde
mate-

materiam omnem excrementosam consumit : ob id epilepsiæ , paralyfi , vertigini , obliuioni , & lienis , renum , vesicæ , vteri , neruorum , articulorum omnium , & reliquarum partium neruosarum doloribus frigidis maiorem in modum confert.

Petroleum nigrum.

Petroleum nigrum, siue Naphtha nigra, crassius est quàm flauum. Gignitur autem in agro Borchdorpiano & Brunsvicensi in Saxonia.

PETROLEVM, *id est*, *Naphtha.*

OPOBALSAMVM SVCCEDANEVM
PRETIOSVM EVRICII CORDI,
*qui Valerii pater fuit, huic libro ex
Valerii Cordi scriptis nuper
additum.*

℞. Iridis Illyricæ
Zarnabi longi [*id est*, *Zedoaria*]
Zarnabi rotundi [*id est*, *Zurumbeth*]
Cubebarum Cardamomi maioris
Cardamomi minoris Agallochi
Olei Benzoi ana 3 iiij.
Garyophyllorum
Nucis moschatæ Macis
Arceuthidum [*id est*, *gran. Iuniperi*]
Casię Cinnamomi Santali citrini
Ben-

Benzoi ana \mathfrak{z} ij.
 Croci Afari
 Maioranę Schœnanthi
 Nardi Celticę rad. Rosarum rubearum
 Cyperi longi &
 rotundi ana \mathfrak{z} j.
 Camphorę \mathfrak{z} ij. Moschi \mathfrak{z} j.

Hęc omnia trita macerentur in vino
 Rhenano ter sublimato, diebus octo. Po-
 stea diligentissimę distillantur in balneo.
 Distillatę deinde aquę quę primò exue-
 rit, cape \mathfrak{z} vj. in quibus dissolue optimę,
 candidissimę, electęquę Myrrhę \mathfrak{z} ij.
 sic tenuissima & pręstantissima pars Myr-
 rhę, aquę vitę miscetur: crassior verò
 instar fecis subsidet, quę nequaquam est
 separanda aut excolanda: quoniam in fun-
 do dimissa ipsum Opobalsamum aliquot
 annis conseruabit incorruptum.

V N G V E N T A.

Vnguentum Agrippę Regis,
D. Nicolai.

& Radicum Bryonię P ij.
 Radicum Cucumeris asinini P j.
 Scillę P β . Ireos \mathfrak{z} iij.
 Radicum Filicis Radicum Ebuli
 Tribulorum aquaticorum ana \mathfrak{z} ij.
 O Cerę

Ceræ albissimæ ℥ xv.

Olei albissimi ℥ iiij.

Radices omnes istæ recentes incisæ & contusæ macerentur in oleo per dies octo: deinde coquantur, postea exprimantur: & in colato oleo & expressio resoluatur cera, & fiat vnguentum secundum artem.

Apud Nicolaum Alexandrinum inuenitur idem vnguentum: sed impressi codices non habent radices Filicis & Etule, & Tribulos.

Oportet omnes istas radices & tribulos esse recentes. quòd si necessitas urgeat, & non sint ad manus recentes; tunc sume siccatas, & asfunde vini optimi ℥ iij.

A TRIBULI aquatici siue marini, sunt *Wassernusse*: & ipsi fructus accipi debent.

P. C. SCHOL.

A Tribuli aquatici.] *Desgenius* verò contrà, non fructus, sed radices hic intelligendas esse putat.

HYDROPICS, omnibusque corporis œdematis succurrit. Nervorum mala sanat, viinas mouet: extrinsecus illitum ventrem subducit; dolorique renum utile.

*Vnguentum Apostolorum,
D. Auicenna.*

℞. Terebinthinæ

Ceræ albæ

Resinæ

Ham-

Hammoniaci ana ʒ xiiij.
 Aristolochiæ longæ Turis masculi
 Bdellii ana ʒ vj.
 Myrrhæ Galbani ana ʒ iiij.
 Opopanacis Floris æris ana ʒ ij.
 Lithargyrii ʒ ix.
 Olei, si fuerit æstes ℥ ij.
 In hieme autem ℥ iiij.

Aceti quantum satis est ad Hammoniacum, Galbanum, & Opopanacum dissoluenda.

Confice secundum artem.

FLO S *Æris* propriè significat grana quædam parua, quæ è partibus æris prosiliunt, cum refrigerantur assusa aqua panes enci: hoc tamen loco solet poni viride æris.

E s r efficax contra vulnera & vlcera difficilia, & fistulas: consumit carnem mortuam, & consumptam restaurat, duram mollit: & plagas sanat.

Vnguentum Aregon, D. Nicolai.

℞. Rosmarini Maioranæ
 Radicis Iari Serpylli Rutæ
 Rad. Cucumeris asinini ana ʒ iiij. β.
 Foliorum Lauri Saluæ
 Sabinæ ana ʒ iiij.
 Pulicariæ maioris
 Pulicariæ minoris ana ʒ iiij.
 Radicum Bryoniæ ʒ iiij.
 O 4 Lau-

- * Laurcolæ ℥ iiij. β.
- * Nepetæ ℥ iiij.
- * Mastiches
- * Olibani ana ℥ j. β.
- * Pyrethri
- * Euphorbii ana ℥ j.
- Zingiberis
- * Piperis ana ℥ iiij. β.
- Adipis vrsini
- * Olei Laurini ana ℥ iiij.
- Olei moschellini ℥ β.
- Petrolei clari ℥ j.
- Butyri ℥ iiij.
- Olei communis ℥ v.

Herbæ & radices Maio mense collectæ, in oleo macerentur diebus septem: deinde coquantur; additis, circa cocturæ medium, siccis reliquis: tum colentur. Colato oleo adde reliqua, & Ceræ ℥ j. ℥ iiij.

OLEUM debet esse purum & vetus. Porro auctores non ponunt certam mensuram olei: quidam iubent accipi ℥ v. vel quantum sufficit. Sed tantum herbarum & radicum pondus & quantitas, non potest bullire in ℥ v. olei: idè accipe olei ℥ medicinales sex, & affunde aqua etiam aliquot libras; & coque ad consumptionem aqua, & cola.

IARUS est vera Serpentaria: pro qua ponitur Aron recenter effossum.

PUBLICARIA, id est, Conyza, Germanicè

nicè vocatur Duruvurtz, & est similis Enule Campanæ in foliis, caulibus & floribus; sed multo minor. Nascitur humidis locis, & exiccatis aquis, circa flagna.

LAVREOLA, est planta similis Thymelææ, id est, plantæ in qua nascitur Coccum Gnidium. Eius loco sumer radices vel folia Cocci Gnidii.

O L E V M Moschellinum suo loco descriptum est.

P. C. SCHOL.

Et affunde aquæ.] *Cecutit Cordus in aqua A vnguentum coquens, cum in vino coquendum esse ratio dicitur.*

Caterùm cum vnguentum istud in ponderibus mirè corruptum undique legatur, nos id ipsum, quantum nunc licuit, restituimus.

PRODEST malis corporis frigidis, convulsionibus, resolutionibus partium. Item dolori colico, renum, articulorumque.

Vnguentum Martiatum,
D. Nicolai.

A

R. Cerae albæ ℥ ij.

Olei ℥ viij. [*aut quantum sufficit.*]

Rorismarini

Foliorum Lauri ana ℥ viij.

Rutæ ℥ vi. [*al. ℥ iij.*]

Tamarisci [*foliorum scilicet*] ℥ vj.

O 3

Maio-

Maioranæ Sabinæ
 Balsamitæ Saluia
 Ocymi Polii [*videlicet veri*]
 Calaminthæ Artemisiæ Enolæ
 Betonice Brancæ vrsinæ Spargulæ
 Herbæ venti Pimpinellæ Agrimonæ
 Absinthii Herbæ paralyſis
 Herbæ sanctæ Mariæ
 Cimarum Sambuci
 Herbæ Crassulæ Millefolii
 Semperuiæ Chamædryos Centauræ
 Centumneruæ Fragulæ Tetrahit
 Quinquefolii ana \mathfrak{z} iiij. β .
 Radicum Hibisci [*id est, Altheæ*]
 Cymini Myrthæ ana \mathfrak{z} iiij.
 Fœnugræci \mathfrak{z} j. β .
 Butyri \mathfrak{z} j. \mathfrak{z} ij.
 Vrticæ Violarum
 Papaueris nigri
 Menthæ Saracenicæ Menthæ crispæ
 Lapathioli Polytrichi Carduncelli
 Matris filuæ Maturellæ
 Herbæ moschata
 Alleluija Linguæ ceruinæ Crispulæ
 Camphoratæ Styracis calamitæ
 Medullæ ceruinæ ana \mathfrak{z} β .
 Adipis vrsini Adipis gallinacei
 Mastiches Turis ana \mathfrak{z} j.
 Olei Nardini \mathfrak{z} ij.

Herbæ omnes in Maio mense colligan-
 tur, & incisæ macerentur in vino odorife-
 ro per

ro per dies septem : oëtauo deinde die coquantur , donec ferè consumatur vinum : postea cola : & colaturę expressę adde oleum , & coque denuò donec consumatur vinum : mox adde ceram & reliqua secundum artem.

In hoc unguento multa sunt herbarum nomina , quę apud probatos Auctores nusquam inveniuntur : idcirco aliquis non facillè ea interpretabitur.

N I C O L A V S Præpositus loco Maiorana habet Esbrium , alii autem habent utrumque. Sed non constat quid sit Esbrium : alii enim dicunt Maioranam esse , alii Saluiam : sed utrumque ingreditur hoc unguentum , tam Maiorana quàm Salvia.

B A L S A M I T A , id est , Mentha aquatica.

B R A N C A ursina vera , quę Romana cognominatur , accipi debet , quę habet radices longas , multas , glutinosas , sapore Tragacanthę. Et alio nomine vocatur Acanthus : quę verò Germanicè vocatur Bernclavv , & habet Anethi umbellam , & semina odore & sapore cnicum , nihil minus est quàm Branca ursina ; nam semper illam Romanam Brancam ursinam intelligunt auctores omnes. Est autem urbana & hortensis herba Branca ursina vera.

S P A R G V L A , id est , Gallion : Germanicè vocatur Rarriçen & Sprengelblum. Her- B

ba est denso, numerofo, cōferto & odorato flore.

C PIMPINELLA, quàm Auct̃or intelligit, est Sanguisorba, quæ Germanicè Bluißdroslein vocatur.

HERBA Paralyfis, id est, Himelschuffel.

D HERBA Sanctæ Mariæ, secundum interpretationem omnium, est Persicaria.

HERBA Crassula pinguis habet folia: nascitur in muris & in tectis: Germanicè vocatur Fettchenne, sive Donnerkraut.

CENTVMNERVIA, i. Plantago maior.

TETRAHIT, id est, herba Iudaica, quàm dicunt esse Orobum.

LUMINARIS maioris auct̃or Ioannes Iacobus Manlius, pro Cymino & Myrtha habet Cimmarum Myrti. Sed nescio quàm bene: non tamen improbo. Porro Nicolai Alexandrini impressum exemplar habet Cymini & Myrtha: sed Nicolaus Præpositus pro Myrtha habet Myrrham; sed malè.

LAPATHIOLVM, id est, Acetosa.

POLYTRICHON, herba est ex speciebus Capilli Veneris.

MENTHA Saracenica, Germanicè vocatur Unser Frauen Minze. Herba habet folia oblonga, Lapathio minora, & in summis caulibus aureos flores in corymbis dispositos, ferè ut Tanacetum: tota odoratissima est.

CARDUNCELLVS, id est, herba Turcha: quàm nos in Germania vocamus Carduum benedictum.

MA-

MATRIS SILVA, id est *Periclymenum*: Germanicè vocatur *Spiklilien*: ascendit arbores ut *Vitis*: flores habet longos, reflexos, & odore *Lilii*. *Nurembergæ* in hortis colunt, cum alibi proveniat spontè in silvis.

MATVRELLA, id est, *Phu*; id est, *Valeriana maior*. Impressi codices *Nicolai Alexandrini* non habent *Maturellam*, sed *Marathrum*, id est, *Foeniculum*: sed malè.

ALLELVIA, id est, *Trifolium acetosum*: Germanicè *Buchampfer* vocatur.

CRISPULA quæ sit herba, non constat recentioribus: alii enim *Buphthalmum*, alii *Herbam Cancris* sic vocant, nec indicant figuram herbe *Cancris*: ego autem ponerem eius loco *Buphthalmum*, id est, *Cotulam maiorem*, non foetidam.

HERBA MOSCHATA duas habet species: una habet veluti acus longas, & est *Rostrum Ciconis*; altera est parva, & non habet acus, sed est herba admodum parva: folia habet similia *Cōcanæ* radici, id est, *Holvvurtz*: odorem habet in Maio mense *Musci*. Nasquitur umbrosis locis iuxta *Concanam* radicem, id est *Holvvurtz*. In Maio tantum reperitur. Germanicè vocatur *Bisemkraut*.

CAMPHORATA est *Abrotonum*, quia odore accedit ad *Camphoram*: quidam dicunt esse *Abrotonum silvestre* siue album; sed perinde est: efficacius tamen est vulgare *Abrotonum*.

Nicolaus Alexandrinus paulò aliter describit hoc unguentum, ut codices impressi ostendunt. ideoq; & eius modum subiungemus: nam variatur ponderum ordo & quantitas.

A D V E N S V S frigida corporis mala, resolutionem coxendicum, nephritim, convulsionem, & id genus alia valet: tumores reprimat, durities emollit, liuoremque cutis emendat.

*Unguentum Martiatum magnum,
D. Nicolai Alexandrini.*

℞. Cerae albæ ℥ ix. Olei sextarios vj.

Fet. verò Cond. Cera ℥ xvj. Olei sextar. lxvj.

Rosmarini Foliorum Lauri ana ℥ ij. β.

* Amaraci ℥ ij.

Esbrii Sabinæ

Balsamitæ Ocymī

Elelisphaci [id est, Salvia]

Polii [scilicet veri]

Calaminthes Artemisæ Enulæ

Betonicæ Brancæ ursinæ

Herbæ venti

Pimpinellæ Argemoniæ Absinthii

Herbæ paralytis

Herbæ Sanctæ Mariæ

Cimarum Sambuci Herbæ Crassulæ

Semperuiæ Millefolii

Chamædryos Centaureæ

Centumneriæ Fragulæ

Quia-

Quinquefolii
 Herbe Tetrahit ana ℥ j. β.
 Radicis Euifci [seu Ibfci] Cymini
 Myrthæ ana ℥ j. F
 Fœnugræci ℥ β. Butyri ℥ v.
 Vrticæ Violarum

Papaveris rubri
 Menthe alterius [id est, Mēthe criſſa ſativa]
 Lapathioli Polynichi Carduncelli
 Matris filuæ Marathri
 Herbe mofchatæ
 Alleluia Lingue ceruinæ Crispulæ
 Camphoratæ Styracis
 Medullæ ceruinę
 Adipis vrfini
 Adipis gallinacci ana ℥ iij.
 Turis ℥ ij. Olei Nardini ℥ j.

Confice hoc modo : Herbas omnes at-
 que radices in fine Maii menſis, vel circa
 Solſtitium æſtium collectas, minutim in-
 ciſas in vini ſufficienti quantitate mace-
 rato per dies ſeptem : octaua deinde die
 coquantur lento igne , donec propemo-
 dum vinum ſit conſumptum : poſtea cola
 & exprime , & affunde colaturę expreſſę
 olei prædictos ſextarios, & iterum coque,
 donec omnis aqueus herbarum ſuccus cum
 vino in vaporem reſolutus fuerit : deinde
 adde Ceram in partes conſractam ; & pau-
 lo poſt Adipes , Butyrum atque oleum
 Nardinum ; ad vltimum verò Styracem, *

O 6 atque

atque Tus in minutissimum puluerem trita : melius tamen esset , optimam & electam Styracem , & puram instar resinæ alicuius , vnâ cum Cera indere : nam liquescit in oleo. Sed talis Styrax calamitâ rarissimè ad nos affertur. Porro miror in hoc vnguento , quòd tam parum olei tot herbarum libris addatur : prætereà etiam optimæ vires aromaticarum herbarum in coctura euanescent.

Ita se habet vnguenti huius compositio , secundum impressum Nicolai Alexandrini exemplar.

SEXTARIUS mensura est Romana , quæ capit mensurales uncias viginti olei : pondere verò habet olei uncias sedecim , drachmas quinque , scrupulum vnum. Sex autem sextarii olei , faciunt in hoc vnguento ℥ viij , ʒ iiij.

ESBRIUM quidam dicunt esse Maioranam , quidam flores Saluia : ego autem acciperem pro Esbrio Maioranæ capitula , summitates & flores.

AMARACUM ego hic non credo significare Matricariam , cum per eam vocem etiam Maioranam possimus intelligere : nam utraque Amaracus vocatur : si autem Maioranam inieceris , multò odoratius vnguentum fiet , quàm si Matricariam indideris.

HERBA venti , id est , Parietaria vera.

PIMPINELLA , hic non significat Germanicam Pimpinellam acris radice , quam Itali
vocant

vocant Saxifragiam ; sedeam quam Itali vocant Sanguisorbam, Germani Blutsstöffleyn. Radicem habet rubram, Tormentilla sapore. Nasquitur in pratis una eius species, altera in montibus ; & Itali acetariis miscent : habetq^{ue} cucumeris odorem.

QVIDAM non habent Cyminum, sed Cimas Myriha : est autem Myriha idem quod Myrtus. Alii habent Myrrham, sed malè.

PRO Papauere rubeo habent alii Papauer nigrum : est autem rubrum Papauer idem quod agreste Papauer, in agris nascent.

MARATHRUM, id est, Fœniculum. Porro ego hunc locum Nicolai Alexandrini credo esse corruptum ; & censeo pro Marathro legendum esse Maturellam, id est, Phu maius, cuius radices accipi debent.

Lingua ceruina est herba, quæ hodie improprie Scolopendria nominatur.

P. C. in utrumque vng. Martiatum Schol.

Vng. Martiatum.] Fuchsius rectè monet, non Martianum, sed Martiatum nominandum esse. A

Spargula, id est, Gallion.] Spargulam B non Gallion, ut Cordus ait, sed Apparinen esse veterum, Fuchsius ritè sentit.

Pimpinella.] Fuchsius per hanc vocem, C non Sanguisorbam Germanis vocatam, cum Cordo hic intelligendam esse vult ; sed acrem herbam, Saxifragam à multis appellatam, Germanis Pimpinella nomine cognitam ; idq^{ue} ea.

propter, quòd adstrictoria sua facultate, huic medicamento Sanguisorbam malè conuenire existimet: quasi verò nihil vnguentum hoc præterea recipiat quod adstringat atque etiam refrigeret. Itaque cum Italia multo priùs (imò forsàn in ea fabricatum) quàm Germanie vnguentum istud cognitum fuerit, Pimpinellam Italoram seu Sanguisorbam Germanorum hic intelligendam esse contendo.

D Herba Sanctę Marię.] Hanc Persicariam esse, sinistrè Cordus interpretatur, ut & Euchsius quoque inquit: sed eam esse quam Saluiam Romanam, & Mentham Grecam, seu Costum boriensem, ac Lassulatam Etrusci vocari constet, Vnsersrauven Mint? Germanis dictam, à Meniba Saracenica diuersam. Qua in re falli nihilominus Euchsium existimo, Mentham hanc Grecam cum Saracenica consiudentem, eandemque facientem, cum diuersa sint: nì Germanis aliquibus ita eam appellare placuerit, Italiae tamen secus; qui hac in re, ob eas quas superiùs dixi rationes, hic quoque consulendi atque credendi sunt.

E Mentha Sarac.] Hanc Mentham Saracenicam, vocatam quoque Mentham Romanam, in suis de Stirpium libris, imagine & scripto depingit doctiss. Rembertus Dodonæus: quæ hoc loco intelligenda erit; quicquid Euchsius ex suo corruptissimo in medium proferat.

F Myrthe.] Euchsius Myrrhe legi mauult, nescio quam bene: cum vnguentum Martiatum

parum

parum Nicol. Alexandrini, Myrti folia manifestè recipiat. Cur autem Myrtum aliaq̃ adstringentia admittat hoc unguentum, hic dicere non vacat. Tantummodo miror id à tanto viro non essi olfactum, neque perpersum.

Ceterum hocce in unguento, ut & multis aliis in medicamentis, plura longè aliter exponenda, miscenda, tractanda, atque conficienda sunt, quàm à Fuchsio & Francisco Alex. est factitatum: ita ut huius Apollo non usque adeò, veluti Thrasonicè promittit, nebulosis suis radiis Pharmacopœos vibret, neque irradiet; quin in densa adhuc caligine equè ut priùs versentur atque deambulent. Quod tamen illi condonandum foret; eo quòd adolescentem se fateatur; nisi sue illius ætatis iuuenilis iudicio vacua, & hinc temeraria rei Pharmaceutices sibi in experta, ac (ut locis mille liquet) ignorate scriptione, Apolline abusus, illiq̃ iniuria, tantum diuino plus equo contaminasset. Sed hæc, quoniam vesperscit, citis si voles, quadrigis.

A d frigiditatem & dolorem capitis, pectoris & stomachi, ad scirrhus hepatis & splenis, ac ilii dolorem; ad paralyticos, arthriticos, ischiadicos, nephriticos, & podagricos, & ad omnes dolores; ad tumores, durities, spasmos, & febrientes, ad ignem vel solem inunctum.

Vnguen-

*Vnguentum Martiatum paruum,
D. Nicolai Alexandrini.*

R. Foliorum Lauri ℥ iij.

Rutæ ℥ ij. β.

Amaraci [*id est, Maiorana*] ℥ ij.

Rosmarini ℥ j. β.

Foliorum Myrthæ ℥ j.

Esbrii [*accipe summities Maiorana pro Es-
brio*]

Balsamitæ

Ocymi ana ℥ vj.

Butyri ℥ v.

Styracis Medullæ ceruinæ

Adipis vrsini

★ Adipis Gallinacci ana ℥ iiij.

Mastiches ℥ iiij. Turis ℥ ij. β.

★ Olei Nardini ℥ j.

★ Olei oliuæ q. s.

Ceræ mundissimæ quantum sufficit.

Ego Olei acciperem ℥ vj.

Cera verò ℥ iiij.

*Pet. verò Cond. olei ℥ xxiiij. sumendas esse
dicit.*

Porrò hoc quoque vnguentum conficies
vt proximum.

MYRTHA, *id est, Myrtus. sunt autem
accipienda folia vere Myrti, qua ex Italia
afferuntur, & non eius planta quam voca-
mus Germanicè Heydelber.*

P. C. SCHOL.

Petrus verò Coud. olei , &c.] Si omnia huiusce Dispensatorii loca manca erigenda, dubiosa expendenda, erronea collapsaq; restituenta mihi essent , simulq; singulorum rationes scriptis reddere deberem , in densum volumen, præter institutum , libellus omnimodò extumesceret. Hic attamen (priusquam sese negotium subducatur ; ad calcem enim ferè perductus sum) pedem figere , aliquidq; serii propalare, tempus & locus opportunus summopere urgere videntur : ut puta, si quid salis Francisco Alex. inesset , atque vel minimum haberet rerum medicamentariorum pharmaceuticarumve peritiæ, experientiæq; (ut omnibus numeris absolutum opus se promulgasse arroganter sibi persuadet) non ita leuiter oscitanterq; aliorum errores incogitantiasq; etiam evidentissimas transcriberet, & alioquin pagellas multas tadiosa, atque inani dicacitate repleret , conspargereq;. Consultat ille, queso, vulgares tantùm uniuersalesq; componendorum miscendorumq; medicamentorum normas , tum à seipso etiam conscriptas formulas ; vel si volet , etiam minimos pharmacopolas hac in re examinet ; herbarum materialiumve libra , num olei binas ad minus requirat. Carnis libris duabus aqua libram coctura sufficere si dixeris , à coci puero nōne etiam rideberis ? Itaque cū Cordus hoc in unguento, suo ex sensu , olei hūc libras sex tantum,

tum, ad herbarum materialiumve libras plures duodecim (qua quantitate vix mutescerent) accipiendas suasisset, ut adhuc dum eni in contextu sonant verba: ego verò multas addens olei libras, ex sex viginti quatuor effeci; & necdum sufficere pro tanta materie copia scio, si oleo, ut regula & ratio docent, materie sunt contegenda. Simili insuper cecitate, ut in hoc unguento, omnes Dispensatoriorum combinatores usi sunt, in unguento Martiato magno. Vbi enim Nicolai Alex. aliorumq; exemplaria, olei sextaria sex admodum macrè legunt; ego sexaginta sex multo pinguius, necessario reposui, rationes, errorumque causas hic prateriens. Bone Deus, tot tantosque Aristarchos mirum est tanta laborare coryza, ut tantum interval- lum, nempe à sex ad sexaginta sex; à sex insu- per ad viginti quatuor, non olfecerint; adeoque evidentes res animadvertisse neminem. Hinc ut quantum in reliquis neglectum fuerit, colligere facile queas: quod asterisci, prater omnium scio expectationem, ita frequentes, locorum non omnium, sed precipuorum tantum, in hocce tam exiguo enchiridio animadversorum indica- tui demonstrare possunt. Quocirca, ut ingenuè quid sentiam tandem proferam, relique sum- mam semel explicam; tot inter hodie Dispensa- toriorum divulgatores, nullum panè digni quid Pharmacopœi cōsarcinasse protulisseque video; nihilque ferè prater aliorum ignavias trans- scripsisse, ac in suas chartas transfudisse, acta egisse;

egisse ; errata , & inaptas , erratis atque ineptius accumulasse comperio : ita ut posteriora prioribus etiam nouumquam deteriora , Pharmacopœis que inutiliora , esse conspiciantur. Eiuscemodigitur omphacini tabulismi valeant. Sed pedem retrahere , receptumque canere tempestiuè , satius est , priusquam malè audirens , vilis ineptusque apothecarius , sordidusque immò olidus vnguentarius , à medico quopiam Dispensatorii corrasore appeller , nulla ratione cum seplasiario conferendo ; à quo corripì reprehendive posse , æquitas vetitat , piaculumque putatur. Silere itaque volo , ne in Læce labyrinthum aliquem incautus incidens , illudere quempiam existimer. Verùm gallus in suo sterquilinio audet.

Ceterùm hic obiter etiam referre volo , vnguentum Aroga olei quoque magna tabescere penuria.

Ad podagram frigidam , siue calidam , paralyticos , arthriticos , nephriticos , ischiadicos , & ad omnia vitia & dolores neruorum valet.

Vnguentum album.

℞. Cerussæ in aqua Rosarum lotæ ℥ xviiij.
 Lithargyri albi loti ℥ j. β.
 Olei Rosati ℞ ij. ℥ iiij.
 Cera albißimæ ℥ vj. aut circiter.

Confice secundum artem.

Qui.

Quidam alia ratione componunt hoc vnguentum : nam alii addunt albumina Ovi, alii non addunt Lithargyrium : alii non Ceram , sed Tragacanthum admiscunt.

P O L L E T aduersus vlcera , scabiem, & adustionem , intertrigines, & inflammationem.

*Vnguentum Dialthææ simplex,
D. Nicolai.*

℞. Radicum Althææ P ij.

Seminis Lini

Seminis Fœnugræci ana P j.

Olei P iiij. Ceræ P j.

Terebinthinæ ʒ ij. Resinæ ʒ vj.

Radices & semina contusa macerentur tribus diebus in aquæ P viij, aut quantum sufficit : quarta die coquantur , donec remittant crassam & viscosam mucilaginem : eam deinde exprime : mox

℞. Expressæ mucilaginis P ij. & coque cum oleo : cum deinde aquosum illud in mucilagine consumptum fuerit , ceram addito , & fac secundum artem.

E M O L L I E N D I vim habet : calefacit, & humectat.

*Vnguentum Dialthææ compositum.
D. Nicolai.*

℞. Radicis Althææ P ij.

Semi-

Seminis Lini

Seminis Fœnugræci ana ℥ j.

Scillæ recentis ℥ vj.

Olei ℥ iiij. Ceræ ℥ j.

Terebinthinæ Gummi Hederæ

Galbani ana ℥ ij.

Colophonæ Resinæ ana ℥ vj.

Radices & semina contusa macerentur *
tribus diebus in ℥ viij. aut sufficienti *
quantitate aquæ : deinde coquantur do-
nec crassescat mucilago. Postea

℞. Mucilaginis expressæ ℥ ij. & adde reli-
qua : ac fiat secundum artem vnguen-
tum.

VALET propriè ad dolorem pectoris ex
frigidityte & pleuresi : & super pectus
inunctum sanat omnia loca : infrigidata
calescit : mollificat & humectat.

Vnguentum Ægyptiacum

D. Mesua.

℞. Æruginis ℥ v.

Mellis optimi ℥ xiiij.

Aceti fortis ℥ vij.

Coquantur omnia simul, donec fiat vn-
guentum spissum, & colore purpureum.

ÆRVGO, est viride aris.

CONFERT ad vulnera antiqua, fistu-
lasque extergit : carnis excrescentiæ me-
detur, vehementerque exsiccatur.

Vnguen-

Vnguentum aureum D. Mesue.

℞. Cera citrina ʒ vj.
 Olei boni ℥ ij. β.
 Terebinthina ʒ ij.
 Resina Colophonia ana ʒ j. β.
 Turis Mastiches ana ʒ j.
 Croci ʒ j.

Confice secundum artem.

V V L N E R A certò & salubriter glutinat.

Vnguentum Citrinum [aut Citreum,]
D. Nicolai.

* ℞. Boracis ʒ ij. Camphora ʒ j.
 Corallii albi ʒ iiij.
 * Amenti dulcis ʒ j.
 Umbilici marini
 Tragacanthæ albiſſimæ
 * Amyli ana ʒ ij. Cryſtalli Entalii
 Dentalii Turis albiſſimi
 * Nitri * Marmoris albi ana ʒ ij.
 Geſſe ſerpentariæ ʒ j. Ceruſſæ ʒ vj.
 Axungia porcinæ recentis, non ſalitæ, ſed
 præparatæ & mundatæ ℥ j. β.
 Sui caprini præparati ʒ j. β.
 Adipis gallinacei præparati ʒ j.

Confice ſic: Axungiam porcinam atque
 adipem gallinaceum in vitreato vaſe li-
 qua ſimul; & impone tepidis adhuc, cor-
 ticum

ticum Citrei mali satis magnam quantita-
tem, & macerentur per mensem vnum.
Posteà eximito cortices, & eliquatis adi- *
pibus, vt dictum est, adde seuum capri- *
num: deinde addantur reliqua tenuissimè
trita: vltimò verò insperge Camphoram
subtilissimè tritam.

Notandum est in hoc vnguento non concor-
dare exemplaria in ponderum characteribus.
Nam quidam pro \tilde{z} , ponunt z ; & econtrà.

BORAX est Nitri species, qua aurum ser-
ruminant Aurifabri.

AMENTUM dulce, est Gypsum, quod in A
capillatas venas scinditur: [al. Alumen plu-
mosum.]

VMBILICI marini, lapilli sunt inuenti
in litore maris, figura Fabarum magnarum:
Germanicè vocantur Merbonen.

DENTALIVM testaceum quiddam est ma-
rinum, Fistule modo longum & concavum,
foris stricturn, longitudine digiti parui.

DENTALIVM conchula marina est par-
ua, dentatam rimam habens.

NITRVM est Salptra.

GERSA Serpentaria, est radix Serpenta-
rie vera preparata, vt infra ostendemus.

P. C. SCHOL.

Amentum dulce.] Amiantum veterum A
esse id, permalè verterunt Eucksius & Francis.
Alex. longè enim alia res est. Barbara vocabu-
la, docti licet veterum vocibus quandoque sine
confer-

conformia, non ea propter semper re ipsa eadem sunt, nec esse debent, idemq; significare. Quæ in re doctos etiam viros interdum hallucinatos videmus.

FACIET maculas emendat: scabiem in quacumque corporis parte exterit, cicatrices extenuat; ruborem oculorum & vstiones ex insolatu factas aufert; & ea quæ aspera sunt, læuigat.

Vnguentum Populeum

D. Nicolai.

℞. Oculorum Populi arboris recentium ℥j.β.

† Axungia porcinæ præparata ℥ iiij.

Oculi Populi contundantur, & mace-
rentur in Axungia, donec sequentes herbe
colligi queant æstate.

℞. Foliorum Papaveris agrestis

Foliorum Mandragoræ

Cimarum Rubi tenerimarum

Foliorum Hyoscyami

Solani

Vermicularis

Lactucæ

Semperuiuæ maioris

Bardanæ

Violaria

Scatuncelli ana ʒ iiij.

Herbe contendantur & misceantur ocu-
lis Populi & Axungia, & dimittantur per
dies decem: deinde coquantur supra len-
tum ignem, cum vini odorati sufficienti
quantitate, donec vinum consumatur: po-
stea

ſicà coleantur & exprimantur, & expreſſum vnguentum reponatur.

MANDRAGORÆ folia ubique haberi non poſſunt; idè duplex pondus foliorum Hyoſcyami ſumendum eſt.

VERMICULARIS vera, eſt Semperuiua minor, linguam non mordicans.

BARDANA id eſt, Lappa maior, cuius radicem præcipiteſſe accipiendam Nicolaus Alexandrinus.

SCATUNCILLUM, reuerà eſt Umbilicus Veneris, ſeu Cymbalaris, & non Krentzkraut. Folia habet pingua, concaua ut Cymbalum, radicem Aro ſimilem: perquàm pauci eam cognoscunt.

CONTRA nimium calorem valet; & temporibus illitum, ſomnum conciliat.

Vnguentum Fufcum, D. Nicolai.

Rx. Olei	P	j.	β.
Ceræ nouæ	℥		iiij.
Colophonix			
Picis naualis			
Sagapeni	ana	℥	ij.
Mastiſches			
Galbani	Turis		
Terebinthinæ	ana	℥	j.

Confice ſecundum artem vnguentum.

SANANDI vim habet & extrahendi.

P

Vnguen-

*Vnguentum Diapompholygos,
D. Nicolai Alexandrini.*

R. Olei Rosacci

Ceræ albæ ana $\frac{z}{5}$ vj .

Succi fructus vucę Lupinę quantum sufficit.

Cerussæ $\frac{z}{3}$ ij. Plumbi vsti & loti

Pompholygis Tutis puri ana $\frac{z}{3}$ j.

Confice secundum artem.

DIAPOMPHOLYGOS, *id est*, de Nihili albo. Nam Pompholyx est Nihili album, *id est*, Galmes flug.

VVA Lupina, *id est*, Solanum siue Solatrum.

AD exiccanda erysipelata, vulnera sordida, & ad sananda tibiæ ulceræ, aliorumque locorum concaua vel dissipata, valet; replet, refrigerat & cicatrizat.

*Vnguentum Comitissæ, D. Guilielmi
de Varignana.*

R. Corticum medianorum Castanearum

Corticum medianorum Glandium

Corticis mediani Quercus arboris

Myrtillorum

Gaudæ equinæ Gallarum

Corticum Fabarum

Acinorum Vuarum

Sorborum immaturorum siccorum

Mespi-

Mespilorum immaturorum siccatorum

Foliorum Pruni siluestris

Radicum Chelidoniæ ana ʒ j. β.

Contundantur aliquantulum, & coquantur in aquæ Plantaginis ℥ viij, aut quantum sufficit, donec media pars consumpta fuerit: deinde, in colatura lauentur sequentia nouem vicibus; semper recentem aquam decoctionis affundendo, quotiescumque lauaris.

℞. Cerae nouæ ʒ viij. β.

Olei Myrtillorum

Olei Mastichini ana ℥ j. β.

Postea insperge sequentium rerum tenuissimum puluerem:

℞. Corticis mediani Castanearum

Corticis mediani Glandium

Corticis mediani Quercus arboris

Gallarum ana ʒ j.

Cineris ossium cruris bubuli

Myrtillorum Acinorum vuarum

Sorborum siccorum ana ʒ β.

Trochiscorum de Charabe ʒ ij.

Confice secundum artem vnguentum.

ACINI hic significant lignea semina que sunt in uvis.

SORBA sunt fructus similes Mespili: Germanicè vocantur Sporling, Sporbirn, Sporepsel, & Drecksecke.

PRUNUS siluestris, id est, Schlehdorn.

INCEPTVM abortum prohibet, hæ-

P 2 morrhoi-

morroïdas sistit, ac laxatos renes conciliat, [menses retinet.]

*Vnguentum de Arthanita maius,
D. Mesuæ.*

℞. Succi Arthanitæ l' iiij.
Succi Cucumeris asinini ℥ j.
Olei Irini ℥ ij.
Butyri vaccini l' j.
Pulpæ Colocynthidos ℥ iiij.
Polypodii ℥ vj.
Euphorbii ℥ β.

Arida omnia contundantur, & mace-
rentur in succis per dies octo: affuso etiam
oleo in vase vitreo, diligenter obturato:
nona deinde die coquantur lento igne ali-
quandiu, postea colentur: Colaturæ adde
Sagapeni in aceto dissoluti aureos v.
Myrrhæ aureos ij.

Coquantur iterum vsque ad consum-
ptionem succorum: postea adde
Ceræ ℥ v. Fellis taurini aureos v.

Ferveant simul, donec lique scat cera:
postea insperge sequentium rerum tenuis-
simum puluerem:

℞. Scammoneæ Aloës Mezereon
Colocynthidos ana aureos v.
Euphorbii aureos ij.
Salis gemmæ aureos iiij.
Turbith aureos v.

Pipe-

Piperis longi Zingiberis
Chamomillæ ana aureos ij.

Confice secundum artem.

Omnia ferè exemplaria habent Colocynthidos ana aureos v. meus autem manuscriptus Mesue habet aureum j. quod magis probo : sed textum nolui immutare.

ARTHANITA est Cyclamen ; sine Cyclaminus : quidam malè vocant Panem porcinum. Si radices eius non adsint recentes, tunc accipe radices eius siccatas circiter l' vj. contundantur & coquantur in aqua, & eliciatur succus, ut ex Glycyrriza fit.

ILLITVM stomacho, vomitu purgat : hypogastrio autem inunctum, aluum deiicit, ob id hydropicos mirè iuvat, ferosum excrementum largè vacuando : vermes quoque necat, & educit : adhibetur non potentibus sumere medicamentum purgans.

*Vnguentum de Arthanita minus,
D. Mesue.*

℞. Succī Arthanitæ
Viscositatis quę exprimitur è radice Filicis
Succī Cathengit ana ℥ ix.
Succī extremitatum Tamarisci ℥ ij.
Oesypi [id est, Hyssopi humida] ℥ v.
Olei Irini l' ij.
Bdellii Hammoniāci ana ℥ j. ℞.
P 3 Aceti

Aceti quantum satis est ad Hammoniacum dissoluendum.

Ceræ Citrinæ ℥ vj.

★ Corticum radicum Capparis ℥ j. β.

Spicæ ℥ iiij.

Confice secundum artem vnguentum.

FILIX non significat Polypodium, sed eam herbam qua Germanicè vocatur *Walsfarren*, & *Creutzfaren*.

CATHENGIT significat Ebulum : est autem hoc vocabulum valdè corruptum in plurimis exemplaribus.

OESYRYS, id est, *Hyssopus humida*, & est pinguis lanarum succidarum.

SPLENIS tumores etiam scirrhosos dissolvit, & strumas.

Vnguentum Potabile.

℞. Butyri recentis sine sale l' iiij,

Rubiæ tinctorum

Castorei

Spermatis Ceti

Tormentillæ [radicum] ana ℥ j.

Bulliant simul in vino odorifero ad vini consumptionem, ac fiat vnguentum secundum artem.

DATUR ad consolidandum casum ex alto. [Sumitur ab uncia dimidia ad integram.]

Vnguen-

Vnguentum Rosatum, D. Mesua.

℞. Axungia porcinę recentis quantitatem
 quam volueris, & laetetur in aqua ca- *
 lida nouies, & tandem cum aqua
 frigida lotionē vltima: deinde teratur
 cum ea Rosarum rubearum recentium
 æquum pondus, & dimittantur mar- *
 cescere per dies septem: postea coquan-
 ter cum facilitate, ac percolentur, &
 rursus tantundem Rosarum rubearum
 teratur cum ea, & dimittatur per alios *
 dies septem marcescere, atque adfunda-
 tur succi Rosarum pars dimidia, olei
 Amygdalini pars sexta; & rursus con-
 coquantur cum facilitate, dum succi
 euanescent. Quodd si parum Opii in *
 aqua Rosarum colliquatum inter deco-
 quendum iniicitur, fit efficacius.

PHLEGMONAS, erysipelata, herpe-
 tas sedat: Cephalalgiam calidam, & ven-
 triculi ac hepatis intemperiem calidam
 mitigat.

Vnguentum Pectorale.

℞ Mucilaginis seminis Psyllii

Tragacanthę

Gummi Arabici

Seminis Lini

Fœnugræci ana ℥ j.

P 4

Adj. *

Adipis gallinæ Medullæ vituli
Butyri recentis loti cum aqua Violarum
ana ℥ j. β.

Olei Violati

Olei Amygdalorum dulcium ana ℥ j.
Ceræ albæ quantum sufficit: fiat vnguentum.

M I T I G A T dolores pectoris & tussim:
digerit, maturat, faciliat sputum, & res-
soluit pleuresin.

Vnguentum Album Caphuratum.

℞. Olei Rosati ℥ j.

Ceræ albæ ℥ iiij.

* Cerussæ ℥ vj.

* Albi ouorum num. iiij.

Caphuræ dissolutæ cum aqua Rosarum ex
arte ℥ ij.

Fiat vnguentum secundum artem.

Vnguentum Rubrum Caphuratum.

℞. Olei Rosati ℥ j. β.

Lithargyrii ℥ ij.

Minii ℥ iiij. Cerussæ ℥ j. β.

Tuthiæ

Caphuræ ana ℥ iiij.

Ceræ ℥ ij. in æstate: Sed in hieme ℥ j.

Fiat vnguentum in pila plumbea cum
pistillo plumbeo.

C E R O-

C E R O T A .

*Cerotum Infrigidans Galeni,
ex Mesue.*

℞. Cerae albę ℥ j. *
Olei Rosati omphacini ℥ iiij. *

Conquassentur simul cum modico albi & clari aceti. Oleum verò Omphacinum antequam Rosas recipiat, sæpiùs est lauan- dum cum aqua fontis gelidissima: deinde confice secundum artem.

R E F R I G E R A T febres ardentes, ca- lorem hepatis, & sedat dolores capitis, circum tempora, super hepar & spinam dorsi linitum.

Cerotum Santalinum, D. Mesue.

℞. Rosarum ℥ xij.
Santali rubei ℥ x.
Santali albi
Santali citrini ana ℥ vj.
Boli Armeniaci ℥ vij.
Spodii ℥ iiij. Camphorę ℥ ij.
Cerae albę ℥ xxx. Olei Rosati ℞ j.

Confice secundum artem.

O L E U M Rosatum debet fieri ex oleo acer- bo, id est, ex immaturis oliuæ expresso.

P 5

P H L E-

P H L E G M O N A S & intemperaturas
omnes calidas ventriculi, hepatis, & par-
tium aliarum potentissimè extinguit.

*Cerorum Stomachale Galeni,
D. Mesue.*

℞. Rosarum rubrarum ʒ ʒxx.
Foliorum Absinthii ʒ ʒv.
Mastiches ʒ ʒix.
Spicæ Nardi Indicæ ʒ ʒ.
Cere mundæ ʒ ʒiiij.
Olei Rosacei ℥ j. β.

Cera & oleum aliquoties ex aqua Rosa-
rum lauentur, & excolata omni aqua rur-
sus ad lentum ignem resoluantur: deinde
alia omnia insubtilissimum pulverem tri-
ta, inspergantur.

V E N T R I C U L U M & hepar roborat:
horum dolorem à frigido lenit, appe-
tentiam excitat, coctionem iuuat.

E M P L A S T R A.

*Emplastrum Diachylon simplex,
D. Mesue.*

℞. Mucilaginis Fœnugræci
Mucilaginis seminis Lini
Mucilaginis radicum Althææ ana ℥ j.
Olei

Olei veteris clari ℞ iiij.

Lithargyrii ℞ j. β.

Coquantur secundum artem, & fiat Emplastrum.

DIACHYLON vocatur hoc Emplastrum, à succis viscosis siue mucilaginibus : hodie corrupto nomine dicunt *Diaquilon*.

Mucilagines istæ debent esse spissæ & viscosæ : ideoq; oportet ut quantitas seminum & radicum sit satis magna, unde fieri debent mucilagines.

*SCIRRHO*s hepatis, lienis, ventriculi, & aliarum partium, ipsas etiã chceradas & durities reliquas emollit & iuuat.

*Emplastrum de Mucilaginibus,
seu Diachylon compositum.*

℞. Mucilaginis Radicum Althææ

Mucilaginis seminis Lini

Mucilaginis mediani corticis Ulmi

Mucilaginis Fœnugræci ana ℥ iiij.

Olei Chamæmelini Olei Liliorum

Olei Anethini ana ℥ j. β.

Hammoniæ Galbani Opopanacis

Sagapeni ana ℥ β.

Ceræ nouæ ℥ xv.

Croci ℥ ij. Terebinthinæ ℥ ij.

Gummi siue lachrymæ resoluantur in vino optimo, & conficiatur secundum artem Emplastrum.

Porro hieme licet oleorum & Terebinthina pondus augere.

YLMVS arbor est que vocatur Germanicè Ylmen & Rußern. Cortex eius medius est similis cortici Tiliæ: Gleich wie ein bast: ex eo debet fieri mucilago.

CHAMÆMELVM, vulgè vocatur Camomilla.

MATVRATA apostemata, & mollit durities; partim resoluit, & partim digerit, abstergitque saniem ruptorum apostematum, & sanat phlegmones.

Emplastrum Diachylon magnum, Filii Zachariae, ex Mesue.

℞. Lithargyrii mundi tenuissimè triti, & per cribrum excussi ℥ xij.

Olei Icini

Olei Chamæmelini

Olei Anethini ana ℥ viij.

Mucilaginis seminis Lini

* *Mucilag. rad. Althææ*

Mucilag. Fœnugræci

Mucilag. Ficuum pinguium

Mucilag. Passularum

Succi Ireos Succi Scillæ Oesypi

* *Glutinis Alzanahan ana ℥ xij. β.*

* *Terebinthinæ ℥ iij.*

Resinæ Pini

Ceræ citrinæ ana ℥ ij.

Con.

Conficiatur secundum artem Emplastrum.

S V C C V S Scilla, est mucilago ex trita Scilla expressa.

O E S Y P V S, est pinguedo lanarum succidarum; cuius faciendi modum in ultimo tractatu indicabimus: vulgò vocatur in Pharmacopœiis *Hyssopus humidus*.

G L V I E N Alzanahan vel *Alchanach*, siue *Alzanach*, est *Ichthyocolla*, id est, gluten, siue colla piscium: vulgò *Hausenblasen*. [*Alii sumunt Limacum succum.*]

Hoc Emplastrum debet habere consistentiam & spissitudinem Ceroti.

R E S O L V I T & maturat omnes durities & inflammationes.

*Emplastrum Diachylon paruum,
D. Mesue.*

R. Lithargyrii ℥ vj.
Olei veteris clari l' j.
Mucilag. Psyllii ℥ iiij.
Mucilag. Hyoscyami ℥ j. β.
Mucilag. seminis Lini
Mucilag. radicum Maluæ ana ℥ ij.

Conficiatur secundum artem Emplastrum, Ceroti alicuius spissitudine.

T Y M O R E S calidos digerit & maturat.

*Emplastrum de Meliloto,
D. Mesuæ.*

- ℞. Meliloti ℥ vj.
 Florum Chamæmeli
 Fœnugræci Baccarum Lauri
 Radicum Althææ
 Absinthii ana ℥ iiij.
 Seminis Apii
 * Cordumeni Ireos Cypeti
 Spicæ Nardi Indicæ
 Cassiæ lignæ
 * Ammios ana ℥ ij. β.
 * Sampsuchi [*id est, Maiorana*] ℥ iiij.
 Hammoniæci [*id est, Harmoniæci*] ℥ x.
 Styracis calamitæ
 Bdellii ana ℥ v.
 Terebinthinæ ℥ j. β.
 Ficum pinguium num. xij.
 * Seui caprini
 Resinæ ana ℥ ij. β.
 Cera ℥ vj. Olei sampsuchini
 Olei Spicæ ana quantum sufficit.

Confice Emplastrum sic:

- ℞. De Meliloto prædicto ℥ v. ℥ ij.
 Fœnugræci
 Chamæmeli seorsum præter prædicta ana
 ℥ iiij.

Coquantur in l' iiij aquæ aut quantum
 sufficit, donec remaneat l' j. deinde om-
 nia

nia arida cum reliquis sex drachmis Meliloti subtilissimè pulueriscentur. In decoctione autem colata secundum artem dissoluantur Hammoniacum & Bdellium: dissolutis addantur Ficus per se minutissimè incisæ & contusæ, & optimè misceantur. Postcà ad ignem simul liquefiant Terebinthina, Seuum caprinum, Cera & resina Pini, & addatur olei Spicæ Nardi, olei Sampsuchi ana circiter $\frac{3}{4}$ v. Cùm deinde omnia sunt mista, addantur pulveres triti, & fiat secundum artem Emplastrum.

Porro potes etiam sequenti ratione conficere. $\frac{3}{4}$ vj. ingredientis Meliloti vnà cum reliquis aridis tundito, & iisdem permisceto: postcà & ad decoctionem priuatim Meliloti m. iiij. & gummi, videlicet Hammoniacum atque Bdellium, in vino dissoluito: Olei verò Sampsuchini atque Olei Nardini accipere tum oportet ana circiter $\frac{3}{4}$ vij. aut $\frac{3}{4}$ viij. & confice secundum artem Emplastrum.

OLEI Sampsuchini compositio suprà traditur in tractatu de Oleis.

Per Oleum Spica, Mesue intelligit oleum Spica Nardi, siue oleum Nardinum. Mesue eximiusquam meminist Lauandula maioris, qua hodie Spica vocatur; neque eius olei quod vocant oleum Spica.

EMOLLIT omnem duritiem quæ in iecinore, liene & ventriculo existit. Dolorem

lorem item vehementer sedat, hypochondriaque tensa sanat.

- * *Emplastrum Triapharmacum Mesuae,
cui sub Vnguenti nomine
describitur.*

℞. Lithargyrii subtilissimè triti

Aceti vini ana ℥ j.

Olei veteris ℥ ij.

- * Fiat coctione secundum artem Emplastrum.

F A C I T nasci carnem in vulneribus; & consolidat ea.

*Emplastrum Oxycroceum,
D. Nicolai.*

℞. Ceræ Picis Colophoniæ

Croci ana ℥ xij. Terebinthinæ

Galbani Hammoniæ Myrrhæ

Libani [id est, Turis]

Mastiches ana ℥ iiij.

Aceti phialam vnam.

Galbanum & Hammoniæ in aceti
sufficienti quantitate dissoluantur, & rur-
sum ad lentorem coquantur, donec ace-
tum in vaporem evanuerit: tum addan-
tur liquefactis simul Ceræ, Pici, Colo-
phonix & Terebinthinæ: postquam om-
nia

nia sunt commista, inſpergito etiam Myrrham, Libanum & Maſtichen ſubtiliſſimè trita : ad vltimum verò etiam Crocum per ſe in tenuiſſimum puluerem redactum. Et fiat ſecundum artem Emplaſtrum.

OXYCROCEVM dicitur hoc Emplaſtrum, ab ingredientibus Croco & Aceto.

Nicolaus Alexandrinus ſecundum hunc A modum tradit Oxycrocei confectionem. Alii autem qui ex eo hoc Emplaſtrum ſcripſerunt, tertiam eius partem deſcribunt : & cum \mathfrak{z} iiij. in tres partes diuidere conarentur, tertiam earum partem ſtatuerunt \mathfrak{z} j. \mathfrak{z} iij. itaque reſultat \mathfrak{z} j. Nam ter tria nouem faciunt : quapropter nos malimum ex fonte haurire huius Emplaſtri confectionem.

P. C. SCHOL.

Nicolaus Alexand.] Fuchs. prauè hic cenſet A Cordum in ponderum ratione errare, re non bene ab ipſo met ponderata.

PRODEST oſſibus fractis, item patibus quæ dolore aliquo affliguntur: durtiam denique omnem emollit & diſcutit.

Emplaſtrum Apoſtolicon, D. Nicolai.

R̄. Lithargyrii* \mathfrak{z} vj.

Ceræ fuluæ

Colophonix ana \mathfrak{z} ij.

Propoleos

*

Viſci

* Visci quercini ana $\frac{3}{4}$ j.

Hammoniæ

Lapidis calaminaris ana 3 vj.

Mastiches Olibani

* Mumia ana 3 iiij.

Terebinthinæ Bdellii Galbani

Myrrhæ Æris vsti Squammæ æris

Viridis æris Sarcocollæ

Dictamni Cretici

Aristolochiæ rotundæ

Opopanacis ana 3 iiij.

* Oleis veteris quantum satis erit.

Vini clari quantum Galbano, Hammoniaco & Opopanaci dissoluendis satis fuerit.

Confice secundum artem & diligenter Emplastrum.

Nicolaus olei quantitatem non exprimit: quare nonnulli ℞ j. iniiciunt.

PROPOLIS non sunt sordes alueariorum apum, sed est Cera odorata; qua apes ante hiemem foramina alueariorum obturant: Germanicè vocatur Bet & Nebenvvax; eam apes colligunt ex oculis Populi & Betula arborum.

VISCUM quercinum hic non significat lignum visci quercini, sed glucen illud lenum ex visco quercino extractum, quo capiuntur aues, hoc est, Der vogelleyne auß Eichenmistell gemacht.

SQUAMA aris est duplex: una est crassa,
qua

qua vocatur Germanicè Kupfferschlach; altera farina modo tenuis & rufa: hac vocatur Kesselbraun, & est efficacior, & hic debet poni.

VALET ad dolores cervicis potissimum & renum; sagittas ac surculos corpori infixos extrahit.

Emplastrum Apostolicum, D. Nicolai Alexandrini.

R. Lithargyrii ʒ xvij.

Ceræ rubræ

Colophonix ana ʒ vj.

Propoleos

Visci Quercini ana ʒ iij.

Hammoniæ

Lapis Calaminaris ana ʒ ij.

Turis Mastiches

Mumiæ ana ʒ j. β.

Terebinthinæ Galbani

Bdellii Myrrhæ

Chalcu cecaumenu Sarcocollæ

Lepidos chalcu Opopanacis

Dictamni Cretici Aristolochiæ

Prasii viridis ana ʒ j.

Olei veteris quantum sufficit.

Coquatut Lithargyrium secundum artem in oleo, donec fiat massa purpurea, & non adhæreat manibus dum refrigerata tractatur, quod Græci vocant Amolynum: deinde omnia figillatim secundum artem

artem iniiciantur. Galbanum & Opopanacum in vino dissoluantur: reliqua Gummi terantur & inspergantur. Dictamnus Creticus verus solus ultimò addatur.

Nicolaus Alexandrinus non ponit olei pondus aut mensuram: mihi autem videntur sufficere uncie sex.

CHALCY CECAYMENY, id est, *Æris vsti.*

LEPIS Chalcu, id est, *Squama aris: Germanicè Kufferschlag, vel Kesselbraun: & efficacior est altera eius species qua Kesselbraun vocatur.*

PRASIUM viride hic significat *Æruginem, id est Viride aris.*

Ad omnia vulnera recentia siue antiqua, & ad nervos præcisos vel musculos, ad puncturas vel morsum terrestrium animalium vel maritimorum peculiariter congruit: educit ab eis humores & putredines intimè immerfas, & concavitates earum pura carne replet; repletisque cicatricem absque detrimento inducit: Sagittas, calamos, & similia altius membris infixæ, sine dolore extrahit.

Emplastrum Album coctum.

Rx. Olei	℥	ij.
Cerussæ	℥	j. β.
Ceræ albæ	℥	iiij.

Coquan-

Coquantur secundum artem, & fiat Emplastrum.

OPITVLATVR excoriatis à calceamentis, & scapellatione, vel ab alia causa.

Emplastrum griseum, de Lapide Calaminari.

℞. Lapidis Calaminaris præparati ℥ j.
 Lithargyrii ℥ ij. Cerussæ ℥ β.
 Tuthiæ ℥ j.
 Terebinthinæ ℥ vj.
 Cera alba ℥ j. β.
 Seu ceruini ℥ ij.
 Turis electi ℥ v. Mastiches ℥ iiij.
 Myrthæ ℥ ij. Camphoræ ℥ j. β.
 Confice secundum artem.

DESICCAT, replet & cicatrifacit vlcera.

Emplastrum viride.

℞. Cera nouæ Resinæ
 Terebinthinæ ana ℥ iiij.
 Olibani [id est, Turis] Mastiches
 Viridis æris ana ℥ iiij.
 Confice secundum artem.

Emplastrum Basilicum magnum.

℞. Cera albę
 Resinæ Pinæ Seu vaccini
 Picis

Picis naualis Terebinthinæ Olibani
Myrrhæ ana \mathfrak{z} j.
Olei quantum sufficit : fiat Emplastrum.

ULCERA phlegmone carentia , præ-
sertim partium neruosarum , terget , &
carne implet.

*Emplastrum de Crusta panis,
Montagnanæ.*

R. Mastiches Menthæ Spodii
Corallii rubri
Santali rubri
Santali albi ana \mathfrak{z} j.

* Crustæ panis tostæ & maceratæ in aceto
per horam mediam \mathfrak{z} ij.

Olei de Mastiche
Olei Cydoniorum ana \mathfrak{z} j.
Farinæ hordei , quantum sufficit.

Fiat Emplastrum.

VALET in vomitu puerorum , & his
qui cibum retinere non possunt.

*Emplastrum de Baccis Lauri,
D. Mesuæ.*

R. Turis Mastiches
Myrrhæ ana \mathfrak{z} j.
Baccarum Lauri \mathfrak{z} ij.
Cyperi
Costi ana \mathfrak{z} β .

Mel-

PRÆPARATIONES QVORVMD. SIMP. 359
Mellis calidi colati quantum ad cogen- *
dum satis est.

Si verò triplum Cyperi, & stercoris vac-
catum aut caprarum sicci ad pondus om-
nium accipiatur, erit efficacius ad hydro-
pisin, & inflationes discutiendas.

VENTRICVLI, intestinorum, hepa-
tis, renum, vesicę, vteri, & partium alia-
rum dolorem à flatibus aut intemperie frì-
gida ortum placat.

PRÆPARATIONES QVORVNDAM SIMPLICIVM.

*Aloën cum Aromatibus
abluendi modus.*

℞. Aloës purissimę & cribratę ℥ j. *
Casię lignę
Spicę Nardi Indicę
Asari Schœnanthi
Carpobalsami [aut succedanei eius]
Xylobalsami [aut succedanei eius]
Cinnamomi Ligni Aloës
Crocī Mastiches
Lacçę ana ʒ iiij.

Decoquantur aromata in aquę quanti- *
tate sufficienti, secundum artem in duplici
vase;

vase; deinde colentur. In colatura dissolue Aloën, continuè agitando : & pone ad solem in vitrea aut vitreata patina, donec exsiccetur. Oportet autem patinam linteolo puro tectam soli exponere, ne aliquid incidat. Quòd si hieme lauanda est Aloë, in estuarium ad fornacem ponatur : oportet etiam fundo vasis insidentes arenas, & si quæ sunt aliæ sordes, diligēter auferre.

Aloën simplex abluendi modus.

℞. Aloës purissimæ & tritæ ℥ ij.
Aque cælestis q. s. aut ℥ vj.

Misceantur in patina vitrea, ita vt aqua calefacta priùs infundatur : deinde subside finito sordes & calculos ; & puram pinguemque aquam , cui se pura Aloë miscuit , sensim excolato, & sordes in fundo abiicito; postea colaturam tectam linteolo in sole exiccato.

Laccam abluendi modus.

Modus abluendi Laccam, qui passim à scriptoribus traditur, admodum absurdus est : & qui eum primus inuenit aut tradidit, Lacca naturam penitus ignorauit : nam quidquid purum, sincerum & efficax est in Lacca, illud aqua miscetur, quam illi dicunt abiiciendam esse, & quod remanet, in Trochiscos formandum,

*dum, hoc est, calculos, ligna & sordes. Nos
verò rectius modum tradimus.*

℞. Aristolochiæ longæ
Schoenanthi ana ʒ ij.

Decoquantur in aquæ l' iiij. aut q. ʒ.
donec remaneant l' ij.

Colaturæ insperge
Lacæ integræ l' j. ʒ iiij.

Decoquatur Lacca deinde lento igne,
donec aqua fiat coloris sanguinei: & quid-
quid in Lacca boni fuerit, dissoluatur;
tum per filtrum aut laneum pannum cola,
& remanentes sordes abice. Excolatam
verò & sanguinei coloris aquam lentis
prunis in duplici vase usque ad mellis spis-
situdinem coquito, & tepidam massam in
Trochiscos fingito. Hic itaque verus est
modus abluendi Laccam.

Plumbum lauandi modus.

℞. Mortarium plumbeum: in eum infun-
de aquam cælestem, & agitato aliquot
horas aquam in mortario, donec aqua
colorem acquirat lividum, & crassescat
in modum limi. Limum hunc per lin-
teum exprime, & exiccatum repone
[in pastillos.]

*Limatura ferri, quam Scoriā vocant,
preparatio.*

℞. Limaturam ferri optimi, aut Chaly-
bis,

bis, aut Squamam, hoc est, Batituram eius: purga eam ab omnibus immunditiis, hoc modo: Proiiciatur in aquam clarissimam, & fricetur manibus: postea sordidam aquam effunde totam, deinde impone limaturam in vitream patinam, & affunde modicum aceti, ut tantum humectetur, nec emineat acetum: postea macra diebus xxx. ultimò tere, & repone.

Scammoneam preparandi modus.

℞. Scammoneę optimę ℥ iiij.

Contere in subtilissimum puluerem: deinde insperge illi olei Violati optimi modicum, ut fiat massa: deinde excava aliquot Cydonia mala magna, & in cavitatem eorum impone massam Scammoneę, & coöperi foramina Cydoniorum: postea assa in fornace cum pane, donec Cydonia perfectè sint assata: deinde exime Scammoneam, & impone sequenti diluto:
℞. Carnium Myrobal. Citrinarum ℥ j.
Succi Cydoniorum ℥ iiij

Conterantur Myrobalani, & misceantur cum calefacto Cydoniorum succo, & stent in infusione horis xxiiij. deinde leniter cola: colaturam verò infunde Scammoneę, & optimè simul misce: ultimò in loco calido exicca, & exiccata repone Scammoneam: [quod Dacrydium, Diacrydium & Diagridium vocant.]

Colocyn.

Colocynthis preparatio.

℞. Colocynthis pulpæ ℥ j.

★

Bdellii

Tragacanthę ana ʒ xij.

Incidatur Colocynthis minutissimè:
Tragacanthum verò & Bdellium dissolue
in aquę Rosarum q. s. & dissoluta insper-
ge incisę Colocynthidi, & fac Trochiscos,
quos in sicco aliquo loco sic cabis: exsicca-
tos deinde Trochiscos iterum subtilissi-
mè terito, & reforma Trochiscos, adhibi-
ta Mastiche in oleo Rosaceo dissoluta.
[Porro Trochiscorum Alhondal confe-
ctio, est vera Colocynthis preparatio]

Scille preparatio.

℞. Scillam magnam, recentem, neque
putridam, neque gelu flaccidam: abice
eius exteriores aridas tunicas: inuolue
deinde eam massę suę pastę pistorum
unde panis fit: allato postea in furno
cum panibus, donec panes percocti
fuerint: hinc è furno exime Scillam, &
figillatim omnes tunicas detrahe, &
funiculo traiectas in calido loco exsic-
cato: abiicito verò medio Scillę cor,
unde germen enasci solet. Porro Scilla
non est incidenda ferreo aliquo cultro.

★

sed è ligno solido aliquo facto : nam contrahit à ferro venenosam quandam rubiginem.

Mezerei fol. preparatio.

℞. Foliorum Mezerei quantum libuerit: ea macera in aceto vini horis xxiiij. postea exsiccentur: cum verò vti iis voles, contere, & in contundendo abiice eorum venas & neruos.

Esula rad. preparatio.

Esula tam maior quàm minor, præparatur eodem modo quo Mezereon.

Gersam Serpentariae faciendi modus.

℞. Radices Serpentariae veræ, vel loco eius radicum Ari, idest, Aronis ℥ iiij. Terantur subtilissimè, & affunde eis aquæ Rosacæ ℥ iiij. deinde exsiccentur ad solem in vitrea patina, linteolo tecta. Postea secundò tantum aquæ rosacæ affundito, & simili modo exsicca: tertid eadem aquæ Rosacæ quantitas inspergatur: & vltimò siccata farinam cum vino odorato in Trochiscos siue orbiculos finge, & repone. Ingreditur autem hæc Gerfa vnguentum Citrinum, & re-

& reliqua quæ ad nitorem cutis conficiuntur.

Spodium præparandi modus.

R. Eboris in partes secti P j.

Pon: id in nouum & nondum crematum fictile, & crudo operculo tegito, & iuncturam luto figulino diligenter oblitito: postea in fornacem figuli mitte, & cremari finito, donec fictilia percocta sint: deinde exemptum Ebur in tenuissimum puluerem terito & cribrato, & infunde ei in patina vitrea aquæ Rosarum P ij. & exsiccare finito. Deinde secundò terito, & alias ij. l. aquæ Rosaceæ affundito, atque similiter exsicca. Tertiò etiam terito, & admisce aquæ Rosarum P j. in qua diligenter dissolutæ sint Camphoræ tritæ subtilissimè ʒ iiij. Tere omnia in tabula marmorea durissima, & finge Trochiscos: quos repone in denso vase aliquo, ne exspirent. Porro si Ebur habere non poteris, loco eius sume Cornu ceruinum, & similiter præpara: est enim hoc quoque efficax medicamentum ad multa, præsertim contra venena.

Ebur crematum, melius est ut [non] operito fictile fiat, aliàs enim non candidum, sed nigrum fit.

Pulmonis Vulpini preparatio.

R. Pulmonem Vulpis recentem : extrahe ex eo arteriam siue fistulam , & laua in vino odorato calefacto : mox ollæ impositum , exsicca in tepido furno : deinde exsiccatum repone in loco sicco , & involue Absinthio , ne putrescat.

Hepatis Lupini preparatio.

Hepar Lupi eodem modo præparatur quo pulmo Vulpis.

Sanguinis Hircini preparatio.

Hircum mediocris ætatis domi alito , & per mensem nihil aliud dato præter Pimpinellam , Apium , Petroselinum , Leuisticum , & similia : deinde sanguinem eius , qui ex arteriis fluxit , excipito , & crescere finito ; atque aqueum illud effunde , grumos verò sanguinis in furno exsicca. Mastandus autem est Hircus Veris exitu , id est , principio æstatis , cùm Sol Cancrum ingressus est.

Adipum vel Pinguedinum preparatio.

R. Adipem vel Pinguedinē cuiuscumque anima-

animalis ; & lava in aqua aliquoties , donec pura defluat aqua , & non amplius faniola , aut cruenta appareat : deinde minutim incisam liqua in duplici vase ; & eliquatam in frigido loco repone , sine sale.

Medullarum preparatio.

Medullas ex ossibus auferro Autumnii initio , & lava , & liqua in duplici vase , secundum modum qui traditus est in Adipum siue Pinguedinum præparatione.

Oesypum faciendi modus.

℞. Lanæ succidæ , hoc est , nondum purgatæ , ex collo , feminibus & femoribus ovis detonsæ , quantitatem satis magnam ; infunde ei aquam feruidam , & lava diligenter , quousque omnem suam pinguedinem in aquam deposuerit. Postea expressam lanam sepone , & aquam illam pinguem & sordidam vasculo aliquo diutissimè ex alto fundito & refundito , donec spumosa fiat : tum finito spumam subsidere , & collige aquæ innatantem pinguedinem ; iterumque aquam refundito , donec spumet , & subsidentem pinguedinem auferro , & rursus refundito , donec non amplius spumet , & nulla concreseat

supra aquam pinguedo. Tum collectam pinguedinem iungito, & in aqua lauto, manibusque diducito, donec pura fiat, & aqua clara defluat & albescat, & pinguedo linguam admota non mordeat: tum repone in fictili denso, loco frigido. Porro hic Ocsypus hodie vocatur corrupto nomine Hyssopus humida: sed non bene præparatus habetur in Pharmacopoliis.

*Terebinthinam resinam coquendi
modus.*

℞. Resinæ Terebinthinæ, aut eius loco Laricinam resinam, quam Terebinthinam hodie vocant, ℥ j. affunde ei aquæ ℥ xxiiij, & coque in magno vase, donec odorem amittat, & inspissetur, adeò ut refrigerata digitis in pulverem teri queat. Hoc modo vsta [seu cocta potius] resina ingreditur in quædam Unguenta, Olea, & in Trochiscos Cyphi, qui pertinent ad Mithridatium.

Acacia Succedanea.

Acacia vera apud nos non potest confici: eius autem loco sumunt nostri Pharmacopola totius ferè Europa, succum Prunorum silvestrium, id est, Schlehen-safft. Sed hac, quam describemus, propius ad vera Acacia vires accedit.

℞. Sc-

℞. Seminum Thamarindorum

Sumach ana ℥ ij.

Contundantur, & affunde eis aquæ cælestis [seu pluriæ] ℥ viij. aut q. s.

Macera deinde per horas xxiiij. Postea coque donec tertia pars aquæ remaneat: excolatam deinde aquam, cum albuminibus ouorum clarifica & despuma: despumatam deinde iterum coque supra lentas prunas, ad spissitudinem iustam; deinde repone, ut Acaciam ex Prunellis siluestribus factam.

P O N D E R V M

R A T I O.

P O N D E R A quibus hodie Medici utuntur, hæc sunt: *Libra, Quartarium vel Quadrans, Uncia, Drachma, Scrupulus, Obolus, Lupinum, Granum, Siligua, Lens;* & hæc quidem à Græcis atque Romanis mutuârunt.

Præter hæc sunt alia quæ à Barbaris atque Arabibus desumpserunt; qualia sunt, *Manipulus, Pugillus, Aureus, Kist Kirath, & Danic;* quorum nominibus Mesuæ potissimum uti constat.

Libra itaque, quæ & Pondo etiam dicitur, in duodecim uncias diuiditur. Errant itaque indocti huius ætatis Pharmacopola, qui libram

Q s seducim

sedecim unciarum, quos sanè mercatoria ac negotiatoria est, in medicamentis conficiendis accipiunt. Ea autem illos uti libra faciliè ex quartis colligitur, quibus uncias quatuor assignant; quas si quater sumpleris, sedecim prodibunt uncia. Quartam autem libra partem, Latini Quadrantem nominant, sicuti tertiam Trientem, sextam Sextantem. Quadrans itaque, vel (ut nostri loquuntur) Quarta, vel Quartarium, pondus exsistit trium unciarum; Triens verò quatuor; veluti Sextans duarum unciarum.

Porrò Uncia octo drachmas constituit; denarios septem: Drachma scrupulos tres: Scripulum verò, qui Gracis ρεῖμμα dicitur (quasi primum ponderis elementum) nonnulli Scripulum etiam nominant: habet verò obolos duos. Obolus pendet grana duodecim; quae idcirco viginti quatuor scrupulum constituunt. Nicolai tamen scrupulus ex viginti tantum granis constat.

At & alia pondera Græcorum Medici usurpârunt. Drachma enim novem Lupinos pendit: Siliqua verò, quæ Gracis κισῖνος, est dimidium Lupini: Siliqua itaque sex, Lupini tres scrupulum pendent. Semen autem in Siliqua contentum, non tota Siliqua, intelligitur: & id mediocre, non enorme & habitius; neque strigosum & emaciatum, qualia Hordei aut Triticigrana usurpamus, quæ hodie minimum pondus faciunt, veluti olim grana Lentis. Unum verò

verò *Siliqua* granum sex *Lentis* seminibus pondere respondet: quæ si sexus sumpseris, in unicum triginta sex *Lentis* semina præbunt, quæ scrupulum constituunt.

Nunc ad ea, quibus *Arabes* & recentiores usi sunt, veniamus: inter quæ primum *Manipulus* nobis occurrit. Sic autem vocant herbarum fasciculum, quem manus prehendere & compleri potest. *Pugillo* autem perperam pro pondere venitur recentiores, cum sit diminutivum potius à pugno, qui compressis sit digitis. *Aureus*, illis pondus unius drachmæ cum dimidia significat. *Danich* pondus octo granorum: *Kirath* verò quatuor.

P. C. SCHOL.

Danich] Contra *Georgii Agricola*, aliorumque doctiorum virorum sententiam, *Cordus* *Danich* pondus granorum sex, & *Kirath* trium faciebat.

NOTÆ PONDERV M
QVÆ HODIE IN
VSV SVNT.

Grani	} Nota est {	Ö. Eingrein oder Ger- stenkoralein schwer.
Scrupuli		Ḑ. Ein scrupel, ein dritteileins quintlis.
Drachmæ		z. Ein quintle, oder gulden schwer.
Unciæ		z. Ein vntz, ist zwey lot.
Quadrantis		Quad. Ein quart, vi. lot.
Libræ		l. Ein pfund.
Semis		ß. Halb.
Manipuli		M.
Pugilli		P.

FINIS eorum quæ Valerius Cordus Nu-
rembergenſi Senatui exhibuit.

V A L E.

VALERII CORDI

D E

E X T R A C T I O N E ,

V T V O C A N T ,

P U R G A N T I V M M E D I C A M E N T O R V M ,

E T

O L E O R V M D I S T I L L A T I O N E ;

in genere primùm; deinde priuatim de Oleo è Chalcantho duplici, vno austero (vel acido) altero dulci:

Libellus tripartitus, à CONRADO GESNERO primùm publicatus, & VAL. CORDI Annotationibus in Dioscoridem ab eodem annexus.

P A R S P R I M A .

De Extractione. Cap. 1.

EXTRAHITUR ex medicamentis Solutius ipsa qualitas purgans æquè ac Olea, sed diuersa ratione. Olea propter aëriam substantiam ascendant in distillatione: Solutiua verò facultas, quoniam terrestri corpori inseparabiliter inhæret, non ascendit, sed in fundo relinquitur: excepto vno atque altero, flore videlicet Pruni siluestris & Persici; quorum aquæ distillatæ aluum subducunt; &

Q7

hoc

hoc quia flores hanc vim obtinent : nam hi melius à Sole excoquantur , & subtiliores vires , quæ faciliè resolvuntur in vaporem , acquirunt. Sed quæ propriè solutiva vocantur , ut sunt radices , aut radicum liquores , aut succi , aut cortices , aut semina , omnibus inest tenaciter inhærens & viscosa qualitas. Ideoque eorum solutiva vis non potest ascendere in distillatione , sed manet in substantia decoctionis , ex ea evaporante quicquid est aqueum. Excogitata autem hæc est extractio pro delicatis & nauseabundis , ut qui magnam solutiui dosim non ferunt.

Ellebori nigri extractio. Cap. 11.

- RECIPE rad. Ellebori nigri recent. libras iiij. lauentur , dum sunt succo prædictæ : deinde incide minutim , ac superinfunde sequentis decoctionis colaturam.
- * Succi Buglossi , Borag. ana ℥ ij. Succo depurentur , & colentur diligentissimè , ut auri claritatem acquirant , & reponantur ad tempus conveniens.
 - * Deinde ℞. rad. Fœniculi , Cichoreæ , Asparagi , Petroselini , ana vnc. iiij. Fruct. Iuiubarum , Sebesten ana ℥ ij. Seminum
 - * Melonum , Cucumeris , Cucurbitæ , Citrulli , ana ℥ β. decoquantur secundum artem in aquæ ℥ xij. Colaturæ infunde prædictas

dictas l' iiii. succorum : deinde sine ebullire paululum ad ignem. Postea incisas & contusas radices Ellebori iniice, & coque lento igne paulatim, vsque dum radices emineant : deinde exprime rursum per filtrum. Colaturam coque ad Mellis crassitudinem, clementi igne, adhibita assidua cura, ne aduratur. Postea repone, & vtere; faciendo periculum in dosi, a scrup. semis se, vsque ad scrup. vnum.

P. C. SCHOL.

Sebesteniana § ij] Cum Gesneri editio ana § ij. legat, ego ex industria (si pondere metiendi sunt hi fructus) ex drachmis uncias feci, & legendas esse puto. alioquin cuiusque uncia una ad minus sumi debet. Cumque semina frigida ponderibus careant, ego cuiusque § ß. adscripsi. Si cui verò hac non placuerint, illi, ut suo more loca hac restituat, permittitur.

Extractio Rhabarbari. Cap. III.

R H A B A R B. electi l' j. minutim incidatur, & grosso modo teratur : postea affunde succi deputati Boraginis, Buglossi, *
ana l' ij. maceretur per horas xxiii. deinde coque ad lentissimum ignem, vsquequo extra emineat Rhabarbarum. Exprime postea fortiter, & expressam decoctionem per lencum colatorium trans mitte & expri-

exprime, vt substantia in colatorio maneat : colaturam coque ad mellis spissitudinem, adiectis Zacchari vnciis ij. Quidam in balneo Mariæ ad spissitudinem coquunt, ne aduratur; quod melius est; quemadmodum etiam in duplici vase. Purgando deglutiendum cum gutta olei Cinnamomi, aut Anisi mixtum, & azymo inuolutum; faciendo in dosi periculum à scrup. j vsque ad scrup. ij. Quidam, quia Rhabarbara per se non valdè purgant, acuiunt totam extractionem cum modico Diacridii optimi : quod nihil nocet.

De Extractione è Massis Catapotiorum. Cap. I I I I.

CUM virtutem solutiua ex massis pilularum extrahaturus es, necesse est, vt priùs diligenter dispensata sit massa, sumpta Aloë purissima, & aliis medicamentis electis. Deinde recipe quamcumque vol. eris massam, & concidas in minutas partes; ac macera per octiduum in aqua pluuiali, succorum Boraginis, Fœniculi ana q. s. Coque deinde in vitreo duplici vase per integrum diem : deinde exprime per laneum pannum mundissimum, qui nullos pilos emittat; & iterum in balneo vel in duplici vase ad iustam spissitudinem diligenter coquito, & forma pilulas minutas.

da

da scrup. ij. aut circiter vnum. Hoc modo extracta massa est purissima, tenera, & facile in manu liquefcit. Porro reliquorum purgantium medicamentorum vires similiter exprimi possunt. Sed animaduertendum, quod semper sint admiscenda in decoctione lenientes & lubrici succi, quales prædicti sunt: & melius multo est, vt omnia in duplici vase coquantur.

Aloë quomodo optimè lauetur.

Cap. v.

ALOEEN optimam, fuluam, pellucidam, facile in manu liquefcientem, confringe in partes minutas, & pone in patinam vitream, mundam: & iafunde desuper sufficientem quantitatem aquæ pluuialis: dissolue in duplici vase omnino, & permitte denuò refrigerari. postea aufer innatantes, si qui sunt, pilos; & sensim quod est liquidissimum ad spissitudinem in duplici vase coque Quod verò in fundo vasis est crassiusculum, in alios vsus seruetur.

PARS SECVNDA.

De Distillatione Oleorum. Cap. i.

QVONIAM Aromata quædam, & omnium ymbelliferarum herbarum semi-

femina ferè constant magna ex parte , calida, tenui & aëria substantia: ideò necesse est, vt aliquid de oleaginosa substantia habeant Nam talem habet mixturam prope modum omne oleum. At cùm oleum & pinguedo quæ in simplicibus medicamentis continentur, duplex sit, quædam monenda sunt. Naturę periti, duplex inuenerunt oleum in simplicibus medicamentis: vnum terrestre, crassum & viscosum, & totaliter suo corpori, in quo est, commixtum quale est oleum Nucum, Amygdalarum, Baccarum Lauri, Seminum Linî; Hyoscyami, Sinapi, Papaue-
ris; & omnia similia, quæ in fructuum aut feminum nucleis continentur. Hæc autem omnia propter totalem cum substantia cui insunt commixtionem inseparabilia sunt, nec vlllo modo per distillationem elici possunt. quare vi exprimenda sunt è substantia. Alterum tenue, aëriumque est, & separabiliter suo corpori inhæret: & hoc est segregabile. Ascendit enim facilè in distillatione, nec difficulter à suo, cui inest, corpore decedit. Tale autem est quod continetur in aromatibus, Carpobalsamo, Cardamomo, Pipere nigro, Cubebis, Cinnamonomo, Garyophyllis, Macere, Nuce moschata, Ligno Aloës. Item quod continetur in seminibus vmbelliferarum herbarum: quales sunt Ligusticum,

Ange-

Angelica, Angelica minor, Libanotis nigra, Magiſtrantia, Paſtinaca, Caros, Cyminum, Ammi, quod appellant Amomum: item Apium, Petroſelinum, Gingidium, Pimpinella, Aniſum, Fœniculum, Anethum, &c. Eliciuntur autem hæc olea per diſtillationem in arena, ita vt tuſa aromata aut ſemina iniiciantur in cucurbitam vitream luto inteſtam optimè: vna autem vice ad ſij. iniiciantur, & ſint trita ſecundum capacitatem cucurbitæ: inſundatur deinde ad vj. lib. aquæ clariffimæ, ac miſceto diligenter. Pone deinde cucurbitam in capellam aptam fornaci, & arena imple, & non attingat fundum, ſed interſit arena. Cucurbitæ impone alembicum vitreum, cuius roſtrum deſignat in ſtanneam vel ferream fiſtulam, ſtanno intruſ & foris illitam: ea fiſtula tranſeat in obliquum per vas quod habet in ſe aquam frigidam, vt inter diſtillandum egrediens cum oleo liquor refrigeretur. clauſe iuncturas accuratè, madefacta papyro vel linteo; & ſuppone exceptorium. Poſtea accende ignem lentum, & vide ne nimium ſurgat & ebulliat in alembicum, quod in cucurbita continetur. Semina enim quædam (vt Aniſum) propter raritatem ſubſtantię ſuę, ſimulque viſcoſum quod habent, largiter ebulliunt; idcò non ſtatim alembicum imponere debemus: ſed poſtea

postea quàm bullas excitari videris, & vaporem sursum ferri. Quod cùm fiet, depone alembicum, & immisso bacillo agita; ita resoluetur in vaporem spuma, quæ postea mediocri igne moderari, compesci & excitari potest. Quo facto, impone rursus alembicum, & circum lutato satis, ac distillato sine cessatione, donec conieceris nullum amplius intus contineri oleum: quod visu & gustu statim percipies: nam cùm gustu distillantes guttæ non amplius respicient iniectionis aromatis saporem, desistendum est, ne aroma fundo cucurbitæ inhæreat & exuratur. Deinde segrega cunctum in distillata aqua oleum optimum, quo potes artificio. Porro notandum est, quædam ex his oleis aquæ innatare, quædam fundum petere. Innatant Piperis nigri, & recentis Cardamomi, & Anisi: Fundum petunt, Cinnamomi, Macis, & Garyophyllorum, &c. ut videtur. Aqua Cinnamomi & Anisi cùm distillantur, lacteum habent colorem: & lacteum hoc paulatim in oleum conuertitur. Reseruanda autem Cinnamomi est aqua, præsertim quæ primò exierit.

Natura & vires Oleorum.

Cap. II.

FOENICULI & Anisi olea, naturam
mira-

mirabilem habent : nam in hieme vtrumque concrefcit inftar butyri , ita vt afpectu imitentur fperma Ceti ; præfertim Anifi. nam hoc æftate media concrefcit afpectu niueum : reliqua omnia liquida permanent. Reponuntur optimè in loco frigido & puro, præfertim Cardamomi & Piperis. Ea enim omnium tenuiffimam fubftantiam habent, adèd vt neglecta omnino euaneſcant. Vires autem habent earum rerum , è quibus extracta funt ; ſed multò effcaciores. Nam effcacia quæ vni libræ ineſt, in paucas drachmas contrahitur. Garryophylli enim vnciæ xvj. contrahuntur in vnciam vnam ſemis , aut duas : Cinnamomi in drachmas duas ſemis , aut duas : Piperis, in drachmas duas & ſemis, aut tres. Miſcentur autem in confectione guttæ x, vel xv, aut xx. libræ Succari pro delicatis : ſed infundendum eſt vltimò cum morſellis , quos facis , vel orbiculis, optimè miſcendo.

PARS TERTIA.

De Oleo Vitrioli faciendo. Cap. I.

OLEUM Vitrioli, quod à quibuſdam Oleum Vitæ appellatur, aut Melancholia artificialis, nihil aliud eſt, quàm

quàm aluminosa qualitas, & substantia ex Vitriolo per artem extracta, modicoque Sulfuri mixta. Nam ipsum Vitriolum, è quo fit, triplici constat mixtura, videlicet multo Alumine, modica Æruginè, & paulo Sulphure. Aluminosa enim aqua in metallis per Æris venas & Marchasitam distillans, æruginosam qualitatem acquirit, & Sulphuri, quod Marchasitæ inest, mixta, paulatim concrescit, ac industria ad spissitudinem coquitur: in distillando autem aluminosus & sulphureus vapor tantùm ascendunt, æruginosa qualitate infuso retortæ relicta; quo fit, ut hoc oleum Aluminis, & non Æruginis saporem habeat. Est autem duplex hoc oleum, nempe austrium & dulce. Austrium duplici constat mixtura, scilicet Alumine multo, & modico Sulphure: Dulce verò simpliciter Sulphure constat: Nihil enim aliud est, quàm liquidum Sulphur ex austero oleo extractum. Quapropter gustu nequaquam Alumen, sed Sulphur amulatur. Faciendum est autem utrumque maxima cura & diligentia; adhibitis aptis fornace, retorta, & receptaculo: siquidem aptitudo instrumentorum, ut aiunt Chymistæ, magistrum parit. Quapropter sequentes Canones diligenter observentur.

Electio

Electio Vitrioli. Cap. II.

CUM plurimæ sint Vitrioli species, operæ pretium est indicare, quæ nam species eius huic operi potissimum conducatur. Et quamvis omne Vitriolum hoc oleum reddat, nullum tamen est ex omnibus præstantius caeruleo aut viridi: quoniam plurimum fugitivi Sulphuris obtinet, quo adiuuatur, ut facilius oleum ascendant. Notandum etiam, melius esse facticio natium Vitriolum, & maximè Vngaricum: aut si huius copia non sit, Gossariense. Eligendum præterea est quod magnis racemis constet, & maioribus cubis concretum sit. Quod autem fractum minutum & puluerulentum est, veluti inutile, non est recipiendum; quemadmodum etiam quod Solis vel aëris iniuriâ candorem & puluerulentam canitiem contraxit.

Coctio Vitrioli. Cap. III.

AT quia Vitriolum multum in se habet aquei & excrementitii humoris, qui oleum diluit, & non nisi longo tempore & magnis molestiis per distillationem ab oleo separari potest; compendiaria est inuenta via, qua breui temporis intervallo id absumi queat, ne longa mora artifici fasti-

fastidium pariat. Recipe igitur prædicti Vitrioli ℞ij. conice eas in ollam magnam, nouam & optimè crematam: ollam impone fornaci profundæ, supra arduentes prunas. Cùm liquefieri & bullire cœperit, spatula agitetur, vt integrum liquefacto misceatur, donec & ipsum liquefiat. Bullire demum finito, vsquequo nullam prorsus bullam ampliùs excitet, & donec totum densetur. Deinde exemptam è fornace, cum Vitriolo ollam refrigerati permittito, loco neque humido neque ventoso, sed sicco & tepido. Postquam refrigeratum fuerit, ex olla eximito; & considera an superficies eius vndique rubescat. nam si rubescit, bonum est signum, & faciliùs calcinatur, vt iam dicemus.


Calcinatio Vitrioli. Cap. IIIII.

EXEMPTVM ollâ Vitriolum, in minutas partes confringe, & in mortario subtilissimè tere: deinde tertiam aut quartam eius partem in nouam ac benecoctam ollam conice, ac rursus in profundam fornacem, sicut antè, dimitte, & aliquamdiu vrito, donec rufus fiat color. Mox ollam ab igni depone; & moue eam, vt videas notam, an satis calcinatum sit Vitriolum. Nam si in olla fluctuat argenti viui aut liquefacti plumbi modo,

& exi-

& exilientes bullas eiaculatur, fatis vltum esse intellige: tunc effunde in magnam & recētem ollam, prius calefactam, & effluet quasi sit liquidum, aut ad modum argenti viui. Quod autem reliquum est Vitrioli, similiter sigillatim, vt calcineretur, vras. Cū vltum fuerit, commisce rursus optime in mortario; modeste agitans, ne puluerem excites, nares & fauces offensurum. Cū hæc omnia executus fueris, Vitriolum in balancem ponito, & animaduerte pondus ipsius. Nam si vj. lib. id est, medietas superfuerit, bene omnia facta sunt. Sed hæc sufficiant.

De fornace facienda. Cap. v.



MATERIA quæ distillanda est, quomodo præparanda sit, iam indicauimus. Nunc autem dicere de fornace, res & ordo postulat. nam si hæc inepta fuerit, frustra omnia fient. Extruenda igitur est fornax ex lateribus in planum positis, quo crassioribus parietibus ignis facilius & diutius contineatur: fiet etiam quadrata & æqualiter

R crassa;

crassa; intusque habeat propemodum duarum spithamarum latitudinem, non tamen omnino, sed dempta tertia parte spithamæ. Extruatur autem hoc modo: Prima & infima cauitas habeat altitudinem semipedis: cui per transversum imponantur ferramenta satis crassa, ut ignitis carbonibus non inflectantur: secunda cauitas, quæ est constituta supra ferream cratem [id est, *uber den rost*] habeat duum pedum altitudinem, & ex anteriori parte foramen, per quod carbones iniiciantur. hoc incipiat lateris transversæ crassitudine super cratem. Per mediam deinde cauitatem, in ipso medio inspicienti fornacem, per transversum infigatur ferreus axis, quadrangularis, crassitudine pollicis, qui impositam retortam sustineat. In latere deinde sinistro fornacis, relinquatur meatus, per quem retortæ collum exeratur.

Distillatio Vitrioli. Cap. VI.

POSTQUAM fornacem extruxeris, eligito retortam capacem, aptamque ante omnia, ex vitro Venetiano aut saltem Helliaco factam, prius undique luto obductam: in eam coniecito totum Vitriolum, ita ut aliqua pars retortæ relinquatur vacua, quò facilius à Vitriolo spiritus ascendere queant. Mox transversam & ferream
trabem

trabem in fornace optimè luto obducito; eiꝛue in medio superponito perlutatum testæ fragmentum : super id collocabis retortam , ne à candente ferro immediatè disseccetur , ita tamen , vt in medio fornacis retorta constituta sit, eiusꝛue rostrum extrorsum modicè prouum promineat , & meatus per quem collum suum è fornace exserit, diligentissimè luto farciatur atque obstruatur. Postea accipe quinque tegulas, & fac ex iis tectum supra fornacem ; sub quo lateat retorta ad eum modum quem depinxi. Tectum luto vndique obducatur, quatuor pro fumo foraminibus relictis, in singulis angulis singulo , ea amplitudine, vt crassissimus pollex liberè intromitti & exeri queat. Fac etiam quatuor conos ex luto , quibus foramina obstruantur : quo facto , applica retortæ orificio receptaculum grande ex vitro Venetiano aut Hefsiaco : quo enim maius id ipsum fuerit, eo liberiùs spiritus recipiet : si verò paruum fuerit , periculum est ne spirituum copia distentum rumpatur. Infunde etiam in retortam aquæ clarissimæ vnc. xvij. aqua enim citò spiritus ad se rapit , & prohibet ne confringatur receptaculum. Ita applicatum optimo luto diligentissimè obstruatur : magna adhibita cura, ne quicquam in receptaculum incidat ; tingitur enim inde in rufum colorem oleum. Cum

omnia hæc feceris, dimitte per integram noctem lutum exsiccari; ac si quæ fatiscunt rimæ, luto illinantur. Manè deinde perlucidum accende ignem, ex puris & magnis carbonibus; aperto vno superiùs foramine, per quod fumus exeat: augeaturque successiue ignis vsque ad vesperam; quo tempore aperiendum est secundum foramen: & attende diligenter an appareant spiritus, qui è retorta egrediuntur, veluti si quis candidum efflaret fumum. Nocte sequente vigili cura cauendum ne ignis remissior fiat, sed acrior, paulatim tamen. Ita deinde auctum ignem in vigore teneas: Ac altera die tertium aperi foramen; augèdo sigillatim ignem, vsquequo etiam retortæ collum candescat. Sequenti secunda nocte auge ignem; & post mediam noctem aperi quartum foramen. Cùm ita in summo vigore ignis fuerit constitutus, videbis spiritus egredi, veluti conglomeratas nubes: qui cùm cessare voluerint, aperi omnes fornacis aditus, & sine intermissione carbonesingere, vsquequo etiam receptaculum excandescat; studiosè cauendo ne quicquam frigidum aut humidum super retortam aut receptaculum incuria aut casu decadat. Agenda hæc sunt in loco clauso, quò neque imber, neque ventus ingrediatur. Conseruandus autem ignis est, donec nulli prorsus spiritus in

tus in Vitriolo relinquantur : quod visu facilè percipi potest. Cùm autem nulli ampliùs egredientur, sine vt per se extinguatur ignis : ac totum opus integrum cum nocte diem quiescere ac refrigerari finito. Postea aufer cum contento humore receptaculum; & repone, donec oleum ab aqua segregabis. Tum contrafactam retortam inspice, & vide an caput mortuum nigrum sit : hoc enim signum est perfecti operis. Est autem caput mortuum, exustum in retorta Vitriolum.

Segregatio infusa aqua.

Cap. VII.

QVONIAM in receptaculo continetur vnà cum Vitrioli oleo aqua, segreganda hæc est, vt Vitrioli liquor sincerus reponatur: segregatur autem per distillationem in balneo aut cinere subtili; tutiùs tamen in balneo: qua propter totum humorem qui est in receptaculo, in cucurbitam vitream Venetianam aut Hessianam infunde; (superponendo Alembicum è simili vitro factum;) quæ bene luto circumlinatur : sub balneo deinde accenso igne, paulatim sine aquam exstillare, donec habeas vnc. xvij. illas quas infudisti. Si Vitriolum non bene calcinatum fuerit, plus egredietur : quare vide vt prædictæ xvij

R 3

vnciæ

uncia fiat bonæ mensuræ. Cùm hoc feceris, refrigerari balneum finito, & aquam quæ distillauit abiicito. Quòd verò in balneo cucurbitæ in fundo reliquum fuerit, purum est Vitrioli oleum: habet tamen plerumque rufum colorem; ideo secundum sequentem modum rectificandum est, vt clarum fiat.

Rectificatio olei Vitrioli. Cap. VIII.

A C C I P E retortam Venetianam, aut saltem Hessiacam, antea luto optimo vestitam: in eam funde quod in cucurbita continetur oleum: retortam pone in minorem fornacem, in capellam quæ pura & lora arena repleatur. Et quemadmodum antea in balneo, ita nunc in arena distilla; paulatim ignem acuendo, vt sigillatim ex intervallo delabantur guttæ. Retortæ orificio applica receptaculum ex eodem vitro factum; ac commissuram optimè luto claude, ne quicquam expiret: cùm deinde totum è retorta distillauerit, refrigerari finito: ac postea aufer, & infunde sensim in purum vitrum Venetianum, quod habeat angustum orificium; ac repone, ceu præsens in multis morbis remedium. Hoc est austerum Vitrioli oleum, cuius vires & naturam nunc indicabimus, quas excellentes & efficaces habet.

Vires

Vires eius. Cap. IX.

M E R V M ac non dilutum, neque debet neque potest intra corpus sumi : nam propter nimiam acrimoniam, ignis modo interanea, & quicquid attingit, adurit: omnia nempe corrodit, præter vitram & pingua, veluti ceram, picem, seuum : & liquidorum etiam oleorum colorem immutat; præsertim olei Macis; cui si misceatur, sanguineum reddit colorem. Si etiam in duobus vasculis contineatur quantumvis frigidum, & repenti sibi ipsi misceatur, aded incalcescit sua sponte, ut manibus vix teneri queat. In terram effusum bullit, quemadmodum etiam para melancholia : quare etiam Melancholia artificialis appellatur. Quemadmodum enim melancholia, ita etiam hoc oleum ventriculum confortat, & ad cibi apperentiam inuitat ac stimulat; frigidum ventriculum calefacit, phlegma consumit; crassos & viscosos humores incidit, colicę ac dysenterię opitulatur, sitim ac feruorem interaneorum in febribus extinguit : singultum prohibet confestim, & nauseam ac cibi abominationem auertit. Sed temperandum est cum aliis quibusdam. Quare exemplum vnum atque alterum ponemus.

R 4

Aduer-

Aduersus Calculum.

℞. Olei Macis
 Olei Terebinthinæ clariss. ana guttas xij.
 Aquarum Anisi
 Fœniculi ana vnc. ij.
 Syr. Liquiritiæ vnc. j.
 Olei Vitrioli tres aut quatuor guttas.

Misce omnia optimè ; & gusta : si habet acetositatem, quæ dentes non in stuporem trahat, bene est ; si non est acetosa potio, instilla adhuc vnam aut alteram guttam, & consule palatum, ac propina securè.

Ad Ventriculum debilem.

℞. Syr. de Mentha vnc. j.
 Aquæ Cinnamomi vnc. iiij.
 Olei Cinnamomī guttas ij.
 Olei Vitrioli guttas iiij.
 Da securè.

Ad calorem & sitim in febris.

℞. Syr. ex Succo aut infusione Violarum
 vnc. j.
 Aquarum Cinnamomi vnc. j.
 Hordei vnc. iiij.
 Olei Vitrioli guttas iiij. aut iiij.

Misce,

Misce, & contrahet puniceum colorem, & saporem vini austeri Cinnamomo aromatizati.

Ex austero quomodo dulce fiat.

Cap. X.

ANTEA dictum est, Austerum Vitrioli oleum duplici constare mixtura, videlicet multo Alumine, & paucio Sulfure. Quare cum ex austero oleo dulce extrahitur, nihil aliud fit quàm, quòd Sulfur ab Alumine segregetur. Est itaque dulce Vitrioli oleum nihil aliud, quàm oleum Sulfuris aut ipsum Sulfur in liquidam substantiam redactum. Et hoc propriè oleum dici potest: est enim pingue vinctuosum-que, quemadmodum ipsum Sulfur, quod in oleo, & non in aqua liquefcit. Sequitur autem modus segregationis,

Modus segregationis.

Cap. XI.

RECIPE vini ardentis acerrimi & ter sublimati vnc. vi. Olei Vitrioli austeri tātumdem: misce in Veneto vitro, & pone in cucurbitam paruam, angusto orificio; & optimè luto orificium claude: dimitte ita per integrum mensem aut duos. Deinde effunde in cucurbitam cui sit immedia-

R 5 tè vi

te vi ignis agglutinatum & annexum
 alembicum, [hoc est, *ein kolb mit einen an-
 geselbten helm*,] cuius figuram subi-
 ciemus: pone deinde in parvam fornacem,
 ac dimidiam partem eius cinere obrue:
 postea applica recipientem, & luto iun-
 cturam claude diligenter, & extrahe vnc.
 vj. vini ardentis, quas infudisti. Ut verò
 tutius hoc fiat, pone in balneum Mariæ;
 sic solum vinum absque oleo ascendet.
 Cùm extraxeris autem per balneum infu-
 sas sex vnc. vini ardentis, pone id quod
 residuum est, in fornacem, ut arena me-
 diam cucurbitæ partem attingat, ac nouo
 & vacuo recipiente (eoque non magno)
 applicato, luto iuncturam diligenter clau-
 de. Accende deinde lentum ignem; & sen-
 sim extrahe omnem humiditatem quæ re-
 licta est in cucurbita, donec nihil humidi
 amplius in fundo appareat: adhibita sem-
 per maxima cura & diligentia, ut ignem
 ita modereris, ne ebulliat usque ad alem-
 bici canalem. Nam si hunc ebullitio atti-
 gerit, sedari non potest; nec prohiberi,
 quin in receptaculum egrédiatur, ac to-
 lum oleum corrumpat; solet enim facilli-
 mē ebullire. Cùm autem sensim extraxeris,
 aufer statim recipientem cum suo humo-
 re: tum videbis duo contineri in eo, vi-
 delicet aqueum humorem, & oleosum, ac
 pinguem. Segregabis autem vnum ab al-
 tero

tero statim, ita vt nihil aqueum in oleo relinquitur: nam aqua illa perdit oleum. Solet autē oleum ipsum plerumque aquæ



innatare; maxime si infusum prius vinum omnino per balneū extractum fuerit: sed statim poteris tactu discernere oleum ab aqua. Oleum enim pingue est, aqua minimè. Segregatū oleū deinde vsui re-ferua.

Einem Kolb mit einem angeschmeltzen helm, der muß man etlich auff der Glaschutten bestellen zu machen, auß zerbrochnem Venedischem glasz, oder auß Hessischem glasz.

Vires eius quod segregatum est.

Cap. XII.

VIREs habet quascumque & Sulfur: sed omnia efficacius præstat; quia propter liquiditatem facilius penetrat, & ad actiones properat; quod Sulfur non potest, quia impeditur a soliditate & spissitudine sua, quo minùs penetret. Illud verò

R 6 ampliùs

ampliùs potest Sulfure hoc oleum, quòd
 valeat potenter ad omnes in corpore pu-
 trefactiones, & præcipuè ad pestem. Ad
 * educendum è pulmone in pleuritide, &
 peripneumonia, & difficili tussi, pus, &
 crassos viscososque humores: tutò enim
 absque omni periculo intra corpus su-
 mitur. Calculum neque in renibus, neque
 vesica coalescere finit: exulceratam vesi-
 cam sanat. Dosis eius est vna aut altera
 guttula, aut tres, in vino modico tempe-
 ratæ. Miscetur etiam rotulis & morsellis
 è saccharo factis. Diligenter autem reser-
 uandum est. Nam modicum fit ex lib. j.
 austeri olei Vitrioli, & facilè propter te-
 nuitatem partium euanescit.

F I N I S.

E P I-

EPITAPHIUM
VALERII CORDI,

qui
sepultus est Romæ, in æde D. Mariæ
de Anima, regione Parionis.

VALERIO Cordo Simesusio Hef-
so, Euricii filio, moribus, ingenio,
comitate præstantiss. Doctorem omnium
admirationem merito: Qui naturæ ob-
scuritatem & herbarum vires adoles-
cens senibus explicavit: Cùm expleri
cognoscendi cupiditate non posset, per-
lustrata Germania, Italiam adiit, Ve-
netiis in honore habitus, & Romam
vix ingressus, subito morbo inter ami-
corum lachrymas, non recuperabili stu-
diorum iactura, opt. etate extinguitur,
anno salut. M. D. XLIIII. VII.
Calend. Octobr.

Ingenio superest Cordus; mens ipsa recepta est
Cælo: quod terra est, maxima Roma tenet.

APPEN-

APPENDIX
EX SCRIPTIS
D. IACOBI SILVII,
MEDICI PARISIENSIS,

pro instructione Pharmacopolarum;

DE
SINGVLORVM MEDICAMENTORVM
SIMPLICIVM

exacto Delectu , Collectionis tempore legitimo , Repositione commoda , & Duratione eorum.

DE RADICIBVS.

RADICES euellende sunt , cùm medicamentoſe ſunt maximè. Quæ dos omnibus eodem non ineſt tempore , ſed alio alia vegeta magis ſunt : quamquam ſunt qui putent omnes radices legendas Autumno , ubi folia deciderunt : alii Veris initio , priuſquàm in folia aut caulem erumpant. Omnes tamen integra ſunt , ſi fieri poteſt , vellenda , & vnaqueque in ſolo & celo natura ipſius maximè familiari, bene nutrita , bene habita , non præ alimenticopia enormes , neque ob inopiam ſtrigoſe , tennes , rugoſe : mox aqua lauanda , & radiculis por-

portionem quamdam alimenti repetentibus, & stolonibus etiamdam trahentibus, purganda: post (nisi utendi recentibus aliqua inciderit vel commoditas vel necessitas) siccande, quedam umbra & vento, ut Apii, Foeniculi, Iridis, & que alia sunt vel minores, vel sicciores, vel rariores, quarum vires sol seu ignis promptè dissipet: quedam contraria dictis sole & vento, vel igni siccantur, si calum est nubilum, aut hiems: & sapè versanda, ne mucida aut putride fiant: ut Bryonia, Gentiana, Mandragora, Rheum Pontici. Si virò siccatis citò est opus, patille ignita impositas sapè versando siccabis. Quedam item integra siccantur, ut Gentiane; alia in talcolas dissecta, ut Iridis; alia lignosa matrice (sic enim cor Plantarū Gazæ ex Theophrasto vocat) adempta, ut Foeniculi, Petroselinum, Apii. Deinde reponuntur loco non insolato, non infumato, non humido, non puluerulento, sed sublimi, puro, sicco, aut septentrionem, aut potius meridiem spectante, præsertim quando hunc planta quedam adhuc humidiores requirunt, modò non sunt austri. Eadem quamdiu vegeta adhuc sunt, servanda; parva scilicet ac tenues & rara, ut Asari, Asparagi, anno tantùm, quamvis Elloborus uterque etiam triennio servari possit, ut magna & crassa essentia prædita, Bryonia, Rheum Ponticum, Aristolochia, Gentiana. Hæc autem tria, colligendi tempus legitimum, repositio commoda, & duratio, non in radicibus solis observanda sunt,

sunt, sed etiam in aliis plantarum partibus, atque adid quibusdam animalium aliquorum partibus, ut sanguine hircino, hepate lupi, pulmone vulpis, vesica apri. Propterea Chamaepityn, Chamedryn, Thlasspi, Cētaurium, Polion, Hypericum, aliāque florentia capiebat Galenus, Theriacen vel aliud medicamentum compositurus, non solo æstivo siccata, neque dum fructus eorum adhuc crudi & imperfecti sunt. Iubet idem continua speculatione cognoscendum, quando fructus sunt futuri, quando eduntur, quando augentur, quando denique vigent. Quo tempore potissimum eos commodè decerpas, & in siccis domunculis repositas custodias, ne à solis radiis urantur, neque humiditate à tecto vel muris madefiant. Ob id domo non vult subterranea eos reponi, nec aliis vicina, neque sub tegulis, sed horum media, qua ostia meridiem spectantia habeat; prope qua tamen medicamenta vo reponas. Omnia igitur legenda, quando summarum sunt virium; & accusandi cum mercatores tum herbarii, qui radices, liquores, succos, flores, germina, fructus extra anni tēpus carpunt, & in urbes conferūt. In quibusdam & astrorum observatio valere putatur. Paonia enim radix ad epilepsiam legēda decrecente Luna quibusdam videtur, & Alysson sub astra Canicula vult legi Galenus, ut Æschrion caneros fluviatiles capi cōtra rabiem, unde est herba nomen, Ἀλυσον, tanquam vis quadam illis contra rabiem à sidere accedat, rabiem

rabiem canibus afferente. Plantas item calidas ex calidis regionibus, & ex harum editis & siccis locis, ut Creta montibus, praeferit Galenus.

DE HERBIS.

QUAE prius in Radicibus dicta sunt, de collectione, repositione, duratione illarum, ad Herbas etiam transferri possunt, nisi quod his ferè recentibus utimur, quibusdam omnino, ut Portulaca, Lactuca, Buglossa, Atriplice, Beta, Brassica, Acantho, Nasturtio, Helixine, Mercuriali, Viola nigra, Intubo, Fumaria, Hyoscyamo, Mandragora, & aliis per multis. Quibusdam verò recentibus utimur, quando his mitioribus opus est: ut Ruta, Mentha, Absinthium, Abrotonum, recentes minùs calent, ob mistam humiditatem excrementosam; siccata verò calidiores sentiuntur; & Fumaria recens minùs aluum subducit, magis sicca.

Colliguntur ferè cùm floribus Herba, aut seminibus: sic Benedictus Carduus, Acanthium putatus, Centaurium paruum, Calaminthe, Chamadrys, Chamapitys, Daucus, Fumaria, Maiorana, Polium, Pulegium, Origanum, Serpyllum, Thymus: aut saltem cùm vigent folia magnitudine, odore, colore, praesertim qua cacumini sunt propiora.

Siccantur in umbra magis, nisi si qua scapo sunt crassiore, aut folio humidior, & ob id apto
pure-

putrere. Vbi probè sunt siccata, reponuntur vti radices: sed minùs diu seruari possunt; ob id quotannis mutanda.

DE FLORIBVS.

Flores, ut plantarum partes reliqua, legantur cum maximè vigent, ut Capparis in gemma, Rosa expandi cœpta: reliqui ferè aporti; sed haud ita pridè, & ex quibus vis nondum exhalauit. Siccantur sole magis, minùs, pro varia ipsorum natura. Quidam siccandos volùt, donec ex ponderibus decem unicum supersit. Reponuntur, vt alia: Quotannis mutantur, quamuis Schœnanthos etiam decennium efficax seruari possit: Chamamelum item diu vegetum est, ob forsem partium suarum missionem.

Flores & omnia quæ iucundum odorem efflant, arculus tiliaceis nullo situ obductis reponuntur.

DE SEMINIBVS.

Legenda sunt Semina cum sunt matura, & fructus quibus includuntur, maturi. Maturi autem sunt, cum simile possint procreare, vt Aristoteles libro de Affectibus mistorum docet. Semina verò quotannis mutare prestiterit, etiamsi pleraque diutiùs seruari possint.

Vt rectè perennent, charta aut foliis aptè involuantur.

DE FRV-

D E F R U C T I B V S.

Fructus ut maturi decerpantur necesse est.

D E C O R T I C I B V S.

Corticis ut recondantur, eximere conuenit, cum herba suis foliis exsuntur. siccantur etiam expurgata inibi, locis asperginem non redolentibus. Sed cum luto aut puluere sunt obsita, aqua elui debent.

D E S U C C I S.

Xυλός, id est, Succus ex plantis totis vel plantarum partibus concisis & tuis, torculari vel manu, vel aliter expressus, aqua interdum aspersa aut vino, aut liquore alio, vel recens usurpatur, vel vase aut loculamento aliquo reponitur: bicq; vel liquidus, vel siccus. Liquidus item aut per se seruatur, ut Vinum, Acetum: aut misto sale, ut Omphacium, Oleum: aut superfuso phiala oleo, ut Succus Rosarum, Granatorum, Limonium, Cydoniorum, Sambuci, Ebuli, & similium: aut sole, ut ustatéve, aut igni per se siccatur, ut Succus Glycyrrhiza, Opos Cyrenaicus, Scammonium: aut collatione cum melle, vel saccharo ad iustam crassitiem facta sole vel igni, ut in plurimis syrupis audies. Qui verò succi sine melle aut saccharo reponuntur, plurimum corrumpuntur,
nisi

nisi igne diutius cocti, aut sole aestivo usque ad mediocrem crassitiem siccati fuerint. Eodem temporis spacio sicciores euadunt, pluribusq; annis seruati, eò siccitatis veniunt, ut Balsusticis similiter leuigari possint: quales sunt succus Hypocisthidis, Vna acerba, Glycyrrhiza, Centaurii, & alii propè omnes. Qui verò ex his lentorem quendam naturæ habent, dilatantur magis quàm leuigentur, nisi siccioribus nullis mixta horum parua portio Portulacæ, Semperuiui, Cotyledonis, & aliarum similiter glutinosarum succus, præ lentore nimio per se non potest exprimi: quare cum Omphacio probè trita herba exprimitur: alii tritas igni lento calefaciunt; alii tritas loco frigido, ut cella vinaria, vimineo vasi impositas in catinum subiectum destillare permittunt. Χολῆς etiam, idest, succus, sæpè cum humore aliquo extractus ex partibus plantarum, ut semine Psyllii, Cydoniorum, Lini, Eæ-nugraci, lentorem aut velut cremorem & mucorem significat: unde dictum est emplastrum διὰ χολῆς, idest, de glutinosis quibusdam succis; diuersum tamen ab eo quod est de mucilaginitibus; ut in compositis leges.

Liquidis medicaminibus densior materia argentea, vitrea aut cornea conuenit. Filicis etiam, si modò rara non sit, accommodatur, & lignea, præsertim è buxo: sed anea vasa oculariis medicamentis liquidis q̃, &c.

DE LACHRYMIS.

Δ'Α'κ'ρ'ο'υ, id est, lachryma, seu humor ex planta sponte sua defluens, siue in gummi aquea res concreseat, siue in resinam liquecat oleagina eius substantia. Arborum partibus, praesertim truncis à germinatu incisiss & scarificatis, etiam resinas eligimus. Accensis autem arboribus resinosis, ut Pinu, Picea, Larice, Terebintho, Teda, Cedro, ex resinosa substantia igni parum siccata fit Pix liquida: cui quod supernatat, Pissanthum tenui consistentia & facultate est adstringente; ob id canittem sine ulla noxa tardat, ut Pisselaum, id est, Pix liquida, cum oleo mista. Galenus lib. 1. comp. ph. part. Pissasphaltus autem est Mumia Serapionis. Si Pix iterum coctione siccetur, Palimpissa dicitur, sicca adeò ut puluerisari possit, qualis est Graeca, etiam Colophonia, & Hispana, & Gallica dicta. Π'ι'ο'ζ'α Β'ε'ν'τ'ι'α lib. 8. comp. pharm. part. & Dioscoridi probatur & Lycia. Est etiam Dioscoridi ex iisdem arboribus resina liquida & sicca. Resina omnis calefacit, siccatur: tenuium est partium, magis minus.

DE ANIMALIBVS,

ET EORVM PARTIBVS.

Sanguinis Hirci quadrimi, bene habiti, aliquamdiu nutriti vino albo, Fœniculo, Seseli, Lauro

Lauro, & ceteris calculum frangentibus, *Augusto* mense iugulati, medius effluens (nam primus tenuior, postremus crassior putatur) vase vitreo receptus, testus linteo raro, Sole siccatus, etiam cum *Myrrha*, foliis *Lauri*, & similibus, calculum potenter frangere dicitur, *Tralliano*, *Auicenna* & ceteris practictis.

Adipem & *Medullam* stanneis vasis recondi conuenit.

Medulla loco sicco & edito, & *Septentrionem* spectanti reponitur, cum foliis *Lauri* siccis, ne putrescant, aut situm ducant; qua iniuria in locis humidis *Meridiem* spectantibus eis accidit: sunt qui reponant *bisariam*, *Adipem* modo.

ADVLTARIA

SIMPLICIVM

MEDICAMENTORVM.

A *Cacia* succo & carne *Prunorum* agrestium representatur, dolo parum malo, cum utraque viribus conueniant.

Aloës crasse partes & impure, lotionem separata, aqua marina & *Croco* *Mesue* adulterantur: sed *Croci* odor dolum aperit. Alii *Aca-*
cia, alii *Gummi* immiscendo adulterant: tunc minus est ad minima friabilis; & odor & sapor est alius.

Ambra,

Ambra, pulvere Ligni Aloës, Syraciæ, Ladanii, *Ambra largioris*; Moscho in aqua Rosarum soluto. Sed hac manuum attritu multo, cætera, mollescit; vera non mollescit. Platearius.

Amomum, planta Amomide simili, sed inodora, ex Armenia delata. Seminis dissimilitudo vitium detegit.

Asphaltum, id est, Bitumen Pice mislum, Dioscoridi; licet adulterari non posse, ut neque Carpopalsamum, neque Xylobalsamum, scribat Gal. lib. 7. Antid.

Ærugo multis modis adulteratur Dioscoridi: sed hodie sincerior videtur. Si adulteratam suspiceris, notas ex eo repele.

Æris flos, limata aris scobe.

Bdellium adulteratur Gummi. sed ita vitiatum, minus est amarum, & suffusus odoratum: Dioscorid.

Balsamum, id est, Opobalsamum, vitiatum Terebinthinâ paucâ Opobalsamo mista, vel sine hoc Croco Orientali, & succo foliorum Cetri, vel oleo Nardino. De quo in Opobalsamo plura leges.

Bitumen adulteratur Pice, ut in *Asphalto* dixi.

Castorium variè adulteratur. Vitium autem faciliè deprehendes, attentus notis quas in vero & laudatiore Castorio diximus in partibus animalis medicamentosis.

Costus, radice prædura Helenii Comagenii:
sed

sed odor Helenii minùs vehemens, neque caput tentans; & sapor minùs acer, quàm Costi.

Crocus misto Crocomagmate iuso, flore Cnici, vel oleo & pulvere Bersilii, ut vocant: qui fricando dolum detegit, vel sape sublitu: & Lithargyro, vel plumbagine, ad pondus augendum. Virumque minùs odore vegetum est: prætereà hoc est puluerulentum. Adulterati quoque Crocicolor & odor celeriter evanescent, veridici permanent. Galenus primo Antidot.

Casia odorata, corticibus Capparis & radicis Tamaricis mistis.

Caphura, gummi Juniperi: sed hoc est minùs odorum, & durius: illa est friabilis, & odore valentiore. Platearius.

Garyophylli vestutate exanimati, vino pulverem optimorum Garyophyllorum habente irrigantur, siccantur: foris solum Garyophyllos olent, & vix ad dies decem: molliores sunt integris.

Carpobalsamum adulterari semine Hyperici simili, quod Petrâ Palæstine oppido affertur, auctor est Dioscorides. Adulterari tamen non posse, affirmat Galenus 1. Antidot.

Euphorbium lacte hœdino, Sarcocolla & Glutini missione conspurcatur. Experientia veriest difficilis: nam Euphorbium leni gustu os diu accendit, ita ut omnia gustata Euphorbium respiciant. Idem iniectum igni odorem edit fastidium, Dioscor.

Ebur vstum (quod cur Spodium vocet vulgus,

gas, non video) ossibus canis ustis, vel albo marmore usto: id verò gravitate proditur, illud forma ossis, & linearum desiderio.

Galbanum mutatur Resina, Farina Faba-
rum excorticatarum, Hammoniaco, Dioscorid.
ex cuius notis sincerum deprehendes.

Galanga acris Cypero Europeo insipido, vel
salso; vel Bistorta, ut vocant, radice auste-
ra: si verò dicta radices aceto pulverem vera
Galange & Piperis habente biduò macerentur,
foris solum Galangam referunt. Platearius.

Ladanum, stercore Caprino, & pulvere ni-
gro. Id autem tractando non mollescit, sed in
pulverem abit, modo Ladani vetustate exsuccit.
Viribus præterea & odore Ladani caret, quod
sic vitiatum est.

Laser omne antequam siccescat, adultera-
tur Sagapeno, aut Faba lomento: sed malefi-
cium deprehenditur colore, odore, sapore, dilu-
tione, Diosc.

Lycium quibusdam Amurca, Succo Absin-
thii, Felle Tauri: sed id à viribus sinceri mul-
tum recessit.

Lemniacam terram sic adulterant, ut nemo
veram à falsa possit discernere: sic & Lycium
Indicum, & plurima alia, ut verorum no-
ta à falsorum notis non exactè discerni possint.

Ligustici semen adulteratur semine quodam
simili; quod facile gustu discernitur, amarum
enim est: alii semen Fœniculi aut Seseleos admi-
scentes, Ligusticum dolo viciant.

Lentiscina resina, id est, *Mastiche*, *Turis* & *Resina Pinea nucis* mislura.

Moschus pelliculis incisis, pulvere carnis *Columbina* siccata, sanguine *Hadino*, & pane asso. Si eius certum pondus pelui madenti impositum aliquamdiu sit grauius, est legitimum; si prius pondus seruat, suppositicium.

Manna Arabum, *Saccharo* & *Folliculis Sen-*
nae.

Myrrha adulteratur gummi macerato in aqua, in qua *Myrrha* maduerit, *Dioscorid*.

Nardus adulteratur *Stimmi*, seu *Stibio* cum aqua aut palmis vino inspissationis ponderisq; causa inspirato.

Nardus Celtica adulteratur imposita herba simili, quae *Hirculus* ab odoris grauitate vocatur: sed herba candidior, sine cauliculo, minoribus foliis; radice nec amara nec odorata, uti vera *Nardus* est.

Opi omnes adulterantur addito *Sagapeno*, antequam inarescant, colore: odore, sapore dolus apprehenditur; & quia cum aqua vel salina non mox soluuntur adulterata. Adulterantur etiam *Furfure* & *Farina*; precipuè καυδίας, id est, qui ex caule defluit, quia dilutior; ριζίας verò, id est, qui ex radice perlucidior & purior. Quauis enim radice incisa aut caule, quod effluit crassum & lentum, ὀπίς, id est, *Liquor* dicitur, lib. 6. simpl.

Opium, semine *Lactuca agrestis*.

Opopanax, *Hammoniaco* aut *Cera*: tunc in aqua,

aqua, si digitis teratur, non soluitur, nec lactescit
viti sincerum. Diosc.

Os ex corde ceruicartilaginosum, simili ex
maiorum animalium [praesertim bonis] corde.

Opobalsamum tam variè adulterant & ostu-
tè, ut eius adulteria etiam exercitatissimos fal-
lant. Hac verò adulteria inuulganda non cen-
seo, ne maligni etiam vitient à nobis edocti. Vi-
tiatur misto unguento cerebinthino, lentisci-
no, cyprino, balazino, susino, metopio, melle,
vel Cypria cera liquida: sed maleficiū facile
deprehenditur. Nam verus liquor in velleū la-
neam fusus, maculam non facit, & post lotio-
nem notam non relinquit, cum vitiatum inha-
reat. Adhuc merus, lac, si instillatur, congu-
lat; & in aqua aut lactè celerrimè liquatur, &
colore lactescit. Alias quasdam notas apud eun-
dem & Simeonem, si libet, legeris potius, quàm
apud barbaros hoc seculo adhuc legi solitos, pro-
funda hominum ignorantia, & magno mor-
talium incommodo.

Piper longum fraudulenter preparatum, est
herba quadam flava, quæ à Xene afferitur, aspe-
ctu quidem, non autem gustu, Macropiperi si-
milis: hæc autem aquâ irrigata soluitur; na-
tium Macropiper insolubile permanet, Gal.
lib. 1. Antidotorum. Piper longum verum ex
Barbaria afferitur: adulteratum verò duplex
est; alterum, quod in Alexandria maximè con-
ficitur; alterum herba cuiusdam germen.
Quod falsiciū est, si per diem totum in humo-

re maceretur, illicò liquatur ac soluitur, lib. 4. sanit. tuend. Illud fortè ex massa subacta aqua, in qua dissolutum aut maceratum sit Piper, & in formas effictas coniecta, pòst siccata. Vidi etiam adulteratum ex germine & velut nucamento Betula & Coryli.

Pastilli Theriaci, ex radice Pentaphylli, id est, Tormentilla, Venetiis malè componuntur, non ex Viperarum carne. Hermolaus in Coroll. Musa.

Phu, radice Rusci admista vitatur: sed maleficium facilè deprehenditur: quia hec dura est, frangi contumax, & sine ulla odoris gratia.

Pompholyx, taurino Glutine, ouillo vel Marino pulmone, aut Grossis, vel quibusdam aliis crematis.

Pentapetalon, Pentaphyllon. Polium, nihil simile habent in plantis; ob id non adulterantur.

Rha-Penticum, radice Centaurii magni. Rhabarbarum examinatur maceratum aqua diebus quinque, postea siccatum idem minus in crocum tingit, intùs nigricat, varietatem in fracturis amisit; densius est, astringit magis: ex aqua verò illa siccata trochisci fiunt regibus,

P' hoc cùm viget ac integrum est, valenter astringit, densum est ac contractum tota substantia; tamen celeriter perforatur. Incola regionis in qua gignitur, coctione vires eius in aquam trahunt; deinde Rheum siccatum, tamquam

quam integrum sit, nec coctum, transmittunt: sed utrarum est & laxius integro, nullam aut minimam astrictionem retinens. Quantum aliu notis Rheon à Rhabarbaro differat, alibi diximus.

Sagapenum, succo Laseric & Galbano, Diosc. id non liquefit, sed verum vino vel aqua affusa statim dissolvitur, Galen lib. 1. Antid.

Sarcocolla pulverizata est suspecta adulterii, Diosc. à quovis pulvere misto: integra eligatur.

Syrax modis multis Dioscoridi adulteratur: sed dolus facile deprehenditur notis ab eo dictis.

Santala lignis aliis; Rubrum Bersilio inodoro; Flavum & Album ligno Cedrino odoratior, linguam calefaciente.

Scammonium lacte Tithymali & Sarcocolla, vel Erui farino, tunc linguam minùs valenter pungit & mordet.

Saccharum, intùs faculentum aut spuma succi Cannæ eius autum: tunc in ore vanescit, & fractum nigricat.

Turbith, Gummi dissoluto quibusdam radicibus extremis illito: verum autem si frangitur, guminosum est intùs.

Tamar-Indi Prunis adulterati non splendent, humidiores sunt; sapore & nucleo Prunorum multum à semine Tamar-Indorum diverso.

Tui, Pini Resinâ, & Gummi. suffitum autem Gummi flammam non edit, Resina autem

in fumum vanescit; Turis statim ardet. Odore etiam maleficium proditur.

Turis cortex, Pini aut Nucis. Pinca cortice: horum tamen index ignis: nam reliqui cortices suffusi, quamquam incenduntur, sine odore fumant; Turis verò cortex ardet, & odorum fumum edit.

Turis manna, adulteratur cribrata Pini Resina, aut polline aut cortice Turis contuso: sed hac igne deprehenduntur.

Hac abundè fuerint, ei praesertim qui verum simplicium sincerorum notas, ex nostro libro simplicium primo accuratè didicerit. Nam cum rectum sui & obliqui sit index, ut initio secundi docuimus, & in unoquoque rerum genere quod perfectissimum est, idem sit simplex ac unicum: id si cognoveris, alia ei congeneria, aut etiam arte affinia, nullo negotio secreveris.

SIMPLICIS ALICUIUS NOMINE ABSOLVTE SCRIPTO, QVID ACCIPIENDVM.

IAM tradamus Simplicis alicuius nomine scripto absolute, & sine determinatione sexus, coloris, magnitudinis, figura, loci, temporis, vel notarum probitatis aliarum, vel partis eius simplicis, radicum, foliorum, florum, seminum, &c. quòdnam sit eligendum: nam
pro

pro variis scopis varia, sed in scopos efficaciora delizimur: Quam in rem te iuuabit nostra Simplicium per locos communes descriptio. Quae enim radicibus foliis sunt efficaces, planta, illarum nominis radices veniunt: quae foliis, floribus, fructibus, seminibus, cortice, ligno, liquore, succo, gummi, sunt utiles ac medicamentose magis, dum planta nomen offertur, partem eius usurpari solitam elige. Quum vero pluribus sui partibus ad res etiam varias valent, quibus sit opus, coniecta ex partium illarum facultate & affectus natura, & medicamenti constituendi forma: ut Ammi, Anisum, Apium, Carum, Cnicus, Cuminum, Gith, Libyficum, Nasturtium, Psyllium, Seseli, Staphisagria, semine sunt praestantiora; idq; solum illarum nomine intelligendum: in aliis multis similiter.

Anisum, Cretense, lib. 4. sanit. tuend.

Agnus, [seu Vitex] id. est, flos eius aut semen, licet folia etiam sint utilia.

Agaricus, albus & femineus.

Aloë, id est, succus eius, Aloë Indica, lib. 9. simplicium in Diphryge.

Alumen, scilicet scissile, quia praestantissimum, lib. compos. pharm. gen. primo.

Acetum, ex vino, non hyaromelite, vel cerenifia.

Aristolochia, pro repropofita explicanda est: rotunda enim cum multum tenuare crassum humoram, tergere ulcera, digerere ex utero; longa

autem, cum mitiora hac volumus. Clematitiū autem, quia fragrantior, in unguentis expetitur.

Amomum, Scythicum lib. 8. comp. pharm. part.

Ammi, Illyricum, lib. 9 eiusdem; Ægyptium alii laudant.

Balsamum, Opobalsamum potius intelligendum, quàm Carpobalsamum aut Xylobalsamum, lib. 2. comp. pharm. part.

Bryonia, alba, quia efficacior, quàm nigra.

Buglossum utrumq, foliis & flore efficacius; radice tamen non inutile.

Casia vel *Cassia* in libris Græcorum. *Cassia* syrix optima, & *Cinnamomo* viribus & toto habitu finitima. In libris Arabum eadem *Ligna* dicitur: altera verò, *Fistula* huc dicta, ponitur, cum medicamentum est purgatorium.

Cardamomum, maius.

Capparis, cortex radice.

Centaureum, Minus, in purgantibus medicamentis; in ceteris Maius, dictum à facultate multiplici & efficaciore.

Calamiathe, montana, quia efficacior quàm domestica.

Costus, amarus, cum subamarus & valdè acer solum nominetur; dulcem tamen nescio quem Arabes inuexerunt.

Cypressus, id est, nuces eius, in adstringentibus medicamentis: lignum aut folia, in diureticis.

Cinna-

Cinnamomum, optimum; de quo in simplicibus abundè.

Corallium, rubrum.

Cuminum, *Æthiopicum*, lib. 4. sanit. tuend.

Daucus, agrestis; nam sativus *Pastinaca* est, alimentum veriùs, quàm medicamentum.

Elleborus, niger *Mesua*, quia salubrior: albus *Galeno* *Aph. r. lib. 5.* Obserua igitur an compositio sit *Arabica* aut *Græca*. *Elleborus* uterque & *Helenium* ex locis editis præstant.

Eruca, siluestris, quia efficacior hortensi.

Epithymum, *Atticum*, melancholiam ex ventriculo purgat: id in *Græcis* compositionibus usurpandum; in *Arabicis* *Arabicum*.

Fœniculus, semen; sed in collyriis succus foliorum aut radicum.

Galla, solida efficacior, quàm perforata.

Gummi, *Arabicum*; id enim omnium perfissimum, vel *Plinio* auctore.

Gluten, *Mastiche*, ceteris *Glutinis* efficacius, ut vitrum etiam glutinet, quibusdam intelligitur aliis *Ichthyocolla*: aliis *Taurocolla* magis placet *Glutinis* nomine.

Hyssopus, montanus hortensi melior, ut *Calaminthe* montana efficacior domestica. *Hyssopum* *Colicium* *Diosc.* *Creticum* verò *Archigenes*, apud *Galen.* lib. 8. comp. pharmac. part.

Hyoscyamus, albus, seu album eius semen:

quod tamen interdum exprimitur, frequentius tacetur.

Iris, radix *Ireos* *Illyrica* veteribus, nunc pharmacopolarum *mignaniâ* *Florentina* usurpatur, cum illa per Venetos facile haberi queat.

Lupinus, amarus: nam dulcis esculentus est; vtille, amaritudine per macerationem in aqua deposita.

Lactuca, semen; præterquam in victus ratione, ubi herba potius intelligitur.

Lapathum, *Oxylapathum* efficacius rotundo.

Lithargyros, *Auri*; tamen *Lithargyros* *Chrysitii* aliquoties in lib. comp. pharm. Gal. legitur.

Mastiche, *Chia*, lib. 7. meth. & alibi passim. *Ægyptiam* tamen ac recentem, ob id pinguiissimam laudat lib. 2. ad *Glaucōn*.

Marrubium, album præstantius nigro.

Mel, apum: alterum, aëromeli seu mel aërium & roscidum.

Margaritæ, solidae meliores perforatæ; nisi etiam sint flavae, obscuræ, solidis pares.

Medulla, si non additur cuius animalis, & valens futurum est medicamentum, ceruina miscenda, valentior quam vitulina, lib. 6. comp. phar. part.

Nuclei, pini, oliua; dactyli autem *Auicanna*.

Oleum, oliuum, ex oliuis expressum.

Opium, *Thebaicum*, *Galenus* lib. 7. simpl. & post eum omnes.

Petro-

Petroselinum, *Macedonicum*, & in hoc *Attracticum*, & huius semen maximè in usu est, lib. 8. comp. phar. part.

Pruna, si alius delicienda est, *Damascena* & *Hispana* seu *Iberica*, hodie *Augustana* & *Cathalaunica* *Italica* dicta, sunt multò præstantiora, vel si qua his similiter sunt pinguis, dulcia. Si ad cohibendum & astringendum sit medicamentum, *Damascena* immatura, vel potius quæ *Iorana* nobis dicuntur, *S. Iuliani* & *Turonica*.

Papauer album, semen.

Piper, album, quia acrius, & linguam magis purgit, quàm nigrum, à quo per adustionem uis exhalauit, Gal. lib. 8. simpl. sed album id maturum intellige. Nam album ex *Macropipere* in racemum granatum debiscens, recens factum, minùs acre, & *Macropiperi* facultate proximum, quale apud *Scrapionem* est accipiendum.

Pix, liquida in suppurantibus & tergentibus: sicca, in siccantibus unguentis epuloticis & glutinantibus, Gal. lib. 7. simpl.

Paonia, mas, seu eius radix vel semen: *Marnardus* etatis nostræ medicus longè doctissimus in *Epistolis*.

Polypodium, quercinum uulgò usuratur: murale, & à saxis præteritur cum *Narbonensibus* quibusdam, quod frequentissimum, & pro quercino omnes vendunt, nisi si quando adstrictione opus est: qua ratione *hederam* quo-

que quercinam nonnullis expeti audio.

Quatuor { Malua
excellentia: { Alibaa
 { Viola nigra
 { Acanthus, id est, Branca ursina.

Quatuor { Frigida { Maiora: Melonũ, Cu-
semina { { cumeris, Cucarbita,
 { Citrulli.
 { Minora: Lactuca, Portu-
 { laca, Inthubi, Cichorii.
 { Calida { Maiora: Cumini, Car-
 { ui, Anisi, Fœniculi.
 { Minora: Apii, Dauci,
 { Ameos, Amomi.

Quinque radices vretica: Apii, Petrosclini, Asparagi, Graminis, Rusci.

Resinarum primas non iniuria meruit Lentiscina, id est, Mastliche: inter alias verò præfertur Terebinthina, quia melior quàm Colophonina, & Fricla dicta; aut illius loco ponitur Laricea dicta, Terebinthina propè similis, Gal. 1. Comp. phar. gen. Recentioribus verò Pineæ intelligitur.

Ruta, folia Ruta agrestis: Gracis verò folia Ruta domestica. Illam verò & illius semen, Moly, vel Hefanum, vel Hefasa, vel cum Syris, apud quos nascitur, Hermola ferè vocant.

Rosa, rubra; recens in purgantibus; sicca in astringentibus.

Raphanus, silvestris.

Rosma-

Rosmarinus, folia; interdum flos, quem nescio cur hodie vulgus A^o 10 ②, id est, Florem absolutè appellat.

Rhus, cortex fructus Sumach disti.

Stœchas, Stœchados Arabica flos.

Syrax, Calamite: nam liquidus vulgò dictus est Myrrha Staëte, si verus sit.

Santalum, flauum.

Spica Nardi, Indica.

Sulfur, ἄνθος, id est, ignem non expertum, seu viuum, est nobilissimum: ad quadam extrinectum, ceu nobis familiaribus, praefertur.

Σχοῖν ②, id est, luncus: pro Schoenus anthos.

Tres flores cordiales: {
 Violarum
 Buglossi
 Boraginis.

Thymum, Atticum, aut ex editis locis ② sicis, lib. 4. sanit. tuenda.

Viola, nigra seu purpurea, vulgò Martia ② quadragesimalis, quòd in ea tempora flos ferè incidat, ② eadem recens, si haberi potest: nam sicca in efficax.

Zizipha, id est, Iuiuba, recentia ② bene matura; aut saltem integra, non putria aut vetustate exsucca: quod illis post sextum mensem ferè accidit.

Siquæ singula in singulis regionibus sunt præstantissima & laudatissima.

Alumen, Milesium.

Agaricus, Ponticus, Andromacho iuniorè in Theriaca.

Myſi, Cyprium.

Nitrum, Berenicium.

Sinon, Syriacus.

Cuminum, Hiſpanum, alibi: Æthiopium, melius Ægyptio.

Aniſum & Thymum, & alia plurima, Cretica, lib. 4. ſani. tuend. in diatrion piper. & diacalaminth.

Meon, Hiſpanum & Macedonicum.

Aristolochia, Pontica, & hac melior Cretica, lib. 10. comp. phar. part.

Phu, Ponticum.

Caſtorium, Ponticum.

Daucus, Creticus, ſemine & radice bonus: ceteri ſolo ſemine.

In Dicaarchia, que nunc vocatur Putcoli, Ærugo, Ceruſſa, Æs, Squama Æru, & alia nonnulla. Roma argenti ſtupa ſic optima. Ex Sicilia item, magna Libya, & Creta quotannis multa preſtantiſſima Romam afferebantur,

Hucusque Siluius.

DIARIVM
PHARMACORVM
PARANDORVM,
ET SIMPLICIVM
LEGENDORVM,

A .

MATTHIA LOBELIO collectum.

IN vniversum annum optimè instructurus officinam Myropola, per dies & menses operarius, famulis & officinae caculis intungit quæ faciendæ sunt: quia nonnulla medicamenta omni tempore parari nequeunt: quorum quidam aliqua si concinnari possent, tamen non debeat, quia omnia simplicia suo tempore, & in summo virium vigore (ut scilicet Diosc. & Gal. docuere) colligenda, recondenda, preparanda, & aliis miscenda. Nonnulla verò quoniam anni cardine, solo & celo, vel minori sumptu preparantur, & miscentur. Exemplo igitur sumpto ab illis qui opera locarunt, exordium sumemus.

IANVARIO.

MENSE primo & anni primis diebus perlustranda quæ supersunt valida & integra in officinâ; ut vitiosa, cariosa, antiquata, deprauata & putrefacta abiiciantur;

tur ; vt & quæ desiderantur, inueniantur,
& absumpta restituantur.

F E B R V A R I O.

QUÆ CUM QVE imperata sunt mense Ianuario, fieri possunt hoc & sequenti mense. Et circa finem in regionibus calidis, in quibus omnia præcocia sunt, collige Violas ad syrupi præparationem, Conseruationem siue Conditum, ad Oleum, & ad pulueres cordiales siccatas seruandas, quas & tardiùs colligere potes, vt sicciores sint, & calor maior adsit ad siccandas eas.

Collige item Keyri.

R A D I C E S C O L L I G E N D I

T E M P V S.

Circa finem Februarii initio Martii, & primo Vere collige radices in varios vsus, priusquam vis in folia erumpat.

Censuit tamen Dioscorides, omnes incipiente foliorum defluuio esse legendas, & cælo sereno: cui in quibusdam Galenus, Auicenna & Mesues consentiunt; in aliis diuersa sentiunt.

M A R T I O.

R A D I C E S quouis anni tempore colligi

ligi possunt, quæ hominum cultu & satione crebra in omnem anni partem vegetæ incidunt: quales ferè sunt hortenses alimentosæ. vt,

Apii vulgaris
Buglosi vtriusque

Betæ

Lactucæ

Intebi

Oxalidis

Raphani

Napi

Pastinacæ

Sisari

Cepæ

Porti

Allii.

{ Dauci
Gingidii
Caucalidis

{ Asari
Dracunculi
Cyclaminis
Periclymeni
Cotyledonis.

Nam hæ quin-
que, vt bulbosæ
quædam alię, etiã

æstate, siccatis foliis, plenæ sunt, & frequenter Autumno regerminant, alimenti pingui & crassi copia.

Silvius. Quæ verò solius naturę sponte crescunt, aut semel à nobis tempestiuè seruntur aut plantantur, ferè sunt optimæ, solo aut Vere, aut (vt dixi) Autumno, paucissimæ Æstate aut Hieme. Quin & hæ quas multis anni partibus communes diximus, sunt præstantiores, cùm tempestiuè satę adoleuerunt & vigent: aliis verò temporibus ignauiores; quando vi quadam & holitoris operâ & irrigatione coguntur adulescere sub cælo sibi parum propi-

propitio ; quale æstium est ac autumnale & hiemale. Sic Vere ipso, quando primum germinare incipiunt, nobis leguntur in annum:

Enula	Hyoscyamus
Althæa	Angelica utraque
Iris	Anonis
Acorus	Asarum
Symphytum	Asclepias
Ruscus	Eistorta
Asparagus	Betonica
Petroselinum	Euglossum
Apium palustre	Carlina
Tœniculum	Caryophyllata
Bryonia	Centaureum maius
Agrimonia	Chelidonium utrius-
Meum	que
Phu	Cotyledon
Cyperus	Cynoglossum
Rubia, quæ potius	Distamnus albus
Autumno	Elleborus niger
Saxifraga	Esula maior
Eryngium	Farfara
Tormentilla	Filipendula
Pentaphyllum	Filix
Pæonia utraque	Filix florida
Polypodium	Gentiana
Gramen	Iarus
Lilium	Aron
Alni nigrae radicis	Imperatoria
cortex	Lepidium

Man-

Mandragoras	Pityusa
Narcissus	Cortex rad. Populi
Nymphaea	Sigillum Mariæ
Radix caua	Oichides
Capnos Plin.	Raphanus sylvestris
Rubus	& rusticanus
Scrophularia	Muscus arborum
Petasites	Cort. rad. Sambuci
Petroselin. Macedon.	Radices Ebuli.
Peucedanum	Cortex rad. Fraxini
Pimpinella	Cortex rad. Lauri.
Pistolochia	Cortices arborum.

HERBÆ ET FLORES.

Viola Martia ad
 Syrupum
 Conseruam
 Oleum
 & cordiales confectiones.
 Keyri.
 Aquæ distillantur ex Violis & herbis hie-
 me vegetis, vt Aqua
 Umbilici Veneris
 Mandragoræ
 Semperuiui
 Capillorum Veneris.
 Adiantum omne, Asplenium, Phyllitis.
 In regionibus calidis Syrupi ex herbis re-
 centibus parari possunt, vt:
 Capillorū Veneris simplex & compositus
 Grana

Grana hederæ arboreæ

Oculi Populi.

A P R I L I.

Quæcumque omnia Martio mēse, initio Aprilis parari & colligi possunt.

Keyri Primula Veris

Narcissi flores ad oleum

Cochlearia Orchides Salvia vita.

M A I O.

Quæ prætermissa sunt mense Aprili, fiant initio Maii.

Distillantur herbæ quæ ad statum per-
nenerunt.

Herbæ quæ iam caulem producunt, & semen edunt illo mense, conseruantur ad Theriacam vel aliam compositionem. Reponantur in altiori parte domus.

Vnguenta ex succis fiunt.

Emplastra ex succis herbarum parantur.

Conseruationes ex plantis.

Colliguntur

Absinthii coma ad conser.

Eupatorium ad succum.

Paludapium

Fumaria

Daphnoides

Genistæ flores

Cichorium

Lactuca syl.

Seri-

Serides	Phyllitis
Len: palustris	Borago
Leucoia	Buglossum
Lichen	Burſę paſtoris ſuc-
Mezereon	cus
Napi ſemen	Limonium Germa-
Plantago	nicum, ſeu Pyrola
Lupulus	Ophiogloſſum
Tamarifcus	Pulmonaria vtraque
Thlaſpi ſemen	Rosæ
Vinca Peruinca	Rosmarini flores
Bugulę	Flores Sambuci.
Asplenium	

IVNIO, & initio IVLII.

Abrotonum	Caliſſia
Agrimonia	Centaurium minus
Alchimilla	Chamædrys
Altercum, ſive	Chamæpitys
Hyoſcyamus	Rosæ in regioni-
Althęæ flores & fo-	bus temperatis
lia	Syrupi Roſ. conſer-
Anethum	oleum, vnguen-
Anthemis vtraque	tum, ſuccus
Artemiſia	Betonica
Aſari folia	Brasſica marina
Ballotæ	Borrys
Calaminthamótana	Branca vrſina
Calendulę ſtillaticia	Cari ſemen
Cardus benediſtus	Coriandrum

Epi-

Epithymum &	Papauer Rhœas
Epithymbra	Parietaria
Equisetum	Parthenii siue Co-
Euphrasia	tulę flores
Galega	Periclymeni flores,
Genistę semen	& fructus, & folia.
Gratiola	Petroselinii Mace-
Hypericum	donici semen
Hysopum	Phlomos
Iacobæa	Pilosella
Labrum Veneris	Polium
Laurus	Polygoni aqua &
Lyfimachia lutea	succus
Maiorana	Portulacę succus &
Marrubium	stillaticia
Marum	Ros solis
Matricaria	Ruta vtraque
Melissophyllum	Sabina
Mentha	Salvia
Menthastrum	Sanicula
Mercurialis suc.	Satureia
Millegrana	Serpyllum
Nepita	Scordium
Numularia	Verbena
Opium	Veronica.
Origanum	

I V L I O.

In regionibus temperatis, quę præter-
missa sunt Iunio, facienda.

Quæ-

Quæcumque Solis feruorem requirunt, paranda, vt Theriaca, quæ in calidioribus regionibus parari solet Iunio mense, ybi omnia sunt præcocia.

Parantur Trochisci Aliptæ moschata, quia mollescunt Ladanum & Styrax, si Soli exponantur.

Quod si quis eo tempore hæc neglexerit aut prætermiserit, licebit aquam Rosaceam addere calidè ; & vi caloris liquecant, (sicuti balneo,) quod melius est, quia illa longa insolatio exsoluit vires odoratorum.

Apud nos quia semina seriùs maturescunt, insolatio & fermentatio Theriaces potest iuari, & accelerari in balneo vel hypocausto.

Colligenda in regionibus calidis:

Abinthium	Sem. Sefeli
Abrotonum	Massiliensis
Ageraton	Sem. Lithospermatis
Coriandrum	Lupinus
Dauci Cretici semen	Sem. Maluæ
Sem. Petroselinì	Flores Meliloti
Hydropiper	Sem. Anethi
Pulegium	Morus
utrumque	Orobus
Lauendulæ flores	Capita & Sem. Papaueris utriusque
Ligustici semen	Psyl-

Pſyllium

Sophiæ ſemen

Ribes

Tanacetum.

AUGUSTO.

Quæcumque neglecta aut omiſſa ſunt
præcedente menſe, ſiant Auguſto.

Colligenda:

Althææ ſemen

Fraxini ſemen

Sem. Cataputiæ

Miliſium

Cnici ſemen

Flos Nymphææ

Cornus

Petum. Mel Peti

Cynosbatoſ fructus

Omphacium

Dauci vulgaris ſe-
men

Prunus ſyl.

Sem. Sambuci &

Cucumis Elaterii

Ebuli

Rhamni Cathartici
ſem.

Momordica

Scordium

Polium

Sefeli Æthiopici ſe-
men

Ricinus

Sem. Hyoſcyami.

Spica Lauendulæ

Tribulus aquaticus

SEPTEMBRI & OCTOBRI.

Antiſpodium è Myrto & Cydonio

Cortices Caſtanearum

Cotoneamala Halicacabum Meſpilus

Rhamni cathartici ſemen

Radices nonnullæ omiſſæ Vere nouo. vt,

Iridum Pæoniæ 'Acori.

NOVEM-

NOVEMBRI & DECEMBRI.

His duobus mensibus ; Nouembri videlicet ac Decembri , eadem erit ratio , si modò in eis cõtigerit eiusmodi cæli temperies , vt radices adhuc validæ nullâ vel frigorisvel niuis tempestate concutiantur. nam sæpe iisdem mēsis contigit, vt sine ullâ cæli iniuriâ Pharmacopœis quod reliquum est radicum in hortis remanentium, æquè ac in præcedentibus, colligere liceat:

Sequuntur & nonnulla purgantia medicamenta M. Lobelii.

ALIQUOT
 MEDICAMENTA
 COMPOSITA
 HABERE IN PROMPTU
 OPERÆ PRETIUM.

DOLVMEsse, si quis Compositis utatur. Villanouanus dixit, ubi in promptu habentur Simplicia : Variis tamen de causis nonnulla Composita pharmaca non minùs utilia quàm necessaria sunt. Prima & potissima, quotiescumque præcipientes implicati morbi, eorundemq; sæuissima symptomata adèò urgent,

gent, ut noua medicamenta, Magistralia vocata, repente per otium concinnare non liceat. Secunda, & alia, quia multa comprobata, & vsa & ratione recepta compositiones fermentatione egent; unde noua & optata exoritur facultas; quandoquidem simplicia quouis loco, celo, & solo, ad manum esse nequeunt; ideo quo tempore maximè vigent, in annum usum ex his composita nonnulla medicamenta preparari, permisceri & asseruari opera pretium est, ut Theriaces compositio, Mithridatica, Philonia antidotus, & huiusmodi. His rationibus ductus, quia medicamento purgante indies utendum, aliquot tuta eaq; pauca pharmaca composita, blando nulloq; labore euacuantia, singulis humoribus dicata, nobis elegimus; quibus diu felicissimè vti sumus, & ex duabus tribusve compositionibus unam fecimus, ne mole & copia compositionum obruamur; quæ diu in officinis asseruari solita, sæpe putrent, non sine Pharmacopœorum & egrotantium dispendio.

CHOLAGOGVM ROSATVM

CLEMENS, OMNI ÆTATI VTILE;
ori, ventriculo & visceribus gratum; febris
bus & affectibus biliosis aptum. Respondet
Electuario Rosato, & Electuario è Prunis
solutiuo, & Electuario è Psyllio.

R̄. Succī Rosarum rub. ℥ xv.

Sacchari albi ℥ xxx. [xxxvj. al.]

Mel:

Mellis candidi despumati ℥ vj.

Prunorum ℥ xx. quæ exhibent pulpæ
solidiusculæ ℥ xvj.

Passularum à stipitibus mundatarum ℥ xij.
quarum pulpa solidiuscula est vncia-
rum vj. Pruna & Passulæ coquantur se-
paratim ad mollitiem ex decocto se-
quenti, & per setaceum cernantur:

℞. Cichorei totius

Boraginis Acetosæ

Polytrichi, vel Adianthi } ana m. iiij.

Endiviæ

Hordei integri m. j.

Glycyrrhizæ mundæ ℥ j. β.

Florum Violarum

Boraginis ana m. j.

Anisi ℥ iiij.

Fiat omnium decoctio in s. q. aquæ ad ℥ iiij.

In cuius colatura coque in vase occluso

Pruna & Passulas. In residuo infunde, co-
que leniter

Seminis Psyllii

Quatuor seminum frig. maiorū }

Sem. Lactucæ

ana ℥ β.

Oxalidis

& Portulacæ contusorum

Dissolue G. Tragacanthi ℥ j. β.

Saccharum, Mel, & Succus Rosarum co-
quantur ad Electuarii solidiusculi con-
sistētiam: deinde pulpæ & emulsiōnes
seminum addantur, iterumque coquan-

tur lento admodum igni: tum demum
insperge puluerum

Cinnamomi electi ℥ β.

Santalorum rub. ℥ j. β.

Santal. alborum ℥ vj.

Caryophyllorum

Surculorū vel foliorū Lentiscai } ana ℥ j. β.

vel Caryophyllorum ℥ ij. ℥ j. [in pe-
nuria foliorum Lentiscai]

Macis ℥ iiij.

Adde denique singulis lib. siue ℥ xij.
huius Electuarii, Scammonii optimi ℥ j.
cocti in ℥ j. β. Succi Rosarum lento igne
vel cineribus calidis, quemadmodum co-
quitur à Mesue in suo Elect. Rosato.

Tota compositio est librarum v. & ℥ v.
Dosis à ℥ iiij. ad ℥ iiij. v. & vj.

Si velis minus purgare, vtere minori
dosi. medicamenta enim validiora minori
dosi assumpta, debilia sunt.

Hęc & quamplurima huiusmodi purgā-
tia, in Chylismata redigere operę pretium.

EXTRACTVM MELANAGOGVM,

SANGVINEM DEFECANS, ET
serosa excremēta euacuans, omnibus cutis &
cuticula vitiis, lepra & elephantiasi conue-
niens, siue à bile, siue à pituita salsa: Spleneti-
cum & Hepaticum medicamentum efficax.

℞. Succorum Rosarū rub. defecatorum ℥ ij.
Suc.

Suc. Fumariæ	}	ana ℥ j.
Lupulorum		
Boraginis		
Pomorum dulcium		
Mercurialis		
Endiviæ vel Cichorei	}	
Vini albi		

Quibus decoque sequentia in balneo
●perculo occluso.

℞. Polypodii recentis, & adhuc viridis ē
Quercu vel Fraxino ℥ vj.

Foliorum Senæ mundatorum ℥ ix.

Summitatum & florum Thymi,	}	ana ℥ vj.
Cassithæ		
& Absinthii		

Radicū Lapathii acuti virentiū	}	ana ℥ j ℞.
Helenii Ebuli, vel		
Corticis radicum Sambuci		
Corticis rad. Fraxini		
& Populi nigri		

Capillorū Veneris vel Polytrichi	}	ana m. j. β.
Asplenii Chamædryos		
Chamæpityos		

Florum Chamæmeli Romani

& Cotulæ fœtidæ siue Parthenii ana m. j.

Seminis Cnici ℥ iiij.

Seminis Anisi	}	ana ℥ vj.
Fœniculi		
Carui		

Contusis. infusis, decoctis, expressis &
transcolatis infunde

Agarici candidissimi & leuissimi

Hermodyctylorum, &

Pulpæ Colocynthidis ana ℥ j.

Omnium Myrobalanorum ana ℥ ij.

Zingiberis	Cinnamomi	} ana ℥ j.
Schœnanthi	Macis	
Galangæ	Garyophyllorum	

Iterum expressis & defæcatis percoquantur lento admodum igni, cum mellis candidi ꝑ. tribus, ad mellis vel Electarii liquidi crassitudinem. Addendo singulis ꝑ. Scammonii præparati vel cocti in succo Rosarum, ut antè diximus, ℥ β. pul. Gummi Arabici ℥ j. Dosis à ℥. iiij. ad ℥. iiij. & vj.

Extremis morbis adiiciuntur vniuersæ compositioni

Hellebori albi

& nigri ana ℥ β.

Fiat Chylariū. Dosis à drachma j. ad duas.

CATHARTICVM

HYDRAGOGVM.

℞. Radicum Graminis ℥ vj.

Rad. Asari ℥ j.

Granorum Hederæ arboreæ ℥ iiij.

Garyophyllorum Galangæ tenuis

& Cinnamomi ana ℥ ij.

Coquantur ex arte, ut dixi modò, in ꝑ. q. aquæ mulsæ, & ꝑ. j. vini albi, ad ꝑ. j.

Colaturæ adde Succorum rad. Iridis & Brassicæ

Brassicæ marinæ ana l. β.

Succorū Chamelææ } densatorū, vt docui-
& Thymelææ } mus capite de Cha-
malæa, ana ꝑ iij.

Vel eorundem vice in regionibus frigi-
dis, quæ carent vel non abundant
Chamalæa & Thymelæa, sume

Extracti Laureolæ vel Gratiolæ ꝑ j.

Percoquantur igni lento cum Sacchari
l. j. Ab igne vbi abstuleris, adde pulueris
Radiciſ Mechioacæ ꝑ j. β.

Tartari albi & Spec. Aromatici Rosati
ana ꝑ β.

Macis ꝑ ij.

Olei stillatiti Cinnamomi, Caryoph. &
Anisi ana ꝑ β.

Datur ex aqua Graminis & mulla à ꝑ
iij. ad ꝑ iiij. cum pari quantitate Mela-
nogogi, & Asari decocto.

DIACNICVM CVM CITRO,

SOLVTIVVM, PHLEGMAGOGVM

Et Hydragogum, quartana febre affectis,
vt si quod aliud, utilissimum. Respondet
Diacarthamo Et Electuario à Citro solutiuo
Monspeliciſsum.

Hæc Compositio à Cnico siue Carthamo
nomen accepit, tamquam precipuo agente: me-
ritò igitur ꝑ iiij. Medullæ seminis Cnic-
cum Rondeletio legendum, pro ꝑ iiij. (vt do-

prauatè habent omnia exemplaria) censemus.
Ad hæc Cnici semen omnium viscerum obstru-
ctiões reserat; collumiẽ propellit, & pitui-
tã purgat egregiè.

Recipit autem Medullæ seminis Cnici
 ℥ iiij. vel eius loco sume seminis Cnici
 boni & pleni ℥ xiiij. ʒ vj. ʒ ij.

(ex ʒ j. autem seminis habebis ʒ vj. me-
 dullæ)

Contundantur, & fiat emulsiō ex aqua
 mulsa, vel iure gallinacci, vt docet Diosc.
 Conser. Corticis Citri melle conditi [ad
 deterisionem pituitæ] ℥ j. β.

Conser. Violarum &

Florum Boraginis ana ʒ x.

Carnis Daçtylorum vino albo macerato-
 rum ℥ j.

Pul. specierum Diatragacanthi frigidi
 ℥ j. β.

Turbith ℥ j. ʒ vj.

Diagridii vel Scammonii ℥ j.

Zingiberis albi ʒ ij.

Hermodaçtylorum ʒ iiij.

Spiritus Anisi, vel

Fœniculi Cochleariatria

Mellis optimi despumati ℥ xij.

Sacchari albi ℥ xx.

Dissoluatur in ℥ j. β. Succı Cydoniorum
 & s. q. aquæ mulsæ.

Terenda terantur & permiscéantur.

ANTI-

ANTIDOTI DIAPHOENICI

Mesua, emendata descriptio.

℞. Dactylorum Cheyron, id est, è Chayro oppido, non Cirrhon siue fuluorum, vt malè ex Græco vertit Ruellius, nonnullas officinas secutus, \mathfrak{z} xij. & β .

Macerentur vino albo [Rondelet.] loco tepido ad mollitiem, terantur, cernantur per cribrum.

Pinearum (non Penidiorum) aqua hordei mundatarum & infusarum \mathfrak{z} v.

Turbith optimi \mathfrak{z} iiij. \mathfrak{z} iiij.

Amygdalarû dulcium purgatarû \mathfrak{z} iiij. \mathfrak{z} vj.

Scammonii \mathfrak{z} j.

Zingiberis Piperis longi

Cinnamomi Macis

Galangæ Xyloaloës

Foliorum Rutæ siccorum

Anisi Fœniculi

Dauci Cretici, vel eius loco Cari semen aromaticum.

} ana \mathfrak{z} ij. β .

Probè trita omnia excipiantur libris tribus Mellis despumati ex infusione vini Dactylorum & aqua Hordei, in qua post lotionem Pinci & Amygdala macerata sunt.

Tota compositio est ferè lib. v. & \mathfrak{z} xj.
Dosis ab \mathfrak{z} β . ad \mathfrak{z} vj.

T 5

Hæc

Hæc compositio ad euacuandos crassos humores facta est.

E L E C T A R I U M I N D Y M.

Dissuadet præparationem Electarii Indi noster Rondelletius; quia non multum differt à Diaphœnico. Adstringentia & attenuantia Electuario Indo addiderunt, quæ deteriorem potiùs compositionem fecerunt, & deprauârunt, vt exploranti facile patebit.

L E N I T I V A Æ C A S S I A *medicamenta.*

E Cassiæ Ægyptiæ siliquis à diuersis auctoribus multa & varia medicamenta lenitiua descripta, minimè paranda aut dispensanda censentur, quia velacescunt vel exiccantur, & eorum laxandi vis deperditur.

F L O S C A S S I Æ, *sen Cassia extracta.*

E Cassiæ recentis & prægnantis fistularibus siliquis pulpa elicitur, quam Florem Cassiæ & Cassiam extractam vocant: Sed cum Cassiæ Siliquæ siue fistularis recens pulpameliùs asseruetur in sua theca, quàm excreta; quid extractione ante usum opus est? Triplex Cassia extracta in officinis
pro-

proſtare ſolet : Caſſia extracta ſine Sena & cum Sena ; Caſſia extracta cum Manna ; Caſſia cum Saccharo & cum Melle , pro clyſteribus & pauperibus. Si præſcribatur à medicis , paretur hoc ſequenti modo.

CASSIA extracta communis
Nicolai.

℞. Florum Violarum
Violariæ ſive foliorum Violarum,
Maluæ,
Mercurialis, Betæ
Parietariæ ana M. j.
Abſinthii Pontici ſive vulgaris M. ſ.
Herbæ iſtæ virides coquantur artificioſè
in ſ. q. aquæ ; è cuius colato abluè ſili-
quas Caſſiæ ; & diluè in eius portiu-
cula pulpæ Caſſiæ ꝑ j. Mellis ex reliqua
colati parte deſpumati ꝑ ſ. percoquan-
tur lento igne ad electarii formam.

DIACASSIA cum MANNA non mul-
tum differt à Diacatholico , niſi Senā
Rhabarbaro & Polypodiæ.

DIACATHOLICON Nicolai,
vel potiùs è Dia-catholico
Liquamentum.

Huius vniuerſalis medicamenti varia
eſt deſcriptio. Exemplaria vulgata habent

pro pulpæ Cassiæ Thamar-Indorum ana
 ℥ duabus Sacchari ℥ ij. id est ℥ xiiij. An-
 dernachus autem pro ℥ ij. Sacchari perpe-
 ram addit Cassiæ & Thamar-Indorum &
 Senæ mundatæ ana ℥ viij. Rondelletius
 verò ℥ vj. mediocritate fretus. Hoc Ca-
 tholicon lene siue mite in suauissimam &
 lenissimam, cum Cassiæ operatione maxi-
 mè conuenientem compositionem, rede-
 gimus: quam è Diacatholico Liquamen-
 tum siue Extractum diximus; neglecto
 Diacatholico maiore Fernelii, quod reci-
 pit Turbith & Diagredium, ab his beni-
 gnis medicamentis & intentione Nico-
 lai multùm aliena. Paretur ergo in hunc
 modum:

℞. Radicum Filiculæ siue * Polypodii re-
 centium, fol. Senæ mundatorum ana
 ℥ xvj.

Glycyrrhizæ rasæ

Anisi ana ℥ ij.

Seminis Fœniculi ℥ j.

Foliorum Violarum M iiij.

Florum Violarum M j. β.

Quatuor seminum frigidorum maiorum
 ana ℥ j.

Contusa omnia, demptâ Senâ, & semi-
 nibus frigidis, floribusque Violarum, 24.
 horas vel biduo aquæ pluuiæ ℥ v. vel q. s.
 madefacta, decoquuntur leuiter ex arte in
 balneo Mariæ; mox paulo antequam ab
 igne

igne deponantur, Senam adiiciunt, cum feminibus frigidis & floribus Violarum; maceranturque calidè aliquot horas in balneo. Vbi tantisper refrixerint, linteolo excolantur, & leniter exprimuntur, ne Polypodii & Senæ vis adstrictoria eliciatur. Colatum iterum decoquitur, dum mellis crassitudo fiat, adiectis Sacchari boni subrubri, perdulcis, vel albi pinguis ꝑ iiij. Postea ab igne remotis adde Floris Cassiæ, vapore decocti præscripti extractæ, & Thamar-Indorum ana ꝑ vj. Sacchari candi & Penidiarum ana ꝑ j. β. Succi vel Infusi Ros. ꝑ iiij. Æstate addi poterit decocto libra vna succi Mercurialis defæcati & purificati, & pro diuitibus in singulas ꝑ scrupulus vel 3 β. Rhabarbari selectissimi.

* Polypodii magma [*secundum Rondeletii*] aut crassamentum, quia copiosos flatus gignit, ventrem lædit, eumque magis obstruit quàm referat, leuiter Polypodium decoquendum iussimus, vt efficacius suas vires, easque suauiores, exferat. Decoctionem enim mediocrem sustinet, quemadmodum Sena & Turbith, vt monuimus in nostris Stirpium Observationibus Latinis. Pondus eius etiam adauxi, quia villi emitur, pauperum commodo; longèque maiori pondere in decoctis, vti Sena, & alia permulta, quàm in substantia, vt vulgus loquitur, assumitur.

Aliqui omittunt Saccharum Penidia-
rum; leui incommodo, quia Penidia pa-
rantur ex Saccharo pingui, leniente.

ELECTARIUM LENITIVUM.

Elect. Lenitium conuenit cum Diaca-
tholico & Diacassia; quare eo carere possu-
mus. Hæc de Electariis lenioribus suffi-
ciant, pluribus humoribus, exustis potis-
simùm, expurgandis idoneis.

DIA-SEBESTEN.

Dia-Sebesten Montagnanæ bilem te-
nuem euacuat. In Italia & regionibus cali-
dis magis vsitatum quàm in hisce frigi-
dis tractibus, vbi rarò dispensatur, quem-
admodum Elect. è Psyllio Mesuæ, quo
etiam carere possumus. Recipit copiosè
Scammonium cum trochis. è Spodio vel
Antispodio, ex Oxyacantha, trochis. Dia-
rhodon, quò Scammonii vires remissiores
sint, & alui fluores dispendiosæ vitentur.
Pro hisce inusitatis Electariis medicus
doctus facilè Cholagogum Rosatum de-
cocto conuenienti siue è Myxariis siue è
Psyllio, Fumaria, Epithymo, Eupa-
torio, Rhabbarbo & huiusmodi, pro ra-
tione & natura morborum, diluit.

ELECTARIUM è Succo Rosarum Ni-
colai, fortissimum est cholagogum, & mi-
nùs castigatum aut emendatum.

Antido-

Antidotus sine CONFECTIO HAMECH,
apud Mesuem.

Ex veterum Antidotis retinent hanc confectiorem neoterici, ob insignes vires ad omnes morbos ex pituita salsa, flava bile, adultisque humoribus ortos, & prauos eorum ichores: scabiem, impetiginem, elephantiasim, luem Veneream, & quævis cutis & cuticulæ vitia. Improbandi tamen sunt qui hac compositione vtuntur in pituita crassa euacuanda, ob Myrobalanos, quæ magis impingunt materiâ lentam, ex Galeni & antiquorum sententia. Sed quia hæc compositio (vt scitè monet Rondel- letius,) sine arte composita videtur, & contra theoremata à Galeno, Mesueo & aliis tradita: (nam infunduntur diutiùs & coquantur maximè inæqualia, vt Poly- podium, Myrobalani, Agaricus, Colo- cynthis, Rhabarbarum &c.) lubuit eius parandi rationem explicare. Quid enim opus quinque diebus in macerando Poly- podio ex sero lactis: cum nostra ætas ipsum Guaiacum, lignum durissimum, eiusque cortices, & huiuscemodi 24. horis aqua tantum feliciter maceret. Serum autem diutiùs asseruatum facilè acescit, situm ducit, & putret. Octo vel 10. horarum Rhabarbari infusum (præterquam in alui fluori.

fluoribus, ventriculi & intestinorum imbecillitatibus, lubricitatibus & læuitatibus à bile alimentis permixta, vbi solemus exhibere fortem Rhabarbari expressionem, & ipsum Rhabarbarum in tota substantia) commendatur à perbonis medicis, ne vis adstrictoria eliciatur. Hæc monuimus, vt nonnulli è nostris pharmacopœis sint paulò diligentiores in parandis pharmacis; ediscantque rationem componendorum medicamentorum, quam ipsi modum faciendi vocant.

℞. Myrobalanorum flauarum ℥ iiij.

Cepularum Indarum

Rhabarbari

Epithymi ana ℥ ij.

Agarici Colocynthidis

Polypodii querni ana ℥ xvij.

Absinthii Thymi

Senæ ana ℥ j.

Violarum ℥ xv.

Anisi Rosarum Fœniculi ana ℥ vj.

Succi Fumarię Mercurialis ana ℥ x.

Pruna numero sexaginta

Vuarū passarum à vinaceis purgatarū ℥ vj.

Polypodium leuiter contusum, cum Passulis, Absinthio, Prunis, Fœniculo & Aniso 24. horas madefactum ex feri lactis asini vel caprini q. s. in vase oris angusti obturato, feruefac aliquot leuioribus ebullitionibus: deinde addatur Colocynthis

this contusa & forficibus incisa, cum Agarico, nodulo laxo excepta: Thymum, Epithymum, Myrobalani, Sena, Violæ, Rosæ & Rhabarbarum macerentur 12. horas, & vnica feruefactione parumper decoquantur, addito Succo defæcato Fumariæ, quia paucam aut ferè nullam sustinent decoctionem. Cola leniter exprimendo. In colati portiuncula dissolue Mannæ ℥ ij. & coletur. Coque igne tantillo colati reliquam portionem, addita sesquilibra Sacchari boni, vsque dum mellis crassitudinem habeat. mox vbi refrixit, tepenti adhuc syrupò misce Cassiam, Thamar-Indos, Mannam & Scammonii præparati ℥ j. β. paulatim inspergendo puluerem hunc:

Myrobalanorum flauarum

Cepularum

Indarum ana ℥ β.

Bellericarum

Emblicarum

Rhabarbari

Seminis Fumariæ ana ℥ iiij.

Seminis Anisi Spicæ Nardi ana ℥ ij.

TRYPHERARVM *differentiæ.*

Tryptherarum variæ sunt descriptiones. Quæ Galeno adscribitur apud Mesuem, recipit multa quibus Galenus nunquam vsus est, vt sunt Moschum, Ambar, Caryophylli,

phylli, Nux myristica, Macis & Santala.

Tryphera magna Nicolai cum Opio parabatur, & sine Opio: sed cum Opium auferitur, adimenda Hyoscyamus & Mandragoras: cum non minùs sterilibus mulieribus aduersentur quàm Opium.

Est & alia Tryphera minor, ad differentiam maioris, ex arte Phenonis. Item Tryphera Moschata Mesuæ &

Saracenica duplex { Mesuæ, &
Nicolai.

TRYPHERA *Persica.*

Trypheram Persicam Mesuæ, quia apud multos usu recepta, & à medicis Rhodomagensibus & Rondelletio comprobatur in refrigerando ventre, eodemque relaxato confirmando & roborando, omnesque humores ferè euacuando cum astrictione, & refrigeratione, sine vlla ventris lésione, retinuimus; delicatis & imbecillis tutiorem futuram quàm Antidotus Hamech; ob Diagredium & Colocynthida: quamuis validiora medicamenta mitescant cum aliis in pauca quantitate exhibita. Sic enim paratur.

℞. Succorum Solani

Endiuiaë satiuæ

Apii defæcatorum ana ℥ ij. aut q. s.

Succi Lupulorum ℥ j.

Pru-

Prunorum Damascenorum numero 1.
 Violarum recentium & Rosarum recentium ana \mathfrak{z} iij. vel \mathfrak{z} vj. Succī, penuria Rosarum recentium siccatum.

Foliorum Senæ
 Myrobalanorum Citrearum
 Cepularum
 Indarū confricatarū in oleo } ana \mathfrak{z} iij.
 amygdalino dulci

Agarici \mathfrak{z} j.
 Cassiæ \mathfrak{z} β .
 * Epithymi \mathfrak{z} v. * pro \mathfrak{z} 4. Epithymi, ut
 Spicæ Nardi Indi. in veteri exemplari legi-
 tur, Cordus, Anti-
 cæ \mathfrak{z} iij.

Feruefac paulisper, dotarium Florentinum
 & alii nonnulli \mathfrak{z} 40. legunt. Succorum au-
 tem prescriptarum l j. Quæ quantitas longè
 superat omnia huius medicamenti simplicia: ad-
 de quòd calidior foret eius operatio, & succi
 ingredientia vix caperent quæ infundi debent:
 eoque quidam decoquunt, & infundunt in bal-
 neo occluso. Syrupus ex Epithymo Mesue, cui
 nomen ab Epithymo tanquam principio agente,
 \mathfrak{z} xx tantum Epithymi primo loco habet.

cola, & in colati dimidio dissolue

Pulpæ Thamar-Indorum \mathfrak{z} iij.

Pulpæ Cassiæ \mathfrak{z} iiij.

Mannæ \mathfrak{z} j. β .

Io-Sacchari siue Sacchari Violati \mathfrak{z} xij.

Alteri colati parti adde Sacchari optimi

\mathfrak{z} xxxvj.

Aceti

Aceti boni ℥ j.

Coquantur igne lenissimo, & supradictis
commisceantur.

Deinde adde sequentia in pulcrē redacta;

Rhabarbari selecti ℥ ij.

Myrobal. Citrinarum ℥ j. β.

Indarum

Chebularum ana ℥ j.

Bellericarum

& Emblicarum ana ℥ β.

Seminis Fumariæ

Trochiscorum Diarhodon

Macis Mastiches Cubebarum

Spodii vel Antipodii è Myrto vel Cydonio

Santali citrini ana ℥ ij.

Seminum Cucurbitæ

Citrulli

Melonum

Cucumeris mundatorū

} ana ℥ ij. β.

Anisi ℥ β.

Spicæ Nardi ℥ ij.

Tenuissimè trita inuoluantur oleo Viola-
to: & fiat omnibus mixtis Electarium ar-
tificiosè.

PILVLÆ AGGREGATIVÆ,
ex inuentione D. Mesuæ, inter om-
nes Aggregativas potissima.

Quia omnes humores implicatos è capi-
te, ventriculo, hepate & visceribus eua-
cuant,

quant, Catholicæ vocantur, aut Diacatholico comparantur; & quoniam ad multavtiles, multiq̃ue vsus quotidiani; earũ descriptionem damus ex veteri exemplari depromptam.

R. Myrobalanorum Citrinarum

Raued seni ana ʒ iiij.

Succi Eupatorii Mesuæ, id est Agerati

Diosc. seu Herbæ S. Mariæ

Succi Absinthii ana ʒ ij.

Diacredii siue Scammonii præparati suo

co Rosarum

Turbith boni Aloës ana ʒ vj.

Myrobal. Chebularum Indarum

Agarici candidissimi

Colocynthidis

Polypodii ana ʒ iij.

Mastiches

Rosarum

Salis Gemmæ

Epithymi

Anisi

Zingiberis ana ʒ ʒ.

Elect. Rosati Mesuæ q. s.

Fiant pilulę. Ne fortiores sint, formentur cum Elect. è Succo Ros. ait Rondeletius.

In his pilulis hoc reprehensione dignum, quod vulgus pharmacopœorum, Cordum, wecherum & alios sequens, tum in Superiori Germania cum & Inferiori, pro Eupatorio Mesuæ, Gratiolam, visceribus

ribus impendiò effrenatum hostem, substituunt. Ageratum enim esse Mesuæ Eupatorium, superabundè docuimus in nostris Stirpium Aduersariis.

H I E R A A R O M A T I C A , *sive Pilula ex Aloë , aromatica.*

℞. Aloës Succotrinæ , aliquoties macerata succo Rosarum rub. & exsiccata in clibano ℥ iiij.

Agarici Trochiscati tenuissimè triti ℥ iiij.

Cinnamomi

Rad. Asari

Spicæ Nardi

Mastiches

Garyophyllorum

Macis

Galangæ

Schœnanthi

Xyloaloës

Croci

} ana ℥ j. ʒ β.

} ana ʒ ij.

Cum Syrupo è Stœchade excipiantur.

P L U R A iam non excutiemus, freti D. Rondeletii Pharmaceuticam Officinam mendis innumeris vindicatam, tandem in publicum prodituram.

Querenti autem Medicamentorum varia & comprobata genera, eiusdem Rondeletii Remediorum formula obiiciantur.

Q V I A V E R ò in hisce Aquilonicis plagis

gis tot Seplasiarii , Salgamarii potiùs
quàm pharmacopœi; Barbitonfores , Li-
thotomi , Circumforanei , Agyrtæ , Ludi-
magistri , medicamentarii indocti , & sa-
cificuli vafri , rapaces & lucri avidissimi,
nulla medicinæ parte illis probè peruesti-
gata , per hominum mortes experimenta
agitantes , tam repentiè hodie Medici aut
potiùs medicaſtri ſunt : qui tandem in lo-
cum experientiſſimorum Medicorum ir-
reperunt; magno ignaræ gentis , rudis
& ruſticæ turbæ applauſu : apud quos ſor-
det, laceratur & malè audit ars Medica di-
uina, nobiliſſima & antiquiſſima, ſummo
ægotantium diſpendio , & tædio probor-
um medicorum; conſultò dataque opera
catenus & parciùs attingimus, imò præ-
termiſimus (tanquam nefas plagiumque
prophanare & perdere artem) medicatos
ſuccos ſive nobiliſſima Liquamenta, Ex-
tracta Cathartica vocata, quæ longè mi-
nor noxa & mole, maiori cum efficacia
in corporibus egregiè operantur: tamdiu
uſquedum leges ceſſabunt in hos indoctos
& inexpertos carnifices , qui ſe medicos
proſitentur , ubi aliquot remediorum
formulas memoria didicerint , animad-
vertere.

S V C C E D A N E A,

QVID PRO QVO vocant.

AN *Ἐκχώρημα*, hoc est, Simplicia, quæ aliorum facultate similium penuria supponi possunt medici consilio, quæ nomine Galeni circumferuntur, & à Paulo ad verbum propè citantur, Galeni non esse hinc liquet, quòd statim ipso initio Galenum citat. Adhuc *Anacardii* fructus mentionem facit, qui Galeno ignoratus fuit. Postremò multa supponit absurdissima: ut loco *Agarici*, *Euphorbium*; pro *Serpyllo*, *Potamogitona*; vice *Galla*, sordes *gymnastiorum*; in locum *Polypodii*, radicem *Chamelæ* aut *Chamaleontis*; pro *Polytricho*, *Absinthium*, & alia eius generis plurima viribus dissimilia. Tamen quæ recipienda magis sunt, tum indidem, tum ex Galeni libris, tum etiam ex *Arabibus* vicumque proferemus: ut
 PRO *Aqua pluuiæ*, supponi potest *Aqua fontana pura*, & ab omni mistione sinceræ. Galenus lib. 1. comp. pharm. part. in *diacodio*.

Acatia, succus & caro *Prunorum agrestium*, vel *Hypocistis*, *Auic.* 2. Canon.

Asaro, *Acori* par pondus & dimidium. Carpesium quoque pro *Asaro* & cum *Asaro*, lib. 2. comp. pharm. part.

Absinthio, cum Galen. *Abrotonum*: & econtrà pro *Abrotono*, *Absinthium*.

Acan-

*Acanthii semine, Lychnis, & contra ἀνθεα δό-
σπερ.*

*Acantha Arabica seu Ægyptia herba (qua Su-
caba [al. Sucaba] Serapioni dicitur) Acan-
tha leuce nostras, eidem dicta Bedegar.*

Alicacabo, semen Solani.

Aspalcho, Pix liquida, Brutia.

*Æthiopica olea lachryma, lachrymarum Aca-
cia partes dua; seu pro gummi Elemnii, gum-
mi Arabicum.*

*Acoro, ad flatum & hepar, ac lienem iuuan-
dum, Cumini par pondus, & tertia pars Ari-
stolochia. Auicenna.*

Anchusa, Hyacinthus.

Arsenico, Sandaracha.

Amylo, sicca Farina.

Amygdalis amaris, Absinthium.

*Aristolochia quauis, una ex tribus Aristolochiis,
quancumque habueris. Galen. lib. 3. comp.
phar. part.*

Adipe vulpis, ursinus.

Adipe ceruino, anserinus.

Alumine, Sal fossilius.

PRO Balaustio, Malicorium.

Buccinis, Ostrea vsta.

Balsami liquore, Myrrha flacte.

PRO Cinnamomo, Casia, aut Amomi du-
plum, ad odoris gratiam. Gal. lib. 5. comp.
phar. in dentifricio. Pro Cinnamomo, du-
plum optima Casia, vel cum Quinto me-
dico duplum vel multum Carpesii, vel cerie

- non paucior *Casia*. Gal. lib. 2. 3. & 8. comp.
 phar. part. & lib. antid. Quidam carentes
Cinnamomo, in vicem eius ponunt equala
 pondus ex semine *Cardamomi*. *Damocrates* in
Cyphi, lib. 2. *Antidotorum* Gal.
Casia, *Cinnamomum*. Galen. lib. 2. comp.
 phar. part.
Casie cortice, *Nardus Indica*, vel *Malobathri*
 folium; vel contrà, lib. 6. comp. phar. part.
Chamemeli floribus, duplum foliorum & ra-
 dicum.
Costo hodie rarissimo, *Pyrethri* dimidium, vel
 bacca *Cedri*, vel radix *Helenii* vel *Iteos*.
Cimolia terra, ex *Cimolo* una *Cycladam*, re-
 trimentum ferri & mola simul attritorum.
Cardamomo maiore, minus; & contrà.
Calaminshe omnis, *Menthastrum* & *Pulegium*
 similia sunt facultatibus: ob id inuicem sunt
 antiballomena.
Croco, *Crocomagma*.
Oypero, *Iuniperus* maior.
Cumino, semen *Ruta* vel *Agni* [casti]
Clinopodio, *Heliotropium*.
Colocynthide, semen *Ricini*.
Capparis radice cortice, cortex radice *Tama-*
ricis vel *Erica*.
Cicuta semine, *Coriandrum*.
 PRO *Didamno*, *Elelisphacis*, vel *Nepita*.
Doronico, dimidium seu dua tertia *Garyophyl-*
lorum. *Auic*.
Damasenio, *Eryngium*.

PRO Elaterio , succus foliorum Cucumeris
agrestis.

Ebeno, lignum Guaiaci ; & contrà. Nam quas
vires hodie in ligno Guaiaci experimur, Ebe-
no tribuit Gal. lib. 6. simpl.

Eupatorio Mesue, Absinthii & Asari ana di-
midium pondus eius , ut ambo simul mista
equent pondus Eupatorii Mesue , ab Eupa-
torio Græcorum diuersi.

PRO Folio , folium Garyophylli , Nardus In-
dica , si inuenitur , Casia , id est , vulgare
Cinnamomum, Macis. Auicenna 2. canon.

Ferrum, ferrugo, squama ferri, idem propè pol-
lent ; & pro se mutuò ponuntur.

Fimo palumbæ , fimo columbæ.

Felle suillo, vel perdiciis, vel piscium.

PRO Gentiana, Asari, & radicis Capparis
qua dimidium.

Gongylide, Heliotropium.

Glycyrrhizæ succo, æquale radicis eius. Androm.
in arter. 15. apud Gal. lib. 7. comp. ph. part.

Guidio Cocco, semen Lathyridis ; & contrà.

Galbano, Sagapenum.

PRO Hammoniaco, Propolis.

Hermodactylo , in doloribus iuncturarum, folia
Anchusa, & dimidium Bdellii.

Hedera gummi , gummi Persici.

Hyacintho , flos Isatidis.

PRO Iride Illyrica, Helenium odoratum.

PRO Lapide Lasio, (al. Asio ,) lapis gagates.

Lapide Magnete , lapis Phrygius.

Lapide Phrygio, Pyrites lapis vel Argyrites.
Libyſtico, ſemen Staphylini, id eſt Paſſinace,
praſertim agroſſis.

Lepore marino, Cancer fluuiatilis.

Lanaria radice, radix Veratri nigri.

Lycio, ſuccus radicis Centaurii magni, lib. 7.

ſimp. aliis ſuccus baccarum Periclymeni. au.

etor libelli Dynameon, Galeno malè adſcripti.

PRO Melle, Melaërium, vel Saccharum.

Malobathro, Caſia, vel Nardus Indica.

Myrrha Troglodytica, Calamus odoratus.

Myrrha, Smyrniū, & contrā. Dioſc. in
Smyrnio.

PRO Naſturtii ſemine, folia eius ſicca.

Nuce moſchata, par Spica.

Nardo Syriaca, Iuncus odoratus.

PRO Opopanace, Hammoniācum, vel Gal-
banum, vel Sagapenum, vel Bdellium, lib.
2. ad Glaucōnem in curando ſcirrho.

Ocimo garyophyllato, Meliſſa in affectibus cor-
dis.

Oleo Laurino, Pix liquida, licet illo inferior:
vel oleum Cedrinum, vel Ciciūm, vel ve-
tus, vel oleum ex lucerna cum cera. Galen.
lib. 1. comp. ph. part. vel coctum (ſic enim
tenuius fit, & veteri ac Cicino ſimile) vel
ſordes lucernarum luti craſſitis. ibidem.

Oleo Roſato, Violatum, Nymphae: Amygda-
linum autem loco Roſacei boni, id eſt, ex
multis Roſis cum oleo omphacino inſulſo
facti, lib. 3. comp. phar. part. initio.

Oleo

Oleo Ricinino seu Cicino, Raphaninum.

Opobalsamo, Opocarpasum Gal. vel Myrrha
statte, vel liquor Myrti.

Oryza, Hordei farina.

Oxyppo, medalla ceruina.

Omphacio, succus Rhoïs, vel vinum auste-
rum.

PRO Piperelongo, album: pro albo, nigrum
optimum, id est, grauissimum, & contrà, &
sanit. tuend.

Periclymeni fructus drachmis tribus, radicis
eiusdem drachma tres, lib. 9. comp. phar. part.

Phœnicobalanorum pinguium carnis drachmis
tribus, Palmule seu Dactyli tres, aut sex, Gal.
lib. 7. comp. phar. part. in arteriac. 15. An-
dromachi.

Psykko, Lens palustris.

Petroselino Macedonico in Theriaca, alterius rē-
gionis Petroselinum, Galen. lib. 1. Antid.

PRO Resina fricta, Pix, aut Pix Bruttia, Gal.
lib. 9. comp. phar. part.

Rubigine, Scoria ferri.

Raphani seminis drachmis decem, succi eiusdem
cyathus unus, Gal lib. 9 comp. phar. part.

Rosis, flos Rosarum, vel contrà, Galen. lib. 6.
comp. phar. part.

Rhoë coriario, Rhus obsoniorum; & contrà,
Gal. lib. 6. comp. phar. part.

PRO Staphide agria, Pyrethrum.

Spodio Gracorum, cinis super fornacem auro-
riam inuentus, melior quàm Ebur vsum,

quod nescio cur hodie Barbari Spodium vocent.

Syrace, Castorium.

Sale Indo, Saccharum candefactum.

Sagapeno, gummi Cedri, Hammoniacum, Resina picea sicca.

Spuma Nitri, Nitrum molle, vel Aphrenitrum. Gal. lib. 3. comp. phar. part.

Sulfure vino, flauum vel vstum & purgatum.

Saiyrio, semen Eruca, vel Scincus, vel contrà.

Sinapi, Cardamenum vel Cardamum.

Scammonio, Ricinus.

Stibio confuso, squama eris, Hannum vstum.

Sepia osse, Pumex.

Serapiade, Paonia radix.

Scilla, Bulbus.

Struthio, infernuamentis, Elleborus albus.

PRO Terebinthina, laricea dicta Resina, ei propemodum similis, Gal. 1. lib. comp. ph. gen.

Thapsia succo, Chamaleontis nigri succus, vel Nasturtium; vel Nasturtii aut Eruca seminis pondus equale; licet illa sint multa inferiora Thapsia. Galen. lib. 1. comp. phar. part.

Tamaricis succo, succus Sambuci. Gal. lib. 9. comp. phar. part.

PRO Veratro albo, nigrum.

Visco quercino, Chamaleon niger.

Vino Falerno, aliud quoduis colore fuluum, substantia tenue, ut perluciat, & sit odorum vehementer, ut Arnisium [vel Ariusium]

ex Chio,

ex Chio, Lesbium, ex Mitylene, Cresso, Methymna, & Imolites; Galen. lib. 1. comp. phar. gen.

PRO Zedoaria, Aristolocbia.

Zingibere, Pyrethrum.

Ἀνὴρ ἀδιόρητος, vel horum aliqua vel alia, potest quacvis regio noua, desideratis facultate afficia facere, doctorum medicorum consilio: nam si Arabibus & Gracis pro Sinapi Cardamomum, fortè ipsis frequentius, licet substituere, quidni pro Cardamomo frequentissimum nobis Sinapi usurpabimus? praesertim cum ut pro Ginnamomo Casiam, sic contrà pro Casia Cinnamomum assumi probauerimus: idemq; in aliu faciendum puto. Ob id Galenus lib. 7. simplicium, Melissophyllum (inquit) Marrubio facultate simile, sed ipso multò imbecillius; ob id Melissophyllo utitur nemo. Nam absurdum fuerit, praesente ubique terrarum magno Marrubii prouentu, vii Melissophyllo. Si cui verò ad manum non fuerit Marrubium, Melissophyllo vii poterit, obseruata eius praello imbecillitate, ut ob id quantitas eiu augeatur. haec Gal. Quae ratione pro Cinnamomo duplum Casia optimè miscemus medicamentis, ut quantitate qualitatibus imbecillitatem redimamus.

Quae igitur apud singulas gentes sunt copiosa, modò sint facultate proxima his quae desiderantur, quia faciliores sunt paratu, ponantur: ut in Asia in frigidis capitis affectibus, aut in declinatione calidorum, rustici Cedrio dicto

utuntur : eius penuria Pisselao , id est, Pice & Oleo mistis liquida forma: interdum etiam Cedrio & Pisselao simul magis & minus mistis, prout vires eius intendere student. Hoc autem linunt sinciput, nares, frontem, aures, & quibusdam plantam & sedem. Gal. lib. 2. comp. phar. pari.

Sed videmur Antiballomenis non egere, qui magna cura iam simplicia generis omnis in promptu habeamus : imò maximè egemus, cum multa simplicia veteribus laudatissima (ut Theriaces compositio docebit) hodie nobis parùm sint cognita. Quae ubi certa erunt, his utendum potius, quàm Antiballomenis. Ut enim pluri est equo domini oculus, quàm equisonis industria; pluri agro domini vestigium, quàm villici stercoreisatio; pluri familia paterfamilias, quàm procurator; pluri prator, consul, rex, pastor, quàm proprator, proconsul, prorex, mercenarius : sic plus tribuendum puto his quae maiores magno delectu & ratione optima in compositiones cooptaverunt, quàm quae illorum loco coacti adoptamus. Haec haëtenus ex Iacobo Silvio.

PETRVS COVDEBERGIVS
PHARMACOPOEO.

LIBELLVM hunc , Pharmacopœe candidè , denuò percurrissem , atque exactiùs ruminassem , loca agrotata reliqua leniendo , ac nubila Scholiis illustrando , extremam illi manum adhibens ; nisi otium , opusculi angustia , typographi quoque commoda occasio , atque immaturæ quodammodo frugis extorsio , perorare me , atque vela ventis committere coëgissent . Omnia itaque hæc , cùm obiter saltem , ex tempore , & tamquam ex transcurso tibi tradantur (etenim ne tantillam quidem à Pharmacopœo vestræ farine homine , cuius tamen propriè muneris est , hætenus nostro seculo prodisse cognoscitis) æquè sunt consulenda animo , dum meliora dare Deus permiserit .

F I N I S .

V S DE

SVCCEDANEORVM COLLECTANIA

MATTHIÆ LOBELII,

*aucta & recognita, ex classicis auctoribus,
IMITATIONE RONDELETTII,
e cuius Fragmentis & Praelectionibus
haec ferè decerpta sunt.*

CV Mattentiore lectione animaduertissem vulgatum SVCCEDANEORVM libellum, quem nonnulli Galeno, alii Paulo acceptum ferunt, scaterere mendis, & plerisque locis mutilum esse; utpote qui ex Græco in Arabicum, & de Arabico sit denuò Latine versus, aut potius peruersus, à Mauro quopiam, vel Mauro Græco, qualis fuit & Aëtvarius; visum fuit, quæcumque Dioscorides, Galenus, Aëtius atque Paulus litteris mandassent, experimentaque tum veterum tum recentiorum confirmassent, seligere; eaque sic digerere, ut quid alteri cuius equipolleat, studiosis in posterum pareret.

Hunc autem libellum neoterici cuiuspiam esse, vel id plus satis arguit, quòd nonnulla addita inibi sint, quæ Galeni tempore ignota fuere, uti Anacardia, aliaque complura: nullo tamen ordine aut delectu, ac sine iudicio. Ut, quòd fortè
Cha-

Chamæmelini legerant alicubi, nominis
decepti affinitate, Melinum subdiderunt;
quàm inſcitè, nullus eſt qui id ignoret:
illud enim laxat, & moderatè calfacit;
hoc verò refrigerat, aſtringitque. Ea-
dem ineptia, quòd fortè Cepæam Pottu-
lax ſimilem legiſſent, illius vires huius
facultatibus reſponſuras putârunt. Itidem
Leporem fluuiatilem Cancri loco uſurpa-
ri; vel ut alius quiſpiam correxit, mari-
num, indoctè: ut qui ignorâſſe videatur,
Cancrum alimentum & antipharmacum
eſſe; Leporem verò [marinum] vel odore
ſolo vomitorium, & venenum. Nec hoc
falſum ſolummodò, at & diſcriminis ple-
num, cùm loco Opobalsami Opocarpa-
tion ſubſtituunt, quod venenum frigi-
dum eſt Dioſcoridi, vinoque, uti Cicuta,
expugnandum, teſte Galeno, libro De an-
tidotis. Verùm ſi hîc Carpaſon legamus,
vera fuerit lectio: eſt enim tenuium par-
tium. Cinnamomo item Beben rubrum
reſpondere nequit. Neque placet ordo
ſeriesque collationum: nam olea oleis,
non reſinis aut aquis ſunt conferenda; ut,
quoad eius fieri poteſt, ſint ſimillima.
Deinde, ſi non licet ex ſpecie proximâ,
ſaltem è genere, cùm abundemus probis
remediis. Nec parui facio regionum ubi
naſcuntur proprietates: veluti Cretica-
rum plantarum, quas Italicis efficacioreſ

puto; nisi squalida admodum aut retorrída fuerit æstas, quæ deficiente alimentoplasmas tabefacit: tum enim Polium Italicum, aut Stœchas non cedunt Cretico, aut è Stœchadibus insulis.

Imperitiæ fatuæ est, substituenda præcipere rarioribus inuentu, ea quibus caremus, aut adulterata; vt loco Cinnamomi, Amomum. Insaniæ itidem, vbi abundamus Lactucâ, Opocarpantium optare Licuerit tamen, si qua sint rariùs obuia, aut minùs trita, eorum loco vsurpare viribus similia; vti Terebinthinæ veræ loco, Lentisci Resinam, quia frequentior est.

Cùm autem Succedaneis vti non rarò cogamur, nec enim omne fert omnia solum; nec vbiuis medicamenta opportuna occurrunt: (ruri enim *ἀπορίαι* siue facile parabilibus vtendum; & cùm medicamenta necessaria ad repentinos casus ad manum minimè sint, præsentibus vtendum) eligenda erunt quæ nostris simplicibus substitui possunt: vt Galenum fecisse legimus; cui Euphorbium cùm ad spicula, aculeos & infixa eximenda deesset, ex alueariis Propolin pro Euphorbio felici successu vsurpauit.

Succedaneorum verò vsus hodie magis est necessarius, quàm vmquàm fuit; cùm multis quæ antiquis in regionibus suis exortiuis & exoticis diues & vber prouentus

tus sufficiebat, hodie careamus; tum suppositicia, Hebræorum & mercatorum vafro ingenio adulterata, transuehantur; quæ si reiicienda, alia substituere necesse est. Adhæc pleraque prisca simplicia medicamenta exoleta antiquitus notissima & vſitatissima, hodie ignorantur.

Permultæ Arabibus excogitatæ & vtilles inuentæ cōpositiones, efficacissimaque remedia in vſum recepta: quorum simplicia, barbarie vocum, nobis prorsus ignota sunt. Quid enim nominibus illis barbaris significare voluerint, nescimus; aut illis caremus. At in Succedaneorum delectu & vſu, pessima illa medicorum consuetudo merito reiicienda, quæ iam à multis annis inualuit, magno ægrotantium incommodo; qua in compositione remediorum omnia quæ commendata sunt vel ad morbum, vel ad partem affectam, vel aliquod symptoma, congerunt temerè; & cū omnia similia vſurpârunt, haud habent amplius quod pro ea herba aut medicamento substitui possit. Quòd si vna, duabus, vel tribus herbis contenti essent, numquam Succedaneo destitueretur pharmacarius. Sin autem quantitas necessaria foret, pro manipulo adde duos, pro duobus tres vel quatuor. Hinc duo consequentur comoda; certior medicamenti operatio, facilior & citissima præparatio;

pluribus remediis & Succedaneis, summo artis Medicę ornamento, abundabit medicus; cui iterare, immutare, supponere pharmacæ licebit, & plus quàm vulgus Medicorũ & Clinicæ sapere. Vt si in suo decocto Foraginem præscribat; ea si defuerit, Buglossum agreste substituere, vel contrà: si Scariola defit, succum substituere vel syrupum licebit: si Cichorium, Dens leonis, vel Endiuia; si Chamæpitys, Chamædrys substituatur, si defit; vel contrà. Sed quid faciet, si omnia congerantur in vno eodemque medicamento? certè nihil aliunderit, quàm poëticum illud Chaos, Rudis indigestaque moles.

Illud Villanouani ante oculos voluant: Vbi in promptu habentur simplicia, dolum esse si quis compositis vtatur.

A praua igitur consuetudine recedant: & illos tamquam scopulos vitent: caueant item malos, anaros, improbos, impudentes pharmacarios & circulatores, qui nummi & lucri rapaces, farraginem medicamentorũ etiam semiputridorũ inter se pugnātium collaudant. Quidam hoc faciunt, vt copiam ostentent, vel ignorantia, vel superbiâ; & aliqui docti, ne videantur in remedium cognitione minùs exercitati.

Blaces quidam medicaſtri, impostores nobiles, populares agyrtae, histrionesque Hippocratici, Aureiue Aureoli Theophrasti

phraſti aſelli (cuius tamen documenta vix ſummis deguſtârunt labris, quosque magiſtri pudet: quemque neque agnoſcere neque tutari audent, ne apud doctos, & vulgus, ob circulatorum, qui falſo diſcipulos Theophraſti ſe glorientur, illuſiones & technas malè audiant) e mentitam, irrationalem, garrulam, pettinacem, perfrictæ frontis impudenciam, mordicus nouam philoſophiam effutiunt, oblatant, & pro ſua oſtentant; Panaceâ ſcœdâ vnicâ, ſiue decocto parato ex omni confuſâ herbarum, etiamque deleteriârum, nullius delectûs, inter ſe ex diametro pugnantium, malignâ & infauſtâ ſideratione collectarum, farragine, additâ Senâ, Cinamomo, Saccharo, & huiusmodi, ad ſaporis gratiam, pro vniuerſali omnium humorum, anili medicatricum & obſetricum cohorti notiſſimo, fieri & contenti, ad omnes morbos, quos Ariſtotelicis & Hippocraticis ſectatoribus incurabiles iactitât, à ſe viginti quatuor horarum ſpatio percurari poſſe, ilicò vtique & vbicis pollicentur; impoſturâ, ſupinâ audaciâ, & gnathonicâ adulatione, nullis interdictis aquis noxiis, & quibus morbi fouentur, eduliis.

Huiusmodi homines potiùs ſcuticâ digni ſunt, quàm papyri & temporis iacturâ in deſcribendis illorum ineptiis,
men-

mendacii & imposturis. In illos sanè Reges, Leges, & Medicorum celeberrima Collegia deberent animadvertere, eosque ex Republicâ propellere; doctos autem viros fouere & erigere: qui (proh dolor) hodie multis locis pereunt, & haudquam ab improbis & indoctis logodadalis scamnidicis discernuntur.

Porro cùm sint quædam compositiones viles priscis medicis excogitatæ, experientiâ & ratione receptæ & comprobatæ, nonnulla Succedanea inuestigare, agnoscere, & sufficere oportet, vt parari possint nobilissima pharmaca, quæ eâ ratione minimè excludenda & reicienda: cùm non tanta infelicitate Succedanea quædam illis non inferiora interdum æquè bene expleant omnes pollicitationes genuini medicamenti.

SVCCEDANEA, quantum fieri potest, eiusdem sint generis & speciei.

Rondelet. Herba pro herba.
 Radix pro radice.
 Flos pro flore.
 Semen pro semine.
 Succus pro succo.
 Lachryma pro lachryma.
 Resina pro resina.
 Muccago pro mucagine.

Metal-

Metallum pro metallo.

Lapis pro lapide.

Terra pro terrâ.

Pix pro pice.

Axungia pro axungiâ.

Medulla pro medullâ.

Avis pro auc.

Serpens pro serpente.

Pars animalis pro parte.

COMPOSITIO PRO COMPOSITIONE.

Pulvis pro pulvere.

Trochiscus pro Trochisco.

Opiata pro opiatâ.

Electuarium pro electuario.

Pilulæ pro pilulis.

Eclegma pro eclegmate.

Tabella pro tabellâ.

Confectio pro confectiione.

Conseruatio pro conseruatione.

Syrupus pro syrupo.

Emplastrum pro emplastro.

Oleum pro oleo , siue simplex,
siue compositum.

Vnguentum pro vnguento.

THEO.

THEOREMA VNIVERSALE VEL COMMUNE.

<p>Medicamentum quod substitui debet, siue in- ternis, siue ex- ternis conueni- re debet: nempe</p>	<p>Viribus occultis, ma- festis, & consisten- tiâ. Sit etiam simile in Sapore, Odores, Ætate, Natalitiis & regione, Natura & tempera- mento.</p>
---	--

Nonnulla in externis remediis supponuntur, quibus in internis vii non licet: vt succus Carpathi substitui potest pro Lactucæ succo in externis; cum tamen venenum sit, non introsumitur.

Non totum simplex, sed aliquæ partes substituuntur.

Vt Muccago seminis Psyllii, pro mucagine seminis Cydoniorum: non totum semen, quia pars interior temperamento differt à mucagine, & venenata putatur. Neque etiam Cydonium malum conuenit pro semine suo, quia viribus & consistentiâ differt.

Formula quædam in quibusdam remediis sibi mutuo succedunt: vt,

Conseruatio, pro syrupo eiusdem simplicis,

plicis, fuctus, floris vel radicis.

Conseruatio Capillorum Veneris, pro syrupo in opiatâ substitui potest: Sed in syrapi consistentiâ non potest; quia remedii formula non patitur.

Pro liquidis liquida substitui debent: quare deficiente syrupo, aqua vel herbæ decoctum substituatur.

In quibusdam conditis supponere licet syrupum conseruationis; quia in syrupo conseruantur. Vt syr. Conseruationis Citri, pro syrupo è corticibus Citri. Syr. Conseruationis radicis Buglossi, pro syrupo de Buglossò.

Emplastris item pro Vnguentis vti licet; & contrâ, modò pars affecta assentiatur: vt Emplastro filii Zachariæ, pro vnguento Resumptiuo; & Resumptiuo, pro emplastro. In thoracis verò affectibus, nisi dissoluantur aut malaxentur, non vtendum; quia emplastra imposita dilationem costarum & respirationem impediunt.

Emplastrum è Cerusa, pro Vnguento albo, nisi inflammatio prohibeat: quæ neque dura, neque graua ferre potest.

VARIA ALIA MEDICAMENTA
PRO ALIIS SVSTITVERE LICET,
modò vires correfpondeant.

Pilulæ pro Confectionibus, & Confectiones pro pilulis. vt,

Hiera fimplex pro Pilulis de Hiera & Benedicta; & contrà.

Et pro pilulis Pituitofis, Electuarium Diacarthami, de Citrofolutium.

Pro Biliofis, Electuarium de fucco Rofarum, & contrà; obferuata cuiusque quantitate. Hieræ & fimilium Electuaria doses augendæ, ob mellis molem, quæ medicamento vires minuit.

Syrupus pro Eclegmate, fi lambendo affumi debeat: vt

Syr. Iuiubarû, pro Lohoch fano & experto. Syr. è Papauere, pro Diacodio.

Puluis pro Trochifco, & contrà: vt

Diarrhodon pro Trochifcis diarrhodon.

Trochifci de Squilla, pro Eclegmate de Squilla: auctâ vel imminutâ quantitate, pro ratione, indicatione morbi, & fco po medici.

In fimplicibus partes aliquando religiofè non obferuantur. vt

Turbith pro Agarico trochifcato, & contrà. Hîc fimplex pro composito ponitur, vel compositum pro fimplici.

Pre

Pro Agarico Colocynthis, in minori quantitate. Carthami duplum & triplum, pro Agarico; & contrà.

Difficile tamen inuentu simplex medicamentum substituendum, quod verè vndequaque omniq̃ue ex parte conueniat, vt testatur Auicennas in suo Canone; vbi vix reperiēs duo simplicia medicamenta, quæ aliorum facultate similium pænuriâ, substitui tutò possint. Quod cùm difficillimū foret, illè aliquando duo, interdum tria, pari pondere & mensura, nonnunquam duplicato & triplicato, addita quinta aut octaua parte alterius medicamenti, supponit. Quia paucissima sunt medicamenta, quæ omnino simile temperamentum obtineant, aut eandem consistentiam, crassitiem, tenuitatem partium, & proprietates occultas.

Variis in compositionibus est medicamentorum vsus.

Vel ob calorem, frigus, humiditatem, siccitatem; in principio primi, in medio & primo gradus, & sic de aliis.

Vel ob partium tenuitatem, vel crassitiem, lentorem, saporem, odorem, colorem: quare id quod temperamēto respondet, sæpe dissidet crassitie vel tenuitate partium; vel alia facultate. vt pro Asaro Acorum substituendum censent. At in omni operatione non conuenit: non enim omnia

nia potest Acorus quę Asarum. Urinas quidem & menses ciet : (quare in vreticis tantum supponendum :) vomitum verò excitare, aquasque educere, vt Asarum, minimè valet.

Eadem ratione Hyacinthus pro Anchusa substituitur: Sed si ob colorem Anchusa opus sit, vt in vnguentis, Hyacinthus non conueniet.

Eius verò loco Lacca supponitur, vel Brasilia, Santala rubra, Lacca piclorum, vel Coccos baphica.

Assa dulcis pro Fœtida non conceditur, propter odorem, vt Auicennas substituit in affectibus vteri; quia odore iucundo vterum sursum alliceret: sequitur enim odorata vterus, fugit fœtida.

Propter saporem quædam vsurpantur; sed non conueniunt vndequaque.

Pro Saccharo Mel & Manna substitui poterit in quibusdam remediorum formulis, vt in medicamentis laxantibus, minimè autem in adstringentibus, quia Manna ventrem soluit magis quàm Saccharum vel Mel.

Muccus utilis est in fluxu sanguinis, & ob lentorem vsurpatur Fœnumgræcum, quod muccaginem reddit, sed calidam: idè in sputo sanguis reicienda, quemadmodum in externalis remediis, vt ophthalmiæ, in qua Ovi albumen præfertur
qui;

quidem in principio & incremento; in statu verò & declinatione muccago Fœnugræci commendatur.

Quæ supponuntur, non in omni formula remedii substituuntur: vt

Myrrha pro Bdellio, in pilulis & vnguentis:

Sed in pilulis è Bdellio, nullo modo conceditur, quia sanguinis fluorem & hæmorrhoidarum, vt menses Myrrha, elicit.

In **SUBSTITVTIS** igitur hæc obseruare oportet, vt supposititium in locum adulterati, genuini pænuriâ, eadem efficiat quod ipsum genuinum præstabat.

Vt si calfaciebat, refrigerabat, humectabat vel siccabat, adstringebat, vel laxabat, vel concoquebat.

Pro Absinthio simpliciter dicto in compositionibus Græcorum, Seriphium vel Santonicum.

Pro Absinthio è Pontō vel Tauro monte, Romanum.

Pro Romano, illius loci vbi habitas.

Hoc licet in omnium herbarum deleat præstare, quæ sunt alicuius regionis [propriæ;] modò illam ipsam herbam regionis finitimæ, vel saltem simillimæ, assumas. Cuiusmodi est *Craux* vulgò Gallo-Prouinciæ, siue Creta, vbi *Thymus nostrâs angustifolius* & *Epithymus optima* & copiosissima.

Secun-

Secundo loco herbæ regionum humidarum, modò estas squalida aut siccior fuerit, in locum calidarum substitui possunt. Quod fecisse se Galenus docet in præparatione Theriaces.

Pro Macedonico Petroselino, Petroselinum alterius regionis.

Sed regionis similitudinem observare oportet : nam regio auget vel minuit medicamenti efficaciam & bonitatem.

Pro Iride Illyrica, Venetam sumemus; & Pro Africana Florentinam.

R A D I C E S.

Pro { Rhapontico, Radix Centaurii maioris, vel nostri Rhabarbari magma, siue Rhabarbarum ad alios vsus priùs infusum, & expressum. Rhabarbarum torrefactum improbatur à multis, propter empyreuma.

{ Zingibere, Costus; & contrà: vel Helenium, & Pyrethrum.

{ Costo, Pyrethrum.

{ Aristolochia Longa, Rotunda; & contrà: vel vna pro omnibus.

{ Acoro, Calamus aromaticus officinarum; & contrà.

{ Acoro, (in laxantibus & cientibus urinas & menses;) Radix Asari.

Asaro,

Asaro, (quando purgare, & vomitum ciere opus est,) Elleborus, semen Genistæ & Raphani; vel hæc tria simul.

Galanga, Cyperus rotundus; & contrà.

Calamo odorato Libani, Schœnanthum, Calamus siue Acorus officinarum: si ad odorem solum, Santalum citrinum officinarum.

Althæa, radix Maluæ hortensis, vel sylu.

Asparago altili, Corrudæ, immixta quantitate, quia acrior & efficacior.

Rusco, Radix Asparagi; & contrà, Cortice radices Capparis, Cortex radices Tamarisci, Sambuci, Ebuli, Populi & Lauri.

Apii radice, Petroselini, vel Macedonici.

Gentiana, medietas Asari & radices Capparis.

Turbith, Thapsiæ radix, siue Turbith Mesuæ, Agaricus trochiscatus, vel Colocynthis, minore dosi.

Zingibere, Mechin.

Serpentaria, Iarus, Dracunculus.

Lapathum, Oxalidis radix.

- Pro { Rhabarbaro ad laxandum , succus
Rosarum.
Rhabarbaro ad astringendum, Hy-
drolapathi radix , vel Galangæ
maioris, si calore opus est ; si re-
frigeratione , radix Bistortæ.
Nardo , Nardi species.
Secacul, radix Pastinacæ marinæ.

SVCCEDANEA , QVANTVM

FIERI POTEST, SINT SIMILIA

*omni ex parte , viribus , genere,**& specie. ut,*

Omnes Dauci spe-	Calaminthæ,
cies,	Cepæ,
Intubi,	Chelidonii,
Adianthi,	Costi,
Condrillæ,	Nardi,
Hieracii,	Betæ,
Rumicis,	Bliti,
Absinthii,	Iuniperi,
Abrotoni,	Sabinæ,
Sideritidis,	Cedri,
Aconiti,	Rhamni Dios.
Veratri,	Myrti,
Anagallidis,	Piperis,
Anchusæ,	Cyclaminis,
Anemones,	Ranunculi,
Asparagi,	Hederæ , excepta
Brassicæ,	Hederula terrestri,
	Rutæ,

Rutæ,	Heliotropii,
Seseli,	Origani,
Apii,	Aristolochiæ,
Rosmarini,	Valerianæ,
Marrubii,	Bituminis,
Leucoii,	Picis,
Orcheos,	Resinæ,
Maluæ,	Allii,
Polygoni maris & feminæ,	Porri,
Symphyti,	Plantaginis,
Tribuli,	Panacis,
Rubi,	Pastinacæ,
Equiseti,	Lychnidis
Viticæ,	Conyzæ,
Tithymalorum,	Nymphææ,
Mercurialis,	Anthemidis,
	Verbasci.

Et denique omnes, nisi quid proditum inhibeat: ut de Clematide; quarum Alteram vrere, ventrem laxare, bilem, pituitam trahere scribit Dioscorides: Prior verò [Clematis] alui profluvia & dysenterias sedat.

Sic Cucumis agrestis, & satius; Peppo & Colocynthis. Sed hæc paucis euenire solent.

De PARTIBVS etiam obseruandum. Nam aliquæ facultatibus differunt: ut radix Medii menses decocta sistit, per aliquot dies sumpta: semen autem in viro sumptum, menstrua pellit.

Iuniperi fructus introsumuntur ; ramenta verò occidere produntur.

Coriandri herbæ succus interficere creditur ; semen verò medicatum.

Qua ratione medicos minimè vniuersalibus, sed potiùs particularibus niti præstaret. Nam eorum plerumque est maxima differentia, quæ eadem esse putantur.

Sume igitur

Pro Folio Indo , & Malabathro , folia Citri, Canellæ vel Malabathri vulgaris : vel, vt alii, Macin, aut Spicam.

Pro foliis Lauri, Citri folia.

Papaueris albi, Solani folia , Papaueris nigri, minore quantitate ; vel Hyoscyami albi.

Lactuca, Scariolam ; & contrà.

Cichorio syluestri , Dentem leonis.

Pro Eupatorio , Asarum, & dimidium Absinthii.

Pro Struthio, Nucem vomicam, & tertiam partem Piperis , Auicennæ.

Pro Dictamni prima specie , secundam, tertiam ; vel Pulegium Ceruinum.

Calamentha montana prima , secundam, & tertiam. Sic de similibus.

Pro Chamæpity, Chamædryn, & folia Eupatorii.

Malua syluestri, hortensem.

Malua arborecente, Althæam.

Thlaspi, Nasturtium.

Men-

Mentha, Balsamitam

Pulegio Regali, Ceruinum; & contrà.

Lepidio Pauli Æginetæ, Drabam, vel Iberida, vel Nasturtium.

Phyllitide, Asplenium siue Scolopendrium, Ceterachve; & contrà.

Foliis Oleæ vel Lentisci	}	Folia	{	Nucum Juglandis,
				Cupressi,
				Pini, vel Pinastris

Foliis Myrti	{	Baccas Myrti, vel Juglandis nuces immaturas.

Thymo, Satureiam, vel Origanum.

Ruta syl. Rutam domesticam siccata, maiori quantitate; vel contrà.

Spica Lauendula, Lauendulæ species hortenses.

Adiantho, Saluiam vitam, Polytrichum, Adiantum nigrum Plinii: in asthma, Violæ par pondus, cum medietate Glycyrrhizæ.

Telephio, Portulacam.

Portulaca, Umbilicum Veneris.

Foliis Terebinthi, Lentisci folia.

Foliis Oleastri, Oleæ folia.

Foliis Sambuci, Ebuli; & contrà.

Betonica, Verbenacam.

Melissa, Marrubium, Corticem Citri: & contrà.

Apio montano, domesticum siccum, in maiori dose.

Cepæa, Portulacam.

Nardo montana, Nardum Gallicam.

Philyreæ foliis, Oleræ folia; & contrà.

Foliis Caprifici, Ficus domesticę folia; & contrà.

Thymbra, Thymum vel Serpillum.

Coriandri foliis, Petroselini hortensis folia, in externis remediis tantùm.

Hippomarathro altero, Coriandrum vel Petroselinum domesticum.

Foliis Dauci, Pastinacę agrestis vel domesticę folia.

Conyza prima, secundam.

Conyza secunda, tertiam, maiori quantitate, & siccata.

Sanguinalis feminę foliis, folia maris; & contrà.

Hippuride prima, secundam; & contrà.

Semperuino maiore, paruum Umbilicum Veneris; & contrà.

Foliis Labruscę; domesticę Vitis folia minùs cultę.

Chamelęa, Thymelęam, Chamępityn primam Dioscoridis, Laureolam.

Alsinę foliis, Helxines folia; & contrà.

Vite alba, nigram; & contrà.

Bubonio, siue Inguinaria, siue Astere Attico, Antirrhinum; & contrà.

Foliis Sabinę, folia Cupressi, Iuniperi, & Cassiæ.

Dorycnio, Mandragoram; & contrà.

Dra-

Draguntio, Arum.

Foliis Abietis, Populi folia.

Eryfimo, Erucam; & contrà

Foliis Hippolapathi, Lapathi folia.

Foliis Piccæ, folia Pini.

Lathyridis foliis, Tithymali folia.

Libanotide sterilis, folia Libanotidis coronariæ.

Lepidii foliis, Nasturtii folia.

Nymphaea alba, luteam; & contrà.

Sorbi foliis, Mespili folia; & contrà.

Oxyacantha vera, Pyrastrum.

Foliis Pepli, Tithymali folia.

Pityusæ foliis, Tithymali folia.

Polygoni maris foliis, feminæ folia.

Filice femina, matrem.

Seride, Condrillam.

Smyrnio, Apium aut Petroselinum.

Solano hortensi, Halicacabum.

Symphyti Petræi foliis, alterius folia.

Pro Beta alba, nigram.

Pro vnus speciei Tithymali foliis, folia aliorum, in laxando.

Pro Tragorigano, Origanum; & contrà.

Pro foliis Tribuli terrestris, in refrigerando, folia aquatici; non in humectando.

Pro Hypecoi foliis, folia Papaueris.

Pro Verbasci vnus foliis, aliorum folia.

Pro Spicâ Indicâ, Syriacâ, Valerianam.

Pro Viticis foliis & semine, Rutæ folia & semen.

Pro Seridis foliis, Lactucæ folia.

Pro Myrto alba, nigram; & contrà.

Foliis Myrti, folia Pyri siluestris, Sumachi, Lentisci, Sorbi, Cydoniorum; & Cotinos.

Pro Semperuiuo, succum Lactucæ, & Solani.

Colocynthide, triplum Cucumeris asinini.

Pro prima specie Calaminthæ, secundam; pro secunda, tertiam.

Pro Buglosso siue Boragine latifolia, Buglossum angustifolium.

Pro Soncho læui, Sonchum asperam; & contrà.

Pro Fumaria, Senam.

Pro Hyslopo, Origanum, Sampfuchum.

Pro Hyperico, Androsæmum, Ascyrum, Schœnanthum.

Pro Stœbe Diosc. Stœben herbariorum, Iaceam, Scabiosam, Pastoriam bursam, Bellides, & Gnaphalia.

Pro Halica Auenæ, ptisanam totam.

Pro Amylo, farinam filiginis siccam.

TABVLA PRIMA, REFERENS CAPSVLAS
RADICVM ET CORTICVM.

5	Costivs.	Cinnamomu sive offic. Cassiatenuis	Cortex inter- nus Nucis Moschatæ	Asarum	
4	Zedoaria	Cassia sive of- fic. cinnamo- mum crassum	Nux Moscha- ta.	Schœnan- thum	pro Corti- ce Turis
3	Zerum- bet	Phu	Macis	Spica Nardi	Cortex Pini
2	Mequin.	Anthophylli	Pro Folio malobathri	Spica Cel- tica	Cortices Lentisci
1	Pro Zin- gibere.	Cypero	Garyophyllis		

Cortic. Quer- cus	Cortic. mali Granati.	Cortic. My- robal. Citri- narum
Ilicis	Cortex Nucis Inglanidis	Kebularum
Suberis		Indarum
		Emblicarum
		Bellericarum

In hac tabella primùm reposuimus Zingiber, quia frequentius eo utimur quàm Mequin (quod species est Zingiberis:) si forte alterum pro altero sumatur, nihil inde mali sequetur. Zerumbet, Zedoariam & Costum in ultimis capsulis reposuimus, quia eis minùs frequenter utimur. Hoc modo medicamentis dispositis, multo minori negotio medicamenta parabuntur; ut quæ frequenter in compositionibus simul ponuntur, simul inucniantur. Adde quòd hæc medicamento-
rum dispositio, *αὐτὸκατάλογος* indicabit. Nam quæ in prima capsula ponuntur, pro secunda poni possunt; & è contrà, dimi-
nuto pondere. Cùm dicimus quantitatem
augeri,

CAPSVLA RADICVM TERTIA.

5	Grami- nis						Glycyt- rhizæ
4	Aspara- gi				Staphisa- gitiæ		Tuffila- ginis
3	Rufci	Oenan- thes	Aristol- chiz om- nis	Bryoniæ	Zedoariæ	Cyper	Helenii
2	Petro- felini rad.	Rubiz maio- ris	Afari	Pyrethri	Costi	Galangæ minoris	Veneræ radix
1	Pro Apio	Penta- phyl- lo.	Cappari	Mequin	Zingibere	Galangâ crassâ	Iride Floren- tina

Pro Gentianâ dimidium, Afari, & radice Cappari.
 Polypodio, Epithymi dimidium pondus.
 Testiculo, Vulpis, Scincus, & è contra.

CAPSULA RADICVM QVARTA.

493

3	Cucumeris agrestis	Centaurei minoris	Polypo- dii	Ellebori vriusque		Hermoda- cylorum
2	Asphodeli	Suc. Rosa- rum	Tur- bith	Ebuli	Asari	
1	Pro rad. Gentianæ	Rhabarbari	Agari- co	Hermoda- cyl	Cyclaminis	Asphodelo- rum

CAPSULA RADICVM QVINTA.

3	Boraginis		Maluarum	Thapsi barbati	Spondylii	Radix Vlmi
2	Buglossi	Behen rubri	Bismalua- rum	Bifloræ	Pancretatii	Consolidæ minoris
1	Pro rad. Glycyrrhi- zæ	Behen albi	Lilio- rum	Quinque- folii	Squillæ	Pro radice Consolidæ maioris

CAPSVLA RADICVM SEXTA.

1		Corticis rad. Lauri	Asari	Staphidis agriæ	Behen rubri
2		Cor.rad.Sam- buci,&Ebuli	Ari	Clematitidis alterius, siue flammulæ	Behen albi
3		Fraxini, vel Populi	Serpentaræ	Rad. Dentil- laræ	Boraginis
4	Rubicæ mino- ris	Tamarisci	Raphani agrestis	Pyrethri	Buglossi
5	Pro rad. Ru- bicæ maioris	Corticis rad. Capparis	Corticis Sam- buci		Glycyrrhizæ

TABVLA SIVE CAPSVLA SEMINVM.

I 2 3 4

5	Pro sem. Cucurbitæ	Melonum	Citrulli	Cucumeris
4	Lactucæ	Portulacæ	Endiviæ	Scariolæ
3	Violarum	Papaveris albi	Papaveris nigri.	Hyoſcyami
2	Bombacis	Malux, Bifmalux	Pſylli	Cydoniorum
1	Lini	Fœnugræci	Lauendulæ	Keyri rubri vel citrini

CAPSULA LIGNORVM.

5	Citrinum Sant.	Xylobalfamum	Scobs Buxi
4	Rubrum Sant.	Surculi Lentifici	Ebenum
3	Pro Santalo albo	Aspalathus	Guaiacum
2		Ligno Aloës	Echinæ radic.
1			Salfaparilla

	1. pro Scāmonio	2 Diacridium	3 Colocynthis	4 Ammoniactm
	Senā	SemenCathartici	Folia Brassyficiatinnæ	3 Salgeminae
	Folius Scāmonii	Thymelææ	Chamaeæza	2 Salpetra
	Seminehedeæ.	Sem. Afari	Semen Genistæ	1 pro Sale nitro

4	Thymus	Chrysocol- la, vel fortè Chrysolith,	Elleborus albus	Alhan- dal	Coccus Cnidius	
3	Epithy- mus	Lapis Ar- menus	Ell. Niger	Diacti- dium	Semen Ca- raputæ	Rhaponti- cum
2	pro Cassi- tha	Lapide La- suli	Colocyn- thide	Scammo- nio	Rad. Ti- chymali	Myrobala- ni f.
1						Rhabarba- ro

Polypo- dium	Rhabarba- rum	Chamaæza	Efula
Turbith album	Lapathio	Thymelæa	Turbith
Turb. ci- netio		Brassicâ inatinâ	Polypodio

SEMINVM.

5	Capita Papaveris	Acetosa						
4	Semen Mandragoræ	Portulacæ	Citrulli					Semen Violarû
3	Sem. Hyoscyami	Scariolæ	Melonum	Bifmaluæ	Fenugraci			Cnici
2	Papaveris nigri	Endiuiz	Cucumeris	Maluarum	Lini			Vericæ
1	Sem. Papaveris albi	Lactucæ	Cucurbitæ	Bombacis	Sesami			Cydoniorum

SEMINVM.

5	Cumini	Pastin. syl.	Rutæ agrest.		
4	Carui	Pastinacæ domesticæ.	Rutæ domesticæ	Sinapi	Semen con. tra vermes
3	Fœniculi dulcis	Petroselin	Ammeos	Erucae	Caulium Hyperici
2	Anisi	Apii	Seseli Ac-thiopici & Peloponœsis	Thlaspi	Rapæ agrestis. Miliis Solis
1			Seseli Maf-siliensis	Nasturtii	Rapæ domesticæ Alkekengi

Piper longum	Cardamo- mi maio- ris	
Piper album	Cardamo- mi mino- ris	Granorum paradis
Pipere ni- gro		Cubebarum

3	Berberis	Sorbarum
2	Vuarum immatu- rarum	Mespilo- rum
1	Sabinæ albæ	Cornorum

Pro { semine Myrti, Berberis, & contrâ.
Napi, Rapi.
Carthami, Viticæ; vel Agaricus
non Trochiscatus.

Pro { Sem. Mâdragoræ, Cicutæ.
Semine Afari, Semen Ge-
nistiæ.

SEMINVM ET FRVCTVVM.

502

5	Genistæ	Acetosæ	Gallarum	Cytini	Vua Corinthia		Ficus
4	Afari	Citri	Sumach	Balaustiorum	Passulæ mundatæ	Tamar-Indi	Sebesten
3	Sem. Hederae	Berberis	Myrtillorum	Cortic. m- ligranati	Dactyli	Prunis acidis	Iuinbæ
2					Pruna dulcia		Passulis mundatis
1					Ficubus		

CAPSVLA FLORVM.

3	Oenantes	Cichorei	Nymphææ luteæ	Sambuci, Abrotani	Corticum Glandis	Saluæ
2	Myrti	Buglossi vulgaris	Nymphææ albæ	Meliloti	Balaustio- rum	Stæcha- dis
1	Florib. Ro- sarum	Buglossi la- tif. siue Bor.	Violarum	Chamæmeli fol. Cha. flo.	Cytini	Anthos
						Genistæ
						Sambuci

3	Leucoii albi	Leucoii rubri	Leucoii lutei	Flor. Cicho- rei	Flor. Intubi domestici	Spicæ, vulgo <i>Aspic</i>
2		Flor. Tama- risci	Flor. Genistæ			Lauendulæ
1						Flor. Saluæ

DE SVCCIS.

Pro Acaciæ succo : succus Prunellorum probatur, & Rhois Dioscoridis.

Discorides ipse succum Hypocistidis substituit quidem; verum aliquanto magis adstringit & siccatur, si in antiquorum pharmacis recipiatur.

Pro Opio, Meconium, vel succus Lactucæ sylvestris, vel, domesticæ, quantitatē maiori.

Pro Absinthii succo, Abrotoni, Eupatorii, vel Centaurei minoris vtriusque, vel Agerati.

Pro succo Absinthii Pontici, nostratis Romani succus : differt tantum regione, ut Macedonicum à Pontico. In externis remediis, Santonicum & Marinum; vel ablutum leuiter in internis concedatur.

Pro Opobalsamo, Stacte, id est, Styrac liquida non adulterata, vel Oleum Myrrhæ. In suffusionibus, ad digerendum, Oleum Spicæ Lauendulæ, quod æquè tenuium est partium.

Pro Glycyrrhizæ succo, infusum & decoctum eiusdem; vel succus Vuarum Passularum, vel Vinum coctum, siue Sapa.

Pro Lycio, Amurca.

Pro

- Pro Citri succo, Limonum.
 Pro Thymelææ, Chamælææ succus.
 Pro Cyclaminis, Iridis.
 Pro Omphacii, Rhois; & contrà.
 Pro Aloë, Absinthii succus.
 Pro Semperuiui, Cotyledonis succus; &
 contra; vel Solani, Lactucæ.
 Pro Sanguine Draconis, Laccam sustinuit
 Auicennas in omnibus operibus suis.
 Pro Elaterio, succus Cucumeris agrestis,
 aliquantum coctus.
 Pro Sapa, Vinum dulce; & contrà.
 Pro Lycio, Gentianæ succus, in vlceribus.
 Pro aqua fontana, fluuiatilis.
 Pro aquâ pluuiâ, fluuii potiùs quàm fon-
 tana, contrà quàm Galenus præcipit
 in Diacodio; quia composita est, partim
 ex pluuiâ, partim ex fontibus.

DE LIQVORIBVS ET LACHRYMIS.

Pro Opobalsamo, Staçte siue Myrrhali-
 quida, naturâ vel arte parata, Liquor
 Terebinthi.

Non { Opocarpathum, vt auctor Succe-
 daneorum præcipit.
 { Oleum laurinum.
 { Liquor Myrti, non Semen Myrti,
 & Zedoarię, vt præceptores nostri
 statuerunt.

Y Pro

Pro Carpobalsamo, semen Lentisci, vel Terebinthi, cuius multæ sunt species: Cubebæ in minori dosi; vel Terebinthi partes dæ, vna Cubebarum.

Pro Cedria { Oleum è ramētis Iuniperi,
paratum per descensum,
vel Gummi Iuniperi.

Pro Xylobalsamo, surculi Lentisci.

Pro Oleæ lachryma, Gummi Elemni.

Pro Myrrha, Bdellium, vel succus Smyrni, vel Apii.

Pro Galbano, Sagapenum.

Pro Sagapeno, Gummi Cedri, Pini; vel Opopanacis dimidium.

Pro Ammoniaco, Propolis, siue sordes Alueariorum.

Pro Opopanace, Ammoniacum, vel Galbanum, vel Bdellium, maximè cùm emollire volumus. Galenus vsus est Propoli in externis.

Pro Manna Turis, cortex cui adhæret aliquid Turis.

Pro Ture, Mastiche, & Resina Pini sicca.

Pro Styrace, Benzoinum.

Pro Terebinthina, Mastiche.

Pro Mastiche, Abietina resina indurata, aut frixa, vt docet Dioscorides.

Pro Cupressina Resina, Laricina.

Pro Abietina, Resina Pini.

Pro Pice, Resina Pini cocta.

Pro Pice liquida; Pix oleo dissoluta, vel
Pix

- Pix ex Oleo Iuniperi liquefacta.
 Pro Pissasphalto, Pix & Bitumen.
 Pro Mumia, Pissasphaltum.
 Pro Asphalto, Petroleum, vel Gagates; & contrà. Et carbones petræi è terræ visceribus, quibus fabri ferrarii vtuntur.
 Pro Lacca, Myrrha.
 Pro Adipe Vrsi, Vulpis.
 Pro Adipe Anseris, Anatis, vel Gallinarum.
 Pro Adipe Capi, Gallinæ.

DE MINERALIBVS.

- Pro Antimonio, Plumbum vstum; & contrà: Auicenn. & Stannum vstum.
 Pro Lithargyro, Plumbum vstum, Molybdæna.
 Pro Plumbo, Stannum.
 Pro Flore Æris, Ærugo.
 Pro Spodio, Antispodium ex Myrto, Lentisco, Olea, Oleastro, Malo Cydonio; vel Cornu cerui vstum.
 Pro Pompholyge, Spodium Dioscoridis.
 Pro Cadmia, Lapis calaminaris.
 Pro Sandaraca Græcorum, Auripigmentum; & contrà.

*De Succedaneis vtriusque Behen,
 ex eodem Lobelio.*

Cum radice Behen albi & rubri destituamur, necessariò Succedaneo vtendum.

In cordi dicatis medicaminibus, vt Diamoscho dulci & amaro Mesuæ, & aliis similibus, radices vtriusque Buglossi substituendæ: In medicamentis ad Venerem, Horminum, Satyrium, Scincus, vel radices Pastinacæ sativæ & silvestris Dioscoridis, siue Dauci silvestris Galeni, & Offinarum; Actuarii exemplo, qui eas Benhen substituit in Diasatyrio. De his plura in Plantarum Observationibus aut Illustrationibus nostris, aut Aduersariorum altera parte.

De Ben, siue Balano Myrepica in Aduersariis egimus pag. 414.

FINIS.

GVILIEL.

G V I L I E L M I
R O N D E L E T I I
M E D I C I
D E
T H E R I A C A
Tractatus,

ex ultima MATTHIÆ LOBELII
recognitione.

THERIACA MAGNA

ANDROMACHI.

GVILIELMVS RONDELETIVS *Lectori S.*

CVM antiquissima ac nobilissima Theriacæ Antidotus à quibusdam dispensaretur, in mentem venerunt errata aliquot à Nicolao Præposito annotata, & aliquot minimè animaduersa. Quamobrem plurimum me rogârunt, ut veterem illam ac vulgatam Editionem recognoscerem. quod etsi mihi difficillimum esse probè perpenderem, & planè immensi laboris; nolui tamen amicis tam singularibus, honesta præsertim petentibus, operam meam denegare: tum quia sanctum esset quod tam instanter peterent, tum etiam Reip. admodum utile ac necessarium; cum omnia nostra studia & labores eò spectare debeant, ut Reip. & cæteris bonarum artium studiosis prodesse possint. Nihil enim existimo utilius, quàm ut illa Antiquorum medicamenta, quæ *Ἱνὴν καὶ Ἰατρὰν* appellant, fideliter præparentur, atque ex selectissimis simplicibus ad communem omnium utilitatem componantur; quod hoc hætenus, proh dolor, quorundam ignorantia ac incuria factum non

non est : quo fit , vt verissimum sit carmen
Homeri , Odyss. δ.

Φάρμακα πολλὰ μὲν ἰσθλὰ μίμνῃσι , πολλὰ
ἤ λυγρὰ.

Quam ob causam , Lector optime , te ad
meliora quodammodo reuocare videmur,
dum pro viribus adnitimur veterem illam
Andromachi traditionem ad germanam
Græcorum lectionem emendare. Et ne
existimes tibi à nobis imponi , consilium
fuit quibusdam annotatiunculis reddere
rationē cur à tam vulgata illa descriptio-
ne recedamus , idque addendo aliqua quæ
noua forsan tibi videri poterunt; ac expun-
gendo quæ numquam ab Andromacho ex-
cogitata fuere. Sed vnum abs te peto , vt
ne veteri rubigini addictus hæc sine ratio-
ne improbare velis, nî priùs apud te probè
examinaueris , quæ prodesse & iuuare so-
leant.

Cum igitur variæ sint Theriacæ descri-
ptiones à diuersis Autoribus traditæ , in
tâta rerum varietate difficilis erat electio:
omnes tamen ad veram illam Galeni le-
ctionem contulimus, cum easdem omnes
truncatas & vitiatas offendissemus: hanc-
que veram ex Antidotæon libro secuti su-
mus : quæ etsi perfectior videtur ; aliqua
tamen desiderabantur iniuriâ temporis
omissa , quæ nos pro virili restituimus ex
Galenî , Pauli , Aëtii , Auicennæ , Aëtua-

512 G V I L I E L. R O N D E L E T I I
riique locis, ut postea in Annotatiunculis
declarabimus.

Nostræ autem tempestatis docti quidam
impossibile quodammodo existimârunt
hanc Theriacæ confectiorem absolui pos-
se; his moti rationibus: tum quòd Vipe-
ras non habetemus, quæ sanè hoc in ne-
gotio primas tenent: prætereà Balsamum,
Aspalathum, Cinnamomum, Myrrham,
Rhaponticum, Calamum aromaticum,
Phu, Nardi Spicam, Pentaphyllon, Schœ-
nanthum, Dictamnium Cretense, Sigil-
lum Lemnium, Thlaspi; tum quòd om-
nibus incognitum dicunt Scordium. miror
non addidisse Malabathrum, Acaciam,
Acorum, Bitumen Iudaicum, Opopana-
cem, Galbanum, quòd non nisi adulte-
rata aduehantur, ut quibusdam placet. Sed
nos eorum rationibus faciemus satis. Ab-
surdum enim est illa medicamēta inutilia
existimare, quæ à Galeno in usum trahun-
tur, etsi non omnia adsint. Multa siqui-
dem ipsemet Gal. suo tempore desidera-
bat, in quorum locum *ἀντιβαρύνοντα* pro-
ponebat. Enimuerò si Gal. pro Cinnamo-
mo Cassiæ duplum ponendum iussit, imò
& Phu; & pro oleo Sabino, oleum anti-
quissimum; pro Omphacino, oleum pa-
ratum cum foliis oleæ; quid prohibet Aco-
rum poni pro Amomo, quum Acorus cum
Amomo similem facultatem obtineat? pro
Dicta-

Dictamno Pulegium? quod etsi vires paulo inferiores habeat, augeamus dosin: pro Opobalsamo Styracem liquidam? pro Rheopontico Rhabarbarum? pro Terebinthina Mastichen? pro Viperis Elopes, Ophies? Sed quid moror? Clariores sunt quàm vt demonstratione aliqua egeant.

Consultiùs itaque ab his cauillatoribus factum esset, si tantum operæ locarent in in inueniendis Succedaneis, quantum in cauillandis aliorum inuentis. Cessent igitur, precor, bona medicamina infamare; & quam prauam opinionem solent imperitæ multitudini tradere, omittant.

Tempestiuum nunc videtur ad Simplicium declarationem veniamus; hoc vnum præmonentes, pondera non respondere ponderibus Andromachi iunioris, vel Democratis: nam Democrates drachmas duas tantùm Polii, Seseii, Thlaspi, & aliorum, vsque ad Cardamomum ponebat, vituperabatque illos qui constituerent quatuor; quod tamen ferè omnes qui de Theriaca scripserunt, faciunt; quemadmodum Gal. Paulus, Aëtius & Auicenna, quos secuti sumus. At de diuersitate ponderum vide Gal. de Theriaca ad Pisonem.

THERIACA nobilissimum medicamentum dicta est, quòd valeat aduersus *zozia*, id est, bestias venenosas; non au-

tem, vt quidam existimant, quòd Viperas (ita sumpto nomine ob excellentiam, sed satis impropiè) reciperent ; nam antequam additæ essent Viperae, etiam Theriaca dicebatur: huc accedit quòd multæ sint Theriacæ descriptiones , vt iam diximus, apud Galen. in Antidotis , quæ Viperas non habent. Non igitur à Viperis, sed ob effectum ita fuit appellata. Posset tamen defendi , Theriacam etiam dictam fuisse à Viperarum carne. Cæterùm hæc Theriaca Galene, non Galeni, nominatur, aut si mauis, *γαλήνη*, id est tranquilla, vel tranquillitatem afferens, Autor enim huius non fuit Galenus, sed Rex Ponti¹ Mithridates ; qui, vt erat exercitatissimus in simplicibus, omnia ea collegit Antipharmaca, flores scilicet, semina, herbas, radices, gummi, & cetera quæ valerent aduersus virus ferarum, Viperarum, Canum rabidorum, Scorpionum, Dipsadum, &c. nec non aduersus venenum medicamentorum quorundam, vt Mandragoram, Cicutam, &c. & ad morbos alios complures & antiquos. Ex his omnibus collectis selectissima & efficacissima selegit, ex quibus parauit compositionem suo nomine nuncupandam ; ea est Mithridatium: Andromachus postea (qui videtur inter omnes exactissimam calluisse normam componendi medicamenta) eam correxit & emendauit;

dauit; addiditque Viperas, *σαλπιγξ*que vocauit, id est, Tranquillam, quod tranquillitatem inducat: & meritò quidem: quidenim magis meretur tranquillitatis nomen, quàm quod sedat dolorem? Quia Cane rabido demorfi sunt, aut Vipera, aut alia fera venenata, multum torquentur, multumque de morte sunt solliciti: hæc compositio illos curat; magnam igitur tranquillitatem inducit. Vt in summa dicam, nulla est præstantior Antidotus ad antiquos & diuturnos morbos, ut iam dictum est. Ad defluxiones nullum est genus remedii efficacius quàm hæc Theriaca, siquidem fuerit recens. Febres quartanæ solo vsu Theriacæ visæ sunt curatæ. Quid non facit Theriaca? Inexpugnabiles morbos, & quorum causa ignota est, curat: ex omnibus enim medicamentis efficacissimis constat, symphoniâ iunctis.

PASTILLOS SCILLITICOS aliter præparamus, quàm antea facere solebant: nam sine delectu Pharmacopœe Scillam vel Pancratium accipiebant, quod habeant eandem facultatem. Sed quoniam Pancratium vim habet imbecilliolem, melius est cõfici eos ex Scilla, præsertim cum nobis facultas sit. Si Scilla careamus, Pancratio uti possumus eius loco, sed in maiore dosi: ut Cassia pro Cinnamomo: cum verò adest Scilla, sumatur Scilla. Cate-

rumpastilli hi fieri debent ex carne Scillæ, & spissari farina Orobi, quæ valet aduersus venena, & conseruat Scillam à putredine suo amarore. Pharmacopœi eos solebant parare cum pane asso, aut cum Vicia, cum non nossent Eruum, vt nec adhuc omnes nôrunt. Cùm enim nuper Auenioni essemus, & medicamentum præscripsissemus Nobili à Monlau, in quo Eruum desideraretur, iussi Pharmacopolâ adferre Eruum, atque is Viciam attulit & Aphacem; cùm neutra illarum sit Eruum, quod amarum est & tenuium partium; Vicia verò dulcis & emplastica. Porrò Erui duas constituunt species: Aliam enim candidiorem faciunt, aliam ruffam Eruum est quod vulgò *des Ers* vocant, in Gallia Narb. *Esset*. Quod ad Scillæ delectum attinet, ea sumenta est æstate, præsertim Iunii initio, ad parandos hos pastillos; tunc enim multum succi habet: si hyeme legatur, non valebit: sub Canicula verò venenum est, habet enim tantam acrimoniam, vt æstu correpta in venenum vertatur. Sumenda itaque est vere, aut æstatis initio. Ealecta inciditur frustulatim more ceparum, non quidem cultro aut instrumento ferreo, sed arundinaceo, aut osseo.

Maiores nostri soliti erant parare PASTILLOS THERIACALES ex Serpentibus communibus, cùm Viperas non habe-

haberent. Nec omninò certè vituperandi sunt: idem enim præstant reliqui Serpentes, sed Viperarum vis est efficacior. *Ophidia* Græci animalia appellant (latiore significatione accepto vocabulo) quæ curari non possunt. Medici verò *Phidia*, quæ morſu venenato vel punctura venenum iaculantur, hominiquè nocent, appellant; sub quo nomine & Aspides, Elopes, & Ceraſtes comprehendunt. Quamobrem non erit absurdum Trochiſcos Theriacales dicere, cùm ex feris conficiantur, quæ & facultate ſua iuuant, quemadmodum Viperæ, & ſi auſim dicere, conuenientiores ſunt. præter enim id quòd calefaciendi & exſiccandi vim habent, aduerſus angues noſtros peculiariter iuuant. Nam Theriaca, vt autor eſt Galenus ad Piſonem, olim citra ferarum commixtionem confectum medicamentum ſimiliter ad eiuſmodi mirificè faciebat: Sed poſtquam Andromachus Viperas commiſcuit, ad morſum Viperarum medicamentum fuit efficacius: imò, ſi credamus Galeno, lib. 2. de Antidotis, Mithridatica compoſitio aduerſus plurima venena valet, præter Viperarum iectus. Nihil igitur habuit Theriaca additis Viperis, quàm quòd ad Viperarum morſus ſit efficacior. Sic noſtrum medicamentum efficacius erit ad morſus Serpentum, cùm nullum nobis periculum

immineat à Viperis. Adde quòd pinguedinem Serpentum quotidie experimur plurimum valere, & carnes non plus veneni in se continere quàm olim haberent Viperæ, si debito modo adhibeantur, & quales oportet capiantur. Nam & in capiendis delectus seruandus est, quemadmodum & in Viperis: vt quæ prope mare degunt, *ἄψις* sunt; & quæ in aquis, excrementosæ; & quæ vtero gerunt, repudiandæ. Quas æstate venantur, vel hieme, nos Elopes vel Angues bene nobiles in vincis degentes, Vere captos eligimus, non diu asseruatos (vt solent facere Pharmacopolæ) & præparatos, vt ars iubet, cum paucis alio Trochiscos conformabimus: sic seruatos & exsiccatos, vt neque situm redoleant, neque cariem senserint. Quòd videatur Dominis Doctoribus dosin augendam esse, quia imbecilliores sint, non improbo: quòd si quis Viperas nancisci possit, vt iam facimus; eas capiat, & angues omittat. Paulus Ægineta etiam de Viperis loquens, *ἄψις* dicit: Ea autem locutio esse videtur per excellentiam, quo commune aliquod vocabulum rei singulari attribui-mus: vnde & *ἄψις* Viperas vocat. Cùm autem simpliciter legitur *ἄψις*, de Vipera intelligendum est, quia præstantissima inter serpentes est. Vnde & in Theriaca assumenda; non quòd remedio egeamus aduer-

aduersus illarum morsus, siquidem in nostris Regionibus non reperiuntur, sed ob alias Viperæ facultates: desiccant enim vehementer, calefaciunt, & visum acuunt. Viperas nihilominus veras tum in Italia, tum apud Pistones habemus; quicquid dicant qui id negant: Certissimum enim signum est Viperæ, & nota certissima, si viuum animal pariat, vt inter pisces Galeus; vnde & nomen habet, vt scribit Aristoteles, & experti sumus in nostris ædibus: Adhæc Viperarum descriptio tam exactè illis conuenit, vt nihil magis; & maxime ea quæ tradita est ab Aëtio, viro perquam diligentissimo in describendis Viperis. Vtynam è multis notam adferamus: statim in caudam desinunt, quam crassissimam habeant inter reliquos serpentes (præter Amphisbænam, quæ aded crassam habet vt bina putetur habere capita:) omnes denique notæ feliciter reperiuntur in ea. At dicat aliquis: Elephantiasin non curat, vt scribit Galenus. Esto. Si mentiri voluit Galen. quid tum? neque enim verisimile est tempore Galeni curari potuisse Lepram iam confirmatam. Sin autem quis dicat, id non ided præstare, quia ex Italia adferantur, quæ regio non sit satis calida; Nugæ: si enim venenum retinent, cur non & alias facultates? Nemo igitur dubitet, quin veræ Viperæ nostris

tem-

320 GVILIEL. RONDELETTI
temporibus reperiantur.

Porro vt conficiantur Pastilli Theriacales , præparatione omiffa , hoc tantum ex Gal. addam , melius effe paulo antè captas fumere , quàm diu retentas : nam quæ diutiùs retentæ fuerunt , venenofæ funt magis , vt ex hominibus ieiunis conicere licet.

Andromachus MAGMA HEDYCHROON, ita à coloris iucunditate appellatum, non Trochiscos de Corallo, vt Nicolaus Præpositus falsò putauit , defiderat. Multo fatius fuiffet , fi Trochiscos Alindaracorum Auicennæ posuiffet , vel Trochiscos Hedychroi , quos annotauit in Antidotario, qui etfi Tamaricem recipiant, Asphaltum defiderent ; magis tamen accedunt ad Hedychroi compositionem quam hîc constituimus ex Gal. lib. ad Pamphilianum. Hæc enim paratu facilior est, & clarior, & melior, Nam in lib. de Antidotis pedestri oratione scripta est, quæ Maron & Amaracum defiderat. At Maron nobis prorsus incognitum est, nisi illa sit quam vulgo *Mariolaine franche* appellant ; quam ob causam cōsultò Amaracum addidimus, & illam pro Maro : quòd si per Amaracum intelligat aliquis Sampsuchum , pro Maro poni potest Sysymbrium ; sunt enim eiusdem facultatis , vt Dioscorides docuit. Quantum verò differat Hedychroon
magma

magma à Trochiscis Diacoralli, fidem facit vtrorumque collatio: hi enim Papauer, Pedem columbinum, vt alia omit- tam, recipiunt, quæ non sunt in Hedy- chroo. Non itaque ponendi.

PIPER NIGRUM non tam valet ad *ἀντιφάρμακα* atque Piper Longum & Al- bum: sed quia omnes sic habent, nolui immutare, & ʒ xiiij indidimus, quam- uis aliqui sex tantum: Paulus tamen, Aë- tius & reliqui, xxiiij censent ponendas; & Nigrum, non Longum, vt in quibus- dam Exemplaribus legitur, & in carmi- nibus Andromachi. Neque tamen impro- barem si quis Longum sumat; tum quia in carnibus Longum est, tum quia Anti- dotis, si Dioscoridi credimus, aptius. Tu verò iudica.

OPIUM, vel MANDRAGORA, vel, HYOSCYAMUS addi solent in Antido- tis, quia incrassando constringunt me- tus, ne Venenum ferti possit ad cor; & sic iuuant operationem Antidoti. Eodem planè modo Bolus Armena & Terra sigil- lata lentore suo & crassitie prohibent vim Veneni ad cor deferri, non autem pro- prietate occulta, sed incrassando: quare quæ tenuissimarum sunt partium, vt Mos- chus, Ambra, non conueniunt, quia fa- ciunt citò penetrare venenum ad cor: sic Cicuta cum vino absorpta occidit citissi- mè;

mè; per se verò tardiùs.

ROSARVM, remotis vnguibus, drachmas xij ponimus : Auicenna xxiiij ponit.

SCORDIUM quod Fuchsius putat omnibus incognitum, nunquam antea in aliqua Antidoto positum, apponendum censuimus (quanquam tamen opera & diligentia doctiss. viri D. Guiliel. Pelliterii, Mompeliani Episcopi vigilantissimi, primum in Gallia iam à decem annis cognitum sit) & non Allium sylvestre, vt vulgo Pharmacopolæ facere solebant. Stultum enim esset *Σκόρδον ἄγριον*, id est Allium sylvestre, vt Auicenna docuit, collocare, cum tam frequens apud nos sit Scordium herba. Excusandi fuerunt Maiores nostri, quibus incognitum fuit; neque grauitè peccârunt in hoc simplici, est enim Allium sylvestre, Theriaca Rusticorum. Vtinam in aliis Succedaneis tam bene iudicassent! Non est tamen conferendum Allium cum Scordio: Scordium enim maiorem habet vim aduersus putredinem, quàm vel Myrrha ipsa, vt videre est apud Gal. lib. de Antidotis, qui eius inuentionem declarat. Quis autem, nisi stultus, dicat Succedaneis esse vtendum, cum propria habeamus? Scordium enim copiosissimè per totam Galliam nascitur. Reiiciendum itaque Allium.

SEMINIS NAPI; & rectè: quamquam

quam nonnulli, Seminis Rapæ, legant.

IRIS ILLYRICA ea debet apponi quæ Veneriis affertur.

AGARICVM fumatur candidum, leue, &c.

CINNAMOMVM à viris doctissimis in discrimen vocatum est, cum dicant nos vero Cinnamomo carere; ac id quod pro Cinnamomo ostenditur, potius esse veram Cassiam: nos tamen putamus esse Cinnamomum; etsi non sit illa species tanto pere ab Antiquis laudata: quam ob causam nos istius Cinnamomi ʒ xxiiij posuimus (etiamsi nonnulli ʒ xij tantum ponant) duplici nomine: tum quia in quibusdam exemplaribus xxiiij drachmas Cassiæ scriptum legimus, ut etiam in secunda descriptione Avicennæ; tum ut omnibus fieret satis; nam si Cinnamomum esse negent, non possunt improbare consilium nostrum, cum Gal. de Compos. Pharmacorum doceat his verbis: Necessarium nobis est, ubi Cinnamomo caremus, Cassiam optimam coniiciamus, aut plusquam duplo Cinnamomi pondere, aut omnino non minus. Sed Cinnamomum verum habemus. Si cineritium illum colorem non habeat, in causa sunt mercatores, qui eius superficiem abradere solent, colorem naturalem auferentes. At odorem Rutę non habet. Nec habere debet.

bet. Error enim est in Diosc. nam pro *μα-
ριζων* legendum est, *εξαριζων*: quod
facilè probati potest ex eodem Dioscori-
dis alio loco, vbi ait Amomum habere
Origani odorem. Hinc enim luce clarius
colligere licet, Cinnamomum Origani
odorem referre; aliūque textū corruptū
esse. Et quanquam Dioscor. dicat diuer-
sas esse arbores Cinnamomi & Cassiæ; Gal.
tamen diuersæ est opinionis; asseritque
se vidisse in capsula cuiusdam mercatoris
ramum vnum, cuius altera pars Cassia
esset, altera Cinnamomum.

GLYCYRRHIZÆ SVCCVM apposuius,
quia efficacior est quàm radix ipsa; etsi
Auicenna in tertia descriptione radicem
ponat: & vere poni potest succus; nectimē-
dum est de succi adulteratione. Nam tanta
est copia Dulcis Radiculæ, vt parui vñeat:
Et etiam cū Theriacā componere volu-
mus, expressè succum extrahere debemus.

OPOBALSAMVM sincerum ad nos
non adfertur, sed multis modis adultera-
tum: quin etiam si adulteratum non esset,
recens non est, sed antiquum. nam cū
ex regione longinqua petatur, non po-
test non esse antiquum; est siquidem
antiquum, si annum excesserit, sitque inu-
tile. Etsi nonnulli dicant in Nouo Orbe
reperiri, incertum est an verum sit: succe-
danco itaque vtendum. Quid verò substi-
tuemus,

stituemus, cùm succedaneo opus sit? alio-
 qui manca esset Compositio & corrupta.
 Non sequemur hac in re consilium Maio-
 rum nostrorum, qui Oleum Laurinum
 pro Opobalsamo poni docuerunt. Opor-
 tet enim succedanea & viribus & tempe-
 ramento respondere, vt doctissimè à Gal.
 monstratum est. Sed oleum Laurinum ca-
 lidius multo est Opobalsamo, cùm oleum
 Laurinum inter calidiora adnumeretur,
 quod ex fructu potest cognosci: solet
 enim oleum expressum eiusdem esse tem-
 peramenti cum fructu ex quo exprimitur.
 At folia & fructus Lauri desiccant & cale-
 faciunt vehementer, plus etiam fructus;
 ergo & Oleum: Opobalsamum vero desic-
 cat & calefacit in secundo excessu tantùm.
 Igitur non respondent. Adhęc Opobalsa-
 mum tenuium est partium, Oleum verò
 Laurinum crassarum: Opobalsamum ven-
 triculum roborat; Laurinū autem oleum,
 vt ait Diosc. *ἡ ναυ πᾶσι καὶ τοῖς*, id est, po-
 tum nauseam facit, & lædit ventriculum,
 non alia ratione, quàm quòd ventriculo
 aduersatur: idem autem efficere Opobalsa-
 mū, negandū est. Non enim est oleum, sed
 succus Balsami. Vnde autem id natū sit, vt
 Oleum Laurinum in Antidotis poneretur?
 Puto hinc esse natum, quòd olim Oleum
 parabant cum Myrrha & Staete, vt Diosc.
 docet. Extrà adhiberi non prohiberem, vt
 etiam

etiam oleum Irinum: quamvis in versione Vallæ & multis exemplaribus Græcis (falsò tamen) Laurinum legatur. Balsamum arte compositum reiicitur. Errorem indicauit ante 114 annos Santes de Andronis de Pisauro Medicus in hac parte Alexipharmacôn diligentissimus & probatissimus. Post eum Nicolaus Præpositus, qui Medicorum Mompelianorum mentionem facit, tanquam autorum huius hæreseôs. Alii ex semine Citri & Corallo *ἐν ῥοσμύρῳ* conficiebant, sed ineptè: nam quamvis semen Citri valeat aduersus venena, reperiuntur alia multo efficaciora. Alii asseriebant fieri debere substitutum ex Myrrha destillata: quod expertum fuit; & ex destillatione oleum exceptum, sed vsque adeò fœtidum, vt nemo ferre posset. Omnibus itaque reiectis, substituam Staecten, ex præscripto antiquorum, Galeni scilicet, Pauli, Aëtii, qui asserunt easdem Staectes vires & Opobalsami. Est autem Staecte nihil aliud, quàm Myrrha liquida, &, si Diosc. credimus, est pinguißimum Myrrhæ recentis cum aqua exigua tuxæ, & prælo expressæ, proportionem respondens Myrrhæ. Myrrha autem secundi est ordinis excalefacientium & exsiccantium, sicut & Balsamum. Adhæc & vulnera consolidat, quod facere Balsamum creditur à neotericis Medicis, quanquam Gal. nul-

lam

Iam eius mentionem faciat. Idcirco autem hîc positum fuit, quòd aduersus venenata animalia valet. quod ex eo colligere licet, quòd vbi nascitur Balsamum, nequeant habitare Serpentes aut alia venenata animalia. Qui de omnibus dubitare solent, Myrrham istam reiiciunt, quia parùm respondeat descriptioni, tùm maximè quòd *ivάδης*, id est, odorata non sit, vt Diosc. & Gal. dixerunt. Nos autem Myrrham dicimus esse, non Trogloditicam vel Amineam. Et quòd non sit odorata, in causa est quòd ab ea expressa sit nobilissima Staete. Nam, vt Diosc. docet, ex pinguibus exprimitur pingue & odoratum. Minùs etiam odorata est, quia ex calentibus & aridis locis adfertur. Neque tamen dicendum est talem esse *ἄπρωτος*, id est, infirmam & ignauam, vt in quibusdam exemplaribus legitur: vbi legendum *ἄσπρωτος*, id est sine odore; illamque amittere suam commendationem, non ad sanitatem sed ad voluptatem. At hi qui dicunt nos non habere veram Myrrham, falluntur, aut in hoc, quòd, cùm Diosc. diuersas notas diuersis speciebus assignârit, omnes eas in vna specie reperiri velint, alioqui veram negent esse Myrrham: aut quòd dicât *ivάδης* non esse, vt vult Dioscorides. Sed id planè negamus. Sumitur autem vox *ivάδης* pro eo quod bonum spirat odorem.

odorem. In hoc autem error est. Nam Diosc. & alii plerique scriptores *ἰωόδης* sumunt pro eo quod multum olet, siue bonum spiret odorem, siue malum. Significatio autem vocabulorum non aliunde petenda est, quàm ab eo authore qui rem ipsam describit; quemadmodum Diosc. ut dixi, hoc modo sumit *ἰωόδης*, ut videre licet cap. de Pice arida, ubi ait debere esse puram, pinguem, *ἰωόδης*. Nemo autem interpretabitur intelligi de suavi odore, sed forti & graui, quia quæ igne eliciuntur non possunt non fumum redolere & tetrum odorem spirare. Idem esto iudicium de Blatta Byzantia, quam dicunt esse *ἰωόδης*. Sin hæc ratio non placeat, dicemus Veteres non adeò delicatos fuisse atque fumus, & quod nobis malè olet, ut Myrrha, illis benè & suauiter oluisse: quod inde probari potest, quòd in suis vnguentis ad delicias paratis, Galbanum admiscebant; quod haud dubiè fœtidi admodum est odoris.

De CROCO & GINGIBERE nulli dubitant.

Reclamant Sceptici Medici, quòd pro RHEOPONTICO Rhabarbarum (se-
quuti Auicennam) ponimus. Non autem temerè id factum est. nam cum Rhaponticum hoc Pharmacopolarum nullo modo respondeat picturæ Rheopontici, satius est Rha-

est Rhabarbarum vocatum coniicere: quanquam istud Centaurium maius à viris doctissimis iudicetur esse, nec ineptè. Rhaponticum enim & Centaurium hoc maius easdem ferè habet facultates. Componitur Rhaponticum ex diuersis partibus: ex terrea videlicet & frigida substantia, quod indicat adstrictio: habet etiam adiunctam caliditatem; subacre enim reperitur, si plusculum mandatur, qua facultate potest alium ducere: quin etiam aëreæ cuiusdam est substantiæ particeps, quod indicat laxitas & dulcedo. Conuulsis, ruptis, dysentericis, sanguinem expuentibus vtile est, & orthopnoæ. Centaurium maius in gustu contrarias qualitates habet; ita in vsu contrarios effectus præstat: gustu itaque acre simul & adstringens apparet, cum leuiuscula dulcedine: quæ omnia in Rhapontico esse monstrauimus. Prodest iisdem reiciientibus sanguinem, ruptis, conuulsis, dyspnoæ: orthopnoæ: quamobrem medicamentum imbecillius non erit, si pro Rhapontico Centaurium maius posuerimus. Nam Rhaponticum & Rhabarbarum sola regione differunt & leuitate: vt Rapæ quæ apud Lemouices nascuntur, & quæ solo sterili, differunt solum dulcedine aut crassitie, aut alia differentia à solo desumpta. At dicces; alterum magis rarum est, alterum

Z densius,

densius. Respondeo, id facere copiam vel inopiam alimenti : aut dicendum, Mercatores qui aduehunt Rhabarbarum , illud comprimere cùm recens est , vt minus loci occupet , & densius reddatur ; quòd sciant densum laudabilius esse. quod facile fieri potest : si enim compressam radicem desicces , minor erit , minusque spatium occupabit , nec diminuetur quantitas. Si verò Rhabarbarum nostrum non sit veterum Rhaponticum , quid erit ? Quidam aiunt esse radicem Centaurii maioris , & Galenus ait radicem Centaurii maioris easdem facultates habere quas Rhaponticum.

Malè negat Manardus , nos verum **PENTAPHYLLON** habere : nam passim nascitur , & omnino descriptioni respondet. Est præterea alia nota à Theophrasto tradita , quæ nobis est certissimo indicio nos Pentaphyllon habere : scilicet quòd Pentaphylli radix exsiccatione fiat quadrata : quod sanè illi proprium est : conuenit enim soli Pentaphyllo quadratam fieri exsiccataam radicem ; quæ nota fallere nos nequit. Sunt ex Practicis qui putent Tormentillam esse Pentaphyllon : quod non improbo ; cùm Diosc. det illi radicem oblongam, Veratro nigro crassiorē , & propiùs accedat ad veram Pentaphylli descriptionem. Sunt qui Heptaphyllon

phyllon vocent, à numero foliorum; quod & in vulgari etiam inuenies. Diosc. etiam ait habere quinque folia, aliquando plura. Verùm quaecumque assumpseris, hanc ne Diosc. an illam Theophrasti, non errabis: ambæ enim valent aduersus venena. Potest itaque sumi Tormentilla pro Pentaphyllo, & Pentaphyllon pro Tormentilla.

NEPETA [aut Nepitam] Latini, Græcorum Calamintham appellant: quæ de causa Galenus miratur quòd Andromachus, cùm Græcè scripserit, hoc tantùm nomen Latinum addiderit. At hoc *νεπέτα* dictum sit.

MARRUBIVM lippis & tonsoribus notum est, eam ob causam prudens prætereo.

Danda est operæ ut **SELINON** quod in petris nascitur recuperemus: non quòd ob eam causam Petroselinon dictum velim, sed quia maioris est efficacis, & propius accedit ad Macedonicum, ob amaro-rem. Nec ob eam causam damnanda erit hæc compositio. Nam, vt Gal. de Petroselino scripsit, Quod si Estreaticum desideres Petroselinum, nihilo tibi deterius fore putato Theriaces medicamentum, si alterum iniicias. Cuius rei subdit rationem: Non enim, inquit, si mortiferis venenis, si venenatorum moribus aliud ab

Estreatico Petroselinum minùs congruit, propterea reliquis etiam morbis, vt torminibus, ventriculo debili, hydropisi, & id genus aliis segniùs opitulatur, quos in primis sanare Theriaca promittit. Aliã præterea causam assignat, cùm inquit: Adhęc Estreaticum Petroselinon amarum etiam plus æquo Theriacam facit, præsertim cùm recens adhuc imponitur: nam vt acrimonia, sic amaritudine hoc alia superat. At, vt alibi docuit, suauitas in medicamentis quæ deglutiuntur, est spectanda, cùm in se habeat multa amara. Auicenna semen Apii montani posuit in tertia descriptione. Petroselinum verum nascitur in montibus Delphinatus, & apud fontem Vaucluse.

S T O E C H A S satis nota est: agroque Mompeliano frequentissimè prouenit.

C O S T V M nonnulli in discrimen vocant. Certissimum autem est, nos duas habere Costi species: primam scilicet (quam Zedoariam vocant vulgò) & tertiam quam nemo negabit eam esse quæ ad nos adfertur, præsertim cùm acerrima sit.

D E P I P E R E Albo tantùm sciendum est, Galenum ibi Piper Album legere, vbi Auicenna Nigrum; & econtrà. Piper Album & Longum magis medicaminibus & Antipharmacis conueniunt: Nigrum
verò

verò eduliis & alimentis condiendis. Piper Longum facillimè adulteratur. Adulteratum aut cognoscitur, si aquâ inspersum dissoluatur. Non reperitur hoc Piper Longum in descriptione ad Pamphilianum.

DICTAMNUM in Creta tantùm crescere, & inde CRETENSE dici, existimant Autores, quòd sic depictum sit à Diosc. Cretensis herba est, acris, levis, Pulegio similis, sed maioribus foliis, quæ tomento quodam spissaque lanugine pubescunt. Florem nullum aut semen profert: (et si apud Paulum falsò legatur Δικτάμνῃ ἄνθος.) Pharmacopolarum Ψευδὶς Δικτάμνου & florem & semen profert: quam ob causam malumus succedaneo vti, quàm incognita illa radice qua pro Dictamno vtuntur Pharmacopolæ. Pulegium itaque pro Dictamno iniecimus, quia nulla est herba quæ propiùs accedat ad Dictamni facultatem ipso Pulegio, docente ipso Diosc. Præstat omnia quæ satium Pulegium, sed efficacius multo: & Gal. Dictamnium tenuiore essentia constat quàm Pulegium; cetera illi simile. Quòd si per omnia simile, haudquaquam malè pro Dictamno recipietur, cùm ipse Auicenna in omnibus descriptionibus pro Dictamno Pulegium posuerit. Præterea à Nicandro (in suis Theriacis,) Dioscoride, Serapione, Paulo

& Aëtio ad morbus venenatorum commendatur.

Non mireris , candide Lector , si pro FLORE IUNCI ODORATI , quem vno vocabulo Schœnanthon vulgus appellat , herbam ipsam monstremus. Audi Gal. Adhęc Iuncum ex Arabia petatum imponere præcipit , nescio qua de causa , Schœnanthum , id est , Iunci Florem à vulgaribus appellatum. Nos siquidem , cùm Florum copia non adsit , Iunco utimur ex Arabia comportato , cuius summitatem Cameli sæpenumerò abroferunt : iucundissimè namque hunc Iuncum Cameli pascuntur , secus vias ibi plurimum nascentem. Ex his disce , multa fuisse simplicia tempore Galeni , qualia nunc sunt. Non itaque peccant , qui Iuncum ipsum huic compositioni imponunt , vt ex Gal. loco iam citato patet , & Diosc. qui ait radicem & herbam eiusdem esse facultatis cum flore & effraciè. Imò si flores adferrentur , abiiciendi essent & postponendi Iunco ipsi nam cùm sint admodum tenuium partiũ , eorum vis facilè evanescit ; & priusquam ad nos peruenissent , planè inodori redderentur.

DE TYRE nihil in præsentiarum dicemus.

Quamquam TEREBINTHVS hoc agro Mompeliano frequens sit , non tamen

men Terebinthinam habemus : & quem-
admodum Lentiscus , hic alioqui fre-
quens , Lentiscinam non stillat , ob Solis
imbecillitatem ; sic nec Terebinthus Te-
rebinthinam. Sed , Galeni doctrinam se-
cuti, pro Terebinthina Abietinam conie-
cimus. nam 4^o sanitatis tuendæ sic scrip-
sit: Quòd si copia Abietinæ non adsit, eius
loco Terebinthina. Cùm pro Abietina
Terebinthinam ponendam doceat ; sic
econtrà pro Terebinthina Abietinam re-
cipiemus. Quod euidentiùs monstrat
alio in loco, his verbis : Quinetiam in
penuria Terebinthinæ tum *ἐν τῷ θεραπεύειν*
ὕδατι, tum frictam commodè admisceas;
non minùs etiam iis & Abietinam immit-
tas. Quòd si fortè quis hanc Resinam Ab-
ietinam esse neget, Mastichen ponemus,
quæ ipsis Resinas principatum obtinet,
teste Gal. vel (vt Diosc.) Terebinthinæ
respondet viribus. Fidem forsitan auge-
bit, quòd in Paulo legatur, *Τερρεβινθίνης*
Μαστίχης, quasi vellet dicere Resinæ Masti-
chinæ, vel Mastichen & Terebinthinam
imponi velit. Tu iudica.

CASSIAM FISTULAREM vocat
Cassiam Ligneam , aut Cinnamomum
crassum; ne qui existiment eum intellige-
re Cassiam illam Fistularem Arabum, quæ
vim habet laxandi ventrem. Est enim Cin-
namomum crassum efficax, vt odor & sa-

por monstrant. Nec absurdum est, dimidium Cinnamomi pro Cassia constituere; cum pro Cinnamomo duplum Cassiæ ponendum sit.

STYRAX eligenda optima.

NARDVM nemo debet damnare, quòd spica non sit, sed potiùs radix. Nam Gal. his verbis docet esse radicem: Iubet deinde Andromachus Nardum Indicam imponere, quam ex eo quia Spicæ figuram imitetur, Nardi spicam nominant, quamvis radix sit. Rursus Damocrates *Nágedio pígar* *Ἰνδῆς* scripsit, non spicam Indica autem dicitur, non quòd in India nascatur, sed quòd in aliquo monte nascatur Indiam spectante; quemadmodum Syriaca, quæ in monte Syriam spectante. Eodem modo & Britannica dicitur (ea est Bistorta vulgaris) non quòd in Britannia solùm nascatur, sed quòd in regione Britanniam spectante. Ceterùm Nardus Indica cæteris efficacior est.

Nunc ad THLASPI veniendum: quod omnibus incognitum putat Manardus, eo fortasse quòd nunquam viderit. Vt autem verum fatear, non omnibus cognitum fuit Thlaspi, sed iis dumtaxat qui de re herbaria bene meriti sunt. Eius descriptionem require in Diosc. Frequens est in semitis Tolosani agri, & aliis plerisque locis. Temperamento calido est, vt Nasturtium.

tium. Auicenna pro Thlaspi, Sefeli habet : at in Arabico Thlaspi legitur. Vulgus Pharmacopolarum, quod Sinapi species quædam sit, album appellant.

SEMEN APII restituiamus ex descriptione ad Pamphilianum. In Paulo enim & Auicenna idem scriptum reperimus, tum etiam in Theriaca Antiochæ Philometeros, in medicamento anodyno Κάμινος dicto : rursus in Zenonis, Aëtii, Galli, Theriacis : quod etsi vt Petroselinum aduersus venena parum aut nihil proffit, ad alios morbos non parum iuuat.

PRO MALABATHRO, vt benè à maioribus nostris visum est, ponendam censuimus Spicam. Habet enim Folium eandem cum Spica facultatem, teste Gal. lib. 6. de simpl. Idem scripsit Paul. in Succeda-neis. Quòd si æqualem vel similem habet facultatem, frustra additur Macis ; cum neque addendum quicquam dicat, neque detrahendum. Auicenna post Malabathrum addit Epithymum ; qua ratione nescio ; quemadmodum & Moschum post Piper Longum.

HYPOCISTHIS etiam sub Lado [aut Ledo] reperitur : quod Cisti species est, longiora habens folia, & glutinosa.

NARDVS nostra CELTICA ea verè est quam Antiqui Celticam vocauerunt:

non igitur reiicienda : neque audiendus Marcellus, qui negat Spicam nostram esse Celticam. Rarò autem visitur, quia in summis montibus nascitur, quos perpetua nix ferè obsidet. Radix sumenda.

Pro TERRA LEMNIA sumimus Bolum præparatum, ut Gal. docuit. Neque eam ob causam vituperanda est hæc terra, quòd à Lemno non aduehatur. Est enim hæc terra medicamentosa, lutumque cum aqua ex ea fit, quod habet desiccandi facultatem, & astringentem non contemnendam, quæ catarrhos sistit. Prodest tempore pestis. Ut in summa dicam, mallet hæc vii, quàm Terra sigillata egregiè adulterata. Rubrica Lemnia à Galeno vocatur.

Difficilius fuit iudicare, quid pro CHALCITIDE accipiendum esset, cum Attramentum Sutorium (quod *Χάλκιον*,) *Σῶρον*, *Μίσου*, *Χαλκίτης* parum ab inuicem differre videantur. Et quanquam non grauis esset error, si *Χάλκιον*, vel *Μίσου*, vel *Σῶρον*, pro Chalcitide posuissemus (sunt enim facultatis eiusdem) tamen Chalcitin veram maluimus accipere : quam (ut præcipit) assari curauimus, & quod magis spumofum erat accepimus. *Χαλκίτης* Vitriolum Romanum non est, quanquam easdem habeat facultates, sed Chalcanthi videtur species: quæ vrenda est donec nihil viridis appareat; estque *χαλκοειδής*, id est, similis

æri. Vrunt Pharmacopœi Chalcitin donec rubra fiat : sed ineptè illi ; non enim usque adeò est adurenda. Ait enim Galen. vrendam donec fiat cineritia , & amittat viride , vt ostendat quantitatem adustionis. Nos itaque legimus, *tofta* ; & non, *vfta* , vt est apud Galenum.

Quid sit *Amomum* , vt ingenuè fatear, ignoro : malo enim meam fateri ignorantiam , quàm studiosis hac in re aliquomodo imponere. Non me latet , multos fuisse in Gallia & in Hispania, qui se inuenisse gloriantur ; cum nihil minùs fecerint. Nam semen illud quod pro *Amomo* monstrant , inodorum , nigrum , lene, gustu neque acre neque erodens est ; cum debeat esse candidum , modicè rufum , semine plenum , vuarum racemis simile, ponderosum , odoratissimum , acre gustu, & erodens. Nos pro *Amomo* *Acorum* posuimus. *Amomum* , vt inquit Gal. *Acorum* similem facultatem obtinet. Ergo *Acorum* pro *Amomo* nefas non erit ponere. Sunt qui *Amomum* Rosam [seu *Pomum*] Hierichontis dicant : quod carè admodum venditur, ob id quòd mulieres fabulentur cōducere ad partum. In Alexandria frequens ; & ad nos adueheretur, si præmoniti essent mercatores.

Mirabitur aliquis ; quòd pro *Acoro* in omnibus locis Galangam crassam, non

vulgarem illam radicem posuerimus. Sed, ne id temerè factum existimes, sciendum est, hanc vulgarem radicem Acorum non posse esse, tum quia rubra est, & ingrato odore: cùm vera Acorus albam habeat radicem, gustu acrem, odore non insuauem, vt ait Diosc. Cùm autem hæc omnia in Galanga manifestissimè inueniantur, &, vt Musa testatur, florem croceum & folia Iridis angustiora habeat, Acorum dicimus esse.

Et si Fuchsius Valerianã neget esse PHV, Valerianam pro Phu posuimus: non enim valere eius ratio. Phu caulis λεῖτον καὶ τευφί-
εός, id est, lenis & tener existit: Valeriana caulis angulosus: cùm herba & lenis & quadrato caule possit esse. Quod de floribus dicit, similes Narcisso non esse, verisimile videtur: flores tamen habere pallidos, sicut & Narcissus: quod sufficit, cùm omnes aliæ notæ nullo pacto discrepent.

CARPOBALSAMVM vulgare nullam aut paucam vim habere videtur; & puto semen esse Terebinthi. Eam ob causam Cubebas vulgò vocatas ponendas dixerim, quæ forsitan veriùs sint Carpobalsamum, quàm Carpesium; nisi reclamet Actuarius. At Gal. lib. de Antidotis Carpesium dicit esse herbam Phu appellato genere similem; validiorem tamen, atque aromaticum quiddam plus olentem. Et eodem lo-

co : Tenuia quædam Carpesii sarmenta Cinnamomi virgultis similia sunt; non semen igitur potest esse. Cubebæ autem non multum viribus & temperamento differunt à Carpobalsamo. Diosc. ait Carpobalsamum adulterari semine Hyperico simili; quod Terebinthi semen esse videtur, ut ex Theophrasto patet.

PRO ACACIA, Prunellorum succum ponere, non est absurdum. Potest & Rhus pro Acacia poni; quia, ut ait Diosc. folia Acaciæ effectus præbent, ut in Succedaneis reperitur succus Lentisci.

BITUMEN IYDAICVM, Græcis Ἀσφάλτης, communiter laudatur quod purpuræ modo splendet. Nigrum adulteratum est. Sed cum aliud non aduehatur nisi pice imbutum, dosin augere oportet. Eiusdem facultatis est cum Pissasphaltum, quod vulgo Mumiam appellant. Pissasphaltum autem mediam facultatem habet inter Picem & Asphaltum: eam ob causam Auicenna & quidam alii pro Bitumine Mumiam ponunt, Asphaltum deprehendentes ex odore Trifolii fœtidi, quod à Bituminis odore Ἀσφάλτης dictum est. Quod ad nos adfertur, Pissasphaltum est. Cum Diosc. ait probari si purpuræ modo splendeat, non ita intelligendum est quasi velit habere purpuræ colorem, sed quod in sua nigredine splendeat ut Purpura in

fuo colore; aut quod simile fit purpuræ exsaturatæ, quæ quodammodo ad nigredinem tendit. Plurimis locis prouenit, vt in Aruernia, &c.

CENTAVRII TENVIS [aut M I N O R I S] folia & flores ponimus, non radices, quas tanquam inutiles reiecit Galen. & Diosc. et si Lumen illud Pharmacopolarum aliter sentiat.

Ne quis nos reprehendat, quòd A R I S T O L O C H I A M tenuem, non Clematitin aut Rotundam, vt in lib. ad Pamphilianum scriptum est, adiecerimus: non enim id temerè factum est: Nam in carminibus scriptum inuenimus, *Ἐλατὶς ῥίζα Ἀριστολόχου*: & ad Pisonem tenuem dicit. huc accedit quod de Clematiti ait Galen. Quæ Clematitis appellatur, fragrantior est, ita vt ad vnguenta vtantur vnguentarii; sed ad sanationes infirmior. Hic autem non ad voluptatem sed ad sanitatem ponitur: *tenuis* igitur ponenda est: castigandusque est locus ille, ne parum cauti fallantur. Interpres Centunculum vertit: Centunculum autem Latini appellant Gnaphalion. Si autem addatur Gnaphalion, id erit præter Andromachi, Galeni, aliorumque mentem. Nec interpretibus semper fides est adhibenda, etiamsi Græcè & Latinè periti sint. Malim enim illos minùs disertos esse, & rerum bene peri-

tos : hi siquidem solœcisum in nominibus dumtaxat committunt ; illi autem in rebus & sæpè in vita. Hic itaque neque rotundâ Aristolochiam, neque Clematitin aut [Pistolochiam, aut] Polyrrhizon, quæ vnguentis parandis aptiores sunt, impone-
mus : sed Longam dumtaxat Aristolochiam, siue Tenuem, quæ ad medicamenta conuenit. Proueniunt autem omnes Aristolochiæ species, quæ quatuor sunt, frequentissimè agro Mompeliano. Quam pro Longa pingit Fuchsius, Clematitis est.

Qui cornicum oculos configunt, hunc CALAMVM ODORATVM reiciunt ; non quia inefficax sit, sed quia Calamus araneis non est plenus. Fieri autem potest, vt Calamus dicatur, eius autem radix tantum sit in vsu, vt de Spica admonuimus. Sin tibi hæc ratio non placet, aliam accipe. Dux sunt species Calami odorati : Alter, qui à Galeno describitur : Alter in Mæotide nascens, radice subalbida, sine calamis, intus plena & amara, specie Acori : quem Calamum falsò quidam Acorum esse putauerunt ; in quorum numero fuit Mæoardus, qui pro Acoro Calamum aromaticum semper ponit. At vtrumque genus Acorum odore superat. Non igitur reicienda hæc radix, cum Calami sit radix.

XYLOBALSAMVM hoc commune

verum sit nec ne , incerti planè sumus : nam quicunque de Balsamo scripsere , inter se dissentiunt. Quòd inefficax sit , facilè quilibet iudicare potest ex odore , sapore & crassitie partium. Sin autem pro eo ligno incognito & adulterato , Zedoariâ vulgo dictâ quis vti voluerit , sine noxâ poterit. Zedoaria enim calida & sicca est in secundo ordine , vt Xylobalsamum ; valet aduersus yenena , & pestem. Commodè itaque illa vti possumus , quandoquidem temperamento & viribus respondeat Xylobalsamo. Non autem in omnibus sumenda pro Xylobalsamo : sed hîc , quia iam semel in hac compositione posita sunt succedanea eius , maluimus hac radice vti.

De A M A R A C O si Nicolaus Præpositus dubitet , non mirum est ; cùm res admodùm obscura sit , & ad iudicandum difficilis. Nam Diosc. Plin. Columella , Lucret. Virgil. Diocles medicus , vno ore Amaracum Sampsuchum appellant : Galenus tamen & Paulus diuersas herbas tradunt. nam in 3^o ordine calef. & exsic. Sampsuchum collocât ; Amaracû verò in 2^o siccare & tertio calefacere volunt. Amaracus Galeno & Paulo Matricaria vulgaris est , & Parthenion Diosc. atque vtramque ponemus : quanquam non multum referret si neutra poneretur ; nam , vt Gal. testatur ,
multi

multi suo tempore & Marum & Amara-
cum reiciebant.

Hæc sunt, Candide Lector, quæ cum
festinatione quadam annotauimus. Et hoc
esto Exemplar eius quæ ex Consilio Docto-
rum Mompelii dispensatur.

Theriaca Andromachi, quæ *καλὴν*, id
est, Tranquilla cognominatur.

R. *Pastillorum Scillinorum* ʒ xlviij.

Pastillorum Theriacorum

Magmatis Hedychroi

Piperis nigri

Opii *singul.* ʒ xxiiij.

Rosarum siccarum

Scordii Cretensis

Seminis Napi

Iridis Illyrice

Agarici Pontici

Cinnamomi

Glycyrrhizæ succi

Opobalsami *Singul.* ʒ xij.

Myrrha, Croci

Gingiberis

Rhapontici, [*non Rhabarbari, ut habet*
Cordus]

Radicis Quinquefolii

Nepitæ, siue Calamintha montana

Marrubii

Petroselinii Macedonici

*Stæchados**Coffi**Piperis albi**Piperis nigri* [*al. longi*]*Dictamnî Cretensis**Junci odorati**Turis**Terebinthina**Cassia* [*fistula*]*Nardi Indica* *ſing. ʒ vj.**Poliî Cretensis**Seseliis**Styracis**Seminis Apii* [*in aliis doct*]*Thlaſpi**Ammeos**Chamedryos**Chamæpityos**Succi Hypocisthidis**Malabathri**Nardi Gallica**Radic. Gentiana**Aniſi**Mei Athamantici**Seminis Fœniculi**Terra Lemnia**Chalcitidis roſta**Amomi**Acori**Phu Pontici**Carpobalsami**Hypo-*

*Hyperici**Acacia**Gummi**Cardamomi sing. ʒ iiij.**Seminis Dauci**Galbani**Sagapeni**Opopanacia**Bituminis**Castorei**Centaurei tenuis**Aristolochie tenuis sing. ʒ ij.*

*Mellis Attici despumati ʒ CL [male ʒ pro ʒ
posita] hoc est lib. xij. unc. vj. alibi Ron-*
let. lib x tantum habet.

Vini Falerni q. s.

ADMONITVM autem hîc velim Lecto-
rem, vt huius Compositionis normâ exactè
contempletur, quæ illi plurimum prodesse
poterit in aliis Medicamentis diiudican-
dis. Omnes enim hîc ferè traduntur
Canones qui in huiusmodi compositioni-
bus tradi solent. E quorum numero pau-
cos colligemus, vt memoria suppeditabit.

Primùm itaque in omni Compositione
id observandum, vt præcipua & veluti to-
tius medicamenti fundamenta primo lo-
co ponantur, quod hîc etiam observatum
est in Pastillis Scillinis & Theriacalibus.
Iuvat enim plurimum non in Composi-
tionibus solùm, sed in reliquis omnibus,
si aptus

fi aptus ordo seruetur Paraturus igitur medicamentum, in summis digitis habere debet quæcunque illud ingredi debeant; & ex his considerare quæ decoctionem ferre possint, quæ minimè: Ex his rursus quæ decoctionem ferunt, ea primo loco imponat quæ diutiùs decoctionem ferunt; ut radices densas & inodoras: Odoratae enim & raræ decoctionem non ferrent: Deinde ea iniiciat quæ minùs coctionem ferunt, ut herbas: Postremò quæ nullam omnino. Præterea quæ simpl. maiori quantitate assumuntur, ea primo loco imponenda: quæ minori, secundo loco: atque ita deinceps gradatim; ut in hac Compositione est observatum. Eius enim prima dosis est drachmarum 48. Altera 24. tertia 12. quarta 6. quinta 4. vltima (melle dempto) drachmarum 2. Sed & alius Canon observandus est, & hîc observatus, nempe: Ea quæ ad alterationem ponuntur. maiori debere esse quantitate: quæ verò ad castigationem, minori. His annexæ sunt Regulæ generales, ad maiorem institutionem.

THEOREMATA SIVE PRÆCEPTA DVO

*Ordinis aut Dispositionis Simplicium
medicamentorum,*

*desumpta ex libro de Ponderibus
Dom. Rondeletii.*

THEOREMATA duo sunt in hac re spectanda : quorum vnum, & magis necessarium, vt imperitiæ iuniorum Pharmacopolarum subueniatur, à bene parandi ratione desumeretur : Alterum à quantitate vel dignitate medicamentorum tam simplicium, quàm compositarum, quæ, ratione compositionis faciendæ Simplicium conditionem præse ferunt.

Ad primum veniamus: illudque ita constituamus. Quæcunque accuratiore & longiore præparatione egent, ea priorem locum debent obtinere : hoc est, si quid difficiliùs tritureretur, infundatur, coquatur, aut misceatur, priùs triturationi, infusioni, cōctioni, mixtioni est mandandum : quod vt indicetur, inter trituranda, infundenda, coquenda, miscenda, priùs scribatur. Si autem infundendorum, vel coquendorum, vel miscendorum
vnum

vnũ aliquod , breuiori infusione , vel coctione , vel mixtione egeat , & præterea trituratione , hoc postponatur ; duplici de causa : vna , quæ iam dicta est , altera , vt dum alia infunduntur , vel coquuntur , vel miscentur , hoc tritulari possit ; sicque nulla fiat temporis iactura : cuius metu sæpenuerò Pharmacopola , tãtò cum scelere , omnia perturbant ; vt eorum quæ minùs coquenda sunt , sæpe vis prorsus perdatur nimia coctione ; contrà , ea quæ longissima coctione egeat , cùm eorum vis à mediocritate erui non possit , quãta necessaria est non extrahatur. Quod idem in aliis præparandi formis evenit. Quam rationem hodie à quamplurimis , dicam , Empiricis negligi apparet , qui infundunt simul & decoquunt Guaiaci rasuram , Santalos , Cinnamomum , Sennam , & alia multa : quorum vel ea quæ sunt odorata & laxantia , vim suam amittunt , vel alia non satis decoquuntur , vel vtrumque contingit.

Secundum Theorema est, ut ea quæ maiorem sui quantitatem toti Compositioni tribuunt, & nobiliora sunt, priorem sedem occupent : quod est erurum ex præscriptis antiquorum, qui in componendis medicamentis hoc solum spectârunt ; tantùm excipientes ea quæ materiæ vice aliquando in fine collocantur, Ut videre est in descri-

descriptione Pilularum de Hermodactylis, apud Mesuem. Recipiunt enim primo ordine Hermodactylorum \mathfrak{z} v. deinceps alia in mediis sedibus sequuntur, pro maiori & minori quãtitate; tandem Aloë, quia matericẽ vices gerit, ad \mathfrak{z} x ponitur. Idem factum est in Pilulis Sebillinis; in quibus Spica Nardi ponitur in prima sede, ob quãtitate[m] & nobilitate[m].

In Aromatico Rosato maiore, ex descriptione Gabrielis, Rosę in prima sede positã, reliqua copiã superant.

Idem in Antidoto Philonis, apud Mesuem, Piper album, & Hyoscyamus, obtinent; in qua Compositione manifestè appãret ordo medicamentorum seruandus secundum maiorem & minorem quãtitate[m]; ita vt maxima quãtitas primo loco ponatur, minima verò vltimo; cùm Piperis albi & Hyoscyami hĩc recipiantur ana \mathfrak{z} ix. Opii \mathfrak{z} x. Croci \mathfrak{z} v. Spicę, Pyrethri, Castorei, ana \mathfrak{z} j.

In Theriaces descriptione hoc palam fit: sed quia ea est longior; vtque mos antiquorum malids innotescat, non metædebit separatim eam transscribere, & crassa Minerva excutere doses. Exactè eius castigatiõem, & rectum componendi modum, præcedenti opusculo tradidi.

Animaduertendum igitur est antiquos postea quam se ita collocaioni petendã à sola

sola quantitate addixissent, vidisse de-
 mum rationem præparandi: & in hac re
 ordinem esse apprimè necessarium: co-
 actosque fuisse multa verborum congerie
 explicare, quod ipse in scribendo ordo
 indicare potuisset: & is mos eos excusa-
 uit in magnis Compositionibus faciendis;
 cùm neque forsan solus ordo satis id in-
 dicasset.

Sed cùm in illis quæ ad horas præscri-
 buntur, hoc fieri non liceat, neque etiam
 ipsi fecerunt in iis quæ nobis scripta reli-
 querunt, nisi admodum paucis: in eo quod
 mox dicturus sum, totus collocationis
 cardo vertetur; vbi annotauero, antiquos
 minùs bene & comptè fecisse, qui aliquan-
 do dosim medicamentorum, quorum
 idem ordo erat, diuiserunt: vt in Theria-
 ca videre est, Rosarum siccarum ʒ xij. Iri-
 dis Illiricæ ʒ xij. cùm per ana, quod sic
 notatur añ. vno numeratore designare po-
 tuissent.

Nec mihi minùs ridendi, qui idem ho-
 die faciunt, (nisi id præparationis ratione
 fiat) videntur.

Igitur, secundū Theorema priori adiun-
 gentes, hunc ordinem in præscribendo
 constantissimè obseruemus, vt primo or-
 dine collocemus ea, quæ longiori egent
 præparatione. In hoc autem rursus id con-
 sideremus, vt eandem præparationem po-
 stulan-

Stulantium ea primùm ponantur, quæ maiorem copiam requirunt.

Eandem præparationem & quantitatem requirentium, & mensurandi modum, vt lib. vel vnc. vel M. vel P. ea prima collocentur, quæ commoditate, aut nobilitate aliqua præstant. Sicque fiet, vt manum præscriptionibus admouentes, nullo pacto hæreamus mente, ab hocne, vel illo, ordiendum sit: sed cognito scopo, medicamenti que proprietate, & nobilitate, statim ab eo quod opus est, initium faciemus: id quod erit vice materiæ (siue vnum, siue plura id faciant) si in eo vel coctio, vel infusio, vel mixtio sit facienda totius compositionis, primùm omnium; si autem infusum, vel decoctum, vel tota mixtio, iam facta, ei sit adiungenda, vltimum, quantæcunque sit copię, & quantitatis, collocemus.

Quod vt exemplo aliquantulum illustremus, id petamus à re quæ est frequentior, videlicet plantarum partibus: vt cum earum radices duriori sint substantiâ, & magis crudâ, longiori que decoctione & trituratione egeant; proinde in primâ sede ponantur, præcipuè quę aperiunt, & incidunt: tum ligna non odorata, & cortices; deinde folia herbarum: tertio loco fructus: quarto semina: vltimo flores, & quæcunque sunt odorata, vel laxantia.

Quod facit vt radices inde patiantur exceptionem: laxantes enim primo loco non ponuntur.

Denique ratio præparationis tantum potest, vt nihil tam generale adferri possit, quod frequenter non patiatur aliquid peculiaris & singularis doctrinæ: vt si quid ad alicuius medicamenti meliorem, vel faciliorem actionem faciendam vel castigandam adhibeatur, cuiuscunque sit quantitatis, id quod habet castigandum illico sequatur necesse est, vt eius vis non nisi castigata & melior facta, ne tantillum quidem extrahatur: vt Zingiber & Sal Gemmæ mox post Agaricum: Spica & Cinnamonum post Rhabarbarum: Castoreum, Crocus & Myrrha post Opium: & sic de similibus.

Primum animaduertendum est, id quod in prima acie descriptionis Theriacis est positum, esse in maxima quantitate. Id autem factum fuit fortè, quòd medicamentum ex Scilla, scopis magis conuenit. Facta enim est hæc Compositio primùm ad venena, & morbos contumaces & diuturnos: sed Trochisci de Scilla venenis frigidis manifesta qualitate aduersantur, item puncturis & moribus venenatorum animalium: nec minùs valet ad humorum contumaciam, Tales enim morbi sunt à crassis, frigidis & viscidis humoribus, vel

vel in remotis & profundis partibus sitis; ad quas causas valet potissimum Scilla, incidendo, attenuando, & ad altas partes penetrando; digerendoque humores crassos.

In secundo ordine, Trochisci Theriacales, & Magma Hedychoi, Cinamomum, Piper nigrum, vel longum: sed longum magis conuenit; & descriptio quæ legitur apud Galenum ad Pisonem, & apud Auicennam, *longum* habet; tum descriptio Carmine scripta. Conuenit enim magis Antidotis Longum, si Dioscoridi credimus.

Hæc omnia, cum Trochiscis de Scilla, & ad venena, & ad morbos contumaces, conueniunt.

Opium autem in hac descriptione, ut præcedentia ad drach. xiv. ponitur, quia hæc compositio ad dolores sedandos parata est, unde nomen sibi *καλυν*, quod transcribunt Latine *Galene*, comparauit, quia tranquillitatem adfert; & propter vim Opii, & ad veneni præcautionem & curationem facit, ut ex Galeno colligimus.

Valet enim Theriaca, eodem teste, cum recens est, ad venena; cum vero antiqua, ad morbos diuturnos. Quod si recens valeat ad venena, id fit propter vim Opii, quæ maior est in recenti, quàm in antiqua.

Et mihi placet Ioannis Schironii ratio, nostræ quondam Academiae Cancellarii eruditissimi, qui dicebat Opium additum, istis magnis compositionibus, magis esse ad vires calidorum medicamentorum conservandas. Calida enim, & quæ tenuiū partium sunt, continuò exsoluuntur ab aëre ambiente, qui semper agit in medicamēta.

Quare cū tot sint in hac Compositione calida, & anodyna fortissima esse debeant; nemini mirum esse debet, quòd ad drach. 24. Opium posuerint.

Hanc rationem non nōrunt, qui ex Tryphera magnā Opium expungūt, etiam si ad affectus vteri præscribatur. Nam si tantopere narcotica verentur, cur Mandragoræ corticem non expunxerunt? non enim minùs vtero sua frigiditate aduersatur, quàm Opium. Sed hæc missa faciamus; & ad reliqua veniamus.

Iris Illyrica, & Glycyrrhiza, Opobalsamum, Rosæ aridæ, Scordium, semen Napi, vel Rapæ agrestis (quod magis conuenit,) vel quia minùs aduersantur venenis, vel minùs conueniunt, quàm supradicta, vel ad meliorem actionem tantum adhibentur, dosim habent dimidiam secundæ doseos, vt secunda primæ item est dimidia, scilicet ʒ xij. Quæ sequuntur, ʒ vj. recipiunt, hoc est, dimidium præcedentis dosis.

Quæ

Quæ sequuntur hanc, eadem quantitate ponuntur : sed cenſeo omnia iungenda, quæ eiusdem ſunt quantitatis: alioqui ſunt duæ claſſes eiusdem ponderis in eodem medicamento ; quod ridiculum, ut iam dixi.

Quia tamen ordinis pondus eſt drach. 4. quia quæ ponuntur in hac claſſe, partim ingrata, partim rara, partim efficaciffima ſunt: quare ſi præcedentium copiam eſſent ſecuta, maior eorum quãtitas fuiſſet, quàm par erat. Chalcitis enim ſuo odore, ſapore, adſtrictione periculofa eſt: alia autem ſunt efficacìa valdè calfaciendo, vel adſtringendo ; quare minore quantitate poſita fuêre. Quod ſi præcedentem progrediendi modum ſecutus fuiſſet, prioris doſis dimidium ſumendo, minor iuſto quantitas fuiſſet aſſumpta ; ob id non 3 iij. ſed 3 iiij. poſuit.

Quæ ſequuntur, vel quia fœtida, vel ſuo ſapore vel conſiſtentiâ ingrata, ad 3 ij. ponuntur, dimidium ſcilicet proximè præcedentium. Sunt autem, ſemen Dau-ci, Bitumen, Opopanacum, Caſtoreum, Centaureum minus, & Ariſtolochia. Hæc efficaciffima ſunt, & ingrata : quare minima quantitate, & ultima ſede ponuntur.

Vnde appâret illius Theorematis veritas, quo docebamus, Efficaciffima, & ingrata, & rara, & ſcopo minùs conue-

558 GUILIEL. RONDELETTI
nientia, in parua quantitate esse impo-
nenda.

Quòd autem Mellis lib. 14 [al. 10.] po-
nat, ostendit illud Theorema verum esse,
quod de materia remediorum diximus;
nempe materiam, vel quæ materiæ vices
gerunt, quantitate reliqua medicamenta
superare debere.

Quòd Vinum addiderint sine quantita-
te, id factum fuit, quia quantitas indi-
cari non potest. Ponenda proinde ea erit,
quæ necessaria est ad diluendam medica-
menti spissitudinem. Mel enim inspissat,
conseruat, & dulcorat tantum: & quia ali-
quando crassius, aliquando liquidius; ali-
quando etiam plus Vini, aliquando minus
imponimus.

Quare nemini mirum esse debet, si
Semper Vini, Mellis, Syrupi, Sacchari,
Olei & Cerae quātitatem non annotemus,
sed *quod sufficit* dicamus.

Hic præterea notare oportet; herbas
pondere mensurari, quia sicce vsurpantur:
item radices, fructus, flores, semina &
lacrymas etiam pondere.

Chalcitis semi-vsta in hoc remedio po-
nitur, quanquam inter venenosa annu-
meretur; valet enim ad Fungos.

Multa etiam alia hic annotare possem,
quæ in castigatione huius nobilis Côm-
positionis docuimus. Sed quia hæc præ-
ter

ter institutum sunt, silentio prætereo.

Sed de his hætenus. Nunc Theriaces facultates breuiter persequamur.

THERIACA MAGNA ad eadem valet ad quæ Asyncritum. Efficacior tamen est ad omnia. Sed eadem hîc obseruandæ limitationes, quæ illîc, sit ne scilicet Recens, an Antiqua. Recens enim vt frigidior est, sic ad morbos calidos conuenit: Antiqua frigidis opitulatur: Quæ mediæ ætatis est, morbis medio modo se habentibus confert. Sed neque id nouisse sufficit. Nam propriis cuilibet affectui medicamenti commisceri debet. Exempli gratia: si ad fluxum sanguinis, cum aqua Bursæ pastoris misceatur: & sic de reliquis.

Apoplexiæ prodest, si valdè antiqua detur: quia in tali affectu egemus attenuatione humorum crassorum apoplexiam comitantium.

Epilepticis conuenit recens; etiam si epilepsia sit à nimio sensu: nam recens obtundit sensum illum exactum. Si verò fiat ab humore crasso (quod scio rarissimè accidere) exhibenda antiqua.

Rauedini vocis, si à crassis humoribus fiat, conuenit antiqua; sin à defluxione tenui, recens.

Asthmati recens, si à retentione calidorum; sin à crassis humoribus, antiqua.

Ictericis & Hydropicis antiqua. Peripneumoniciis & pleuriticis recēs datur in principio, cū tales affectus fiāt per defluxionem; idque cum aqua hordei. Iliosirecens, quia inflammatio est. Dysentericis recens, cum succo aliquo refrigerante. Nephriticis recens, ad sedandum dolorem.

Menstrua educit antiquissima. Neque solū educit & prouocat menstrua; sed & immodicas menstruas fluxiones sistit, vt inquit Galenus lib. de Theriaca ad Pisonem: Mistam variamque facultatem, inquit, habet. Ideō alia diffundens extenuansque cogit excerni; alia, quæ ob natiuæ virtutis imbecillitatem superflua excernuntur, viribus partium confirmatis solet inhibere.

Lepras & Variolas emendat antiqua.

Præcipuè contra omnia venena recens, quia venenum est tenuissimum partium. Tota itaque cura consistere debet in conservando corde, ne ad illud scilicet penetret vis veneni. Incrassandi sunt ergo meatus: Hoc autem medicamentum recens non modò incrassat, sed & refrigerat; verumque est Alexipharmacum.

Omni defectionem sensuum leuat antiqua: recens enim magis sensus stupefaceret. Retardat senectutē, inquit Gal. quia excrementa corporis absūmit, & euacuat.

Quar-

Quartanis febribus & contumacibus soluendis apta est Theriaca antiqua (quod experienciâ comprobatum est Mompelii ann 1551.) ubi iam apparent signa concoctionis. Cùm enim Pharmacopœus quidam iam diu laborasset quartana inexpugnabili, eâ solatus est media hyeme, solo usu triduo Theriacæ à nobis præscripto.

Expertus sum præterea Dysenterici convenire. Acceperat enim Scriba quidam satis inconsultè ꝓ ij Colocynthidis, vnde in Dysenteriam inciderat. Præbui illi ꝓ j. Theriacæ nuper paratæ : & convaluit eo solo remedio exhibito. Rursum ederant quidam salsamenta putrida: è quibus duo obierunt; tertius, me consulto, vomitione factâ Theriacam sum. sit, & curatus est.

U t autem finem dicendi faciam : Recens valet aduersus venena; antiqua verò aduersus morbos diuturnos & inueteratos.

Rejicio eorum sententiam, qui Theriacam pueris recens natis præbent, ne sint obnoxii (vt aiunt mulierculæ) venenis. Data enim pueris iam primùm in lucem editis, calorem natium obtruere potest. Recens, cùm frigida admodum sit : Antiqua vero sua caliditate euanescere faceret eundem calorem.

Varia autem eius est dosis : quæ à mul.

ris indicationibus sumitur. Si enim affecta pars sit remota, ratione optima dabitur maiori quantitate, quàm si sit propinqua: vt si ad Podagram, dari debet maiori quantitate, quàm si ad Ventericulum. Recens item minori quantitate danda est, quàm antiqua. Recens enim in periculo non vacat; at antiqua, ratione caliditatis, naturæ amiciores est. Calidum enim quodam modo secundum naturam est.

Hæc sunt Theriacæ commoda, quæ persequi nobis libuit. Plura require apud Galenum de Theriaca ad Pisonem; qui sigillatim eius facultates describit.

THERIACES & MITHRIDATII

*miscendi parandique ratio,
ex Lobelio.*

PRIMARI huius nobilissimi Antidoti concinnatores Veneti, terenda duriora & crassiora, ordine contundunt, in lebetem iustæ magnitudinis indunt, permiscunt: quæ deinde in variis pilis æneis, siue mortariis exactè & operosè ab operariis tunduntur; humidis siccis immixtis, distributisque, & pilis inter tundendum Opobalsami succedaneo iunctis, ne pilis & pistillis adhæreant, & pollinis instar exhalent.

Oliba-

Olibanum , Gummi, Lachrymas per se terunt , ne cum aliis trita coëant , aut co-
hærendo in grumos coalescant, cribratio-
nemque impédiant.

Agaricum , priùs deraſum , teritur &
cribratur , aut Ceruſæ modo ad Emplaſtra
fricando per ſetaceum traicitur.

Trochiſci per ſe teruntur.

Sagapenum , Galbanum, & huiusmodi
lachrymæ Vino paſſo ſive Cretico ſoluan-
tur , & per cribrum fricando cernuntur.

Styracis doſim quidam auarè ſordidi au-
gent , qui Styracè puriſſima in guttis vo-
cata (reperitur ſedulis tamen hodie facili)
carent : quam exactiſſimè terunt , morta-
rio & piſtillo calefactis , æquali affuſo
Mellis deſœcati pondere, per ſetaceũ traii-
ciunt : cui deinde Terebinthinam feliciùs
miſcent, quàm Galbano , ex Galei tamen
præcepto.

Quidam Bitumen hodie, ſi liquidum
ſit, quale eſt illud Gallicum Auernienſe,
miſcent cum Terebinthina , & præparata
ſive tranſcolata Styrace. Si verò durum
aut aridum ſit , cum Chalcitide in mar-
moreo lapide lauigant.

Inclyti Collegii Medici Londinenſium

T H E R I A C E S formula,

ex eodem Lobelio.

Ab inclyto Medicorum Londinenſium

A a 6

Col.

Collegio vtilissimum hoc Alexipharmacum, Epidemicis contagiosisque febribus grassantibus, ciuem etiamque egenum seruandi gratiâ scitè excogitatum fuit. Eadem ferè recipit, iisdemque viribus pollet, quibus Fracastorii Diascordium, & celeberrimum Dodonæi aliorumque practificantium Belgii ad Pestem Electuarium, Carlinæ radice addita, sine tamen Opio. Ab effectu Theriaca vocata.

R̄. Cornu ceruini lima derasi ℥ ij.
 Seminum Citri Oxalidis Pæoniæ
 Ocymi ana ℥ j.
 Scordii, Corallinæ ana ʒ vj.
 Radicum Angelicæ Tormentillæ
 Pæoniæ
 Foliorum Dictami
 Baccarum Iuniperi Lauri ana ℥ β.
 Florum Calendulæ
 Caryophyl. Anthos
 Summitatum Hyperici
 Nucis Moschatæ Croci ana ʒ iiij.
 Radicum Gentianæ Zedoariæ
 Zingiberis
 Macis Myrrhæ
 Scabiosæ, Succisæ
 Carui benedicti ana ʒ ij.
 Caryophyllorum, Opii ana ʒ j.
 Omphacii & Mellis optimi ana q. s.

FOR.

FORMVLÆ

SELECTIONVM PHARMACORVM,

quorum vsus post Valerium Cordum
in Illustrium aliquot Rerumpublica-
rum Officinis receptus est.

*Theriaca Pauperum, ex Diateffaro
composita.*

℞. Gentianę Baccarum Lauri
Myrrhæ
Aristolochiæ rotundæ ana ʒ ij.
Boli Armeni præp. Dictamni albi
Tormentillæ Scordii
Carlinæ Zedoariæ ana ʒ j.
Rob Sambuci Iuniperi ana ʒ x.
Mellis q. s. Misce.

*Electuarium contra pestem,
pro pauperibus.*

℞. Ficum pinguium lib. dimidiata
Nucum iuglandium ʒ ij.
Fol. Rutæ ʒ iiij.
Zedoarię ʒ ij.
Boli Armeni ʒ iiij.
Rob Iuniperini ʒ ij.
Rad. Gentianæ ʒ j.
Theriacæ electæ ʒ iiij.

Syrupi de succo Acetosæ q. l.
Fiat Electuarium.

Diascordium Fracastorii.

R. Cinnamomi

Cassia lignæ ana ʒ β.

Scordii veri ʒ j.

Dictamni Cretici Tormentillæ

Bistortæ ana ʒ β.

Galbani Gummi Arabici ana ʒ iiij.

Opii ʒ j. β.

Styracis Calamitæ ʒ iiij. β.

Seminis Acetosæ ʒ j. β.

Gentianæ ʒ iiij.

Boli Armeni ʒ j. β.

Terræ Lemniæ ʒ β.

Piperis longi Zingiberis ana ʒ ij.

Mellis albi lib. ij. β.

Conseruæ Rosarum lib. j.

Vini aromatici lib. β.

Fiat Electuarium l. a.

Confert in febribus contagiosis pestilentibus, vbi potissimum Theriaca & alia magna Antidota locum non habent, vt in pueris & grauidis. In Cephalalgia etiam Epidemica, cum aqua Oxalidis aut Trifolii acetosi feliciter exhibetur. Fracastorius in peste correptis ac extremè desperatis hoc modo exhibet: Succu Liniulæ sive Oxydis ʒ ij. Succu Citri ʒ j. Diascordii

scordii 3 j. Specier. cord. è Gemmis
 3 ij. Aceti 3 j. misce. Omnia mixta
 dentur simul : & repetatur quoties opus
 fuerit.

*Electuarium de Ovo , Maximiliani I.
 Imperatoris.*

R. Ouum Gallinæ recens : & educto per
 apicem Albumine , id quod vacuum est
 Croco Orientali non puluerisato , imple,
 vitellum non auferendo : postea cum alio
 putamine iterum occlude , ne quid tran-
 spiret , & lento igne , vel post fornacem
 tamdiu assa in ollula , donec tora oui testa
 nigrescere incipiat ; diligenter cauendo
 ne Crocus comburatur. Exemta è testa
 materia exsiccetur , vt in mortario exqui-
 sissimè contundi , & in puluerem redigi
 queat ; addendo pulueris Sinapis albi quā-
 tum prædicta omnia ponderant. Postea

R. Pulueris Dictamni albi

Tormentillæ ana 3 ij.

Myrrhæ Cornu cerui

Nucis Vomica ana 3 j.

Rad. Angelicæ

Pimpinellæ

Granorum Iuniperi

Zedoariæ

Camphoræ ana 3 β.

Misce omnia simul in mortario : &

tan-

tandem adice Theriaces optimæ ad pondus omnium , ac iterum pistillo fortiter contunde, & commisce, per tres quasi integras horas agitando: deinde fiat Electuarium vt est artis.

Quibus Nux vomica suspecta esse solet (quamvis experientia comprobatum sit, illam Nucem potius canibus & felibus, quàm hominibus, aduersari) substituunt semen Citri, aut Rad. Petasitidis. Præterea si qui à Camphora vehementer afficiuntur, dimidium tantum Camphoræ sumatur, aut etiam omnino omittatur; præsertim si frequenter vsurpandum sit hoc Electuarium loco præseruationis.

Multis experimentis comprobata est excellentia huius Electuarii, & pro secreto habitum fuit, neque diulgandum esse censuerunt quidam. Datur ieiuno magnitudine ciceris, & horas xxiiij à peste præseruat. Peste correptus, si febris adfuerit, capiat de eo aureum vnum ex aqua Plantaginis. Creber apud Germanos huius vsus est, non in peste solùm, sed & in venenis omnis generis depellendis.

*Electuarium de Limatura Chalybis,
pro oppilatis.*

℞. Limaturæ Chalybis ℥ ij. β.

Teratur benè super marmor duriss.

cum

cum aceto in subtiliss. puluerem exsic-
cetur in loco calido, vel ad solem: id-
que septies repetatur. Huius limaturæ sic
præparatæ \mathfrak{z} ij.

Cinnamomi opt.

Nucis muscatæ ana \mathfrak{z} j.

Rhabbari opt. \mathfrak{z} ij.

Specier. Aromatici Rosati \mathfrak{z} j. β .

Mellis opt. despumati & Sacchari clari-
ficati ana \mathfrak{z} iij.

Lento igne fiat Electuarium.

Virginibus cachecticis, quibus menses
non ritè fluunt, & in hepatis obstructio-
ne hoc multùm prodest.

Aliter.

R. Limaturæ Chalybis præparatæ \mathfrak{z} ij.

Specier. Diarhodon abb. Diacurcumæ
ana \mathfrak{z} β .

Epithymi Thymi ana \mathfrak{z} ij.

Mellis despumati q. s.

Est eius vsus frequens in jecoris diu-
turna obstructione, & albo virguncularum
ictero. Datur post purgatum corpus à \mathfrak{z}
ij ad \mathfrak{z} β . subsequente valido aliquo exer-
citio, aut corporis motu vehementiore.

Electuarium Opticum Occonis.

R. Specier. Pliris archontici

Semi-

Seminis Fœniculi ana ʒ j.
 Macis Cubebarum
 Cinnamomi
 Piperis longi
 Caryophyllorum ana ʒ β.
 Euphrasie ʒ β.
 Succī Saluie Rutę
 Chelidonii ana ʒ β.
 Sacchari clarificati ʒ j.
 Mellis Rosati ʒ v.

Coquantur Succī cum Melle ad solidam consistentiam, deinde species tritę addantur.

Ad visus imbecillitatem, & suffusiones confert.

*Pulvis Epilepticus, minus pretiosus,
 seu pro pauperibus.*

℞. Rad. Pręnię collectę luna decre-
 scente ʒ ij.
 Dictamni albi ʒ iiij.
 Visci quercini ʒ j. β.
 Cubebarum
 Coriand. præpar. ana ʒ β.
 Nucis Moschatę ʒ j.
 Fiat pulvis.

*Pulvis partum promouens, Helidei
 de Paduanis, medici Bononiensis.*

℞. Cinnamomi Croci ana ʒ j.

Bora-

Boracis ℥ iiij,

Datur ex aqua Artemisiæ, vel simili.

Augeretur efficacia, si (pro prudentis Medici arbitrio) exigente necessitate, admisceatur testiculorum equinorum aridorum aut iülorum Nucum iuglandium pulvis.

*Pulvis aduersus Scabiem,
in Italia vsitatissimus.*

℞. Sulphuris viui

Nitri veri, vel eius loco Salis Gemmei
Foliorum Maioranæ ana ℥ ij.

Lithargyri aurei

Cort. rad. Ellebori nigri ana ℥ j.

Pimpinellæ ℥ β.

Seorsim trita, cribrata & mista, seruantur: & cum oleo Rosato ac Costino cuti affricantur.

Pulvis pro ulceribus gutturis.

℞. Sulphuris viui ℥ iiij.

Myrrhæ rubæ

Aluminis Saccharini ana ℥ ij.

Mastiches Turis ana ℥ j.

Pyrethri ℥ vj. Fiat pulvis.

℞. huius pulueris ℥ j.

Vini sublimati lib. j.

Pulvis hic felici successu gutturis anti-
qua

qua ac scæda vlcera repurgat & per sanat,
præcipuè in lue venerea.

Pulvis Violarum odoratus.

℞. Iridis Florentinæ ℥ ʒvj.

Rosarum rub. ℥ iiij.

Cyperi ʒ β.

Maio ranæ Caryophyllorum

Styracis ana ℥ j.

Beniouin Santali Citrini ana ℥ β.

Violarum ʒ iiij. [al. ℥ iiij.]

Moschi ʒ j. Fiat pulvis.

Pulvis hic tamen si ad odoramenta præstanda potissimùm expetitur, caput tamen extrinsecus adhibitus eximiè roborat, nec non cordis palpitationi medetur.

Syrupus è Rosis siccis.

℞. Infusionis Rosarum aridarum aliquoties lege artis factæ,

Sacchari ana.

Decoquatur in formam Syrupi.

Alii sumunt dimidiam partem Sacchari, ad infusionem.

Syrupus Althææ, Fernelii.

℞. Rad. Althææ ℥ ij.

Cicerum rubcorum ℥ j.

Rad.

Rad. Graminis Asparagi
 Glycyrrhizæ mund. Vuarum passac. ex-
 purgat. ana \mathfrak{z} β .

Summitatum Althææ Maluæ

Parietariæ Pimpinellæ

Plantaginis

Adianti vtriusque ana manip. j.

Quatuor seminum frigidorum maio-
 rum & minorum ana \mathfrak{z} iiij.

Coquantur ex aquæ libb. sex, dum qua-
 tuor supersint, cum Sacchari albi libris
 quatuor, ad consistentiam Syrupi.

Crassam obstruentemque pituitam, pu-
 ruleptamque taniem & arenulas blandè
 expurgat, citra manifestum calorem. Uri-
 næ præterea mitigat ardorem.

Syrupus Melissa, Fernelii.

R. Rad. Dictamni albi Pentaphylli

Rad. Betonicæ

Doronici Romani ana \mathfrak{z} β .

Foliorum Melissæ Stœbes vel Scabiosæ

Succisæ vel Morsus Diaboli

Florum Buglossi vtriusque

Rorismarini ana manip. j.

Seminis Acetosæ

Citrii mali

Fœniculi Cardui benedicti

Ocimi ana \mathfrak{z} iiij.

Coquantur in aquæ libris iiij. ad dimi-
 dias.

dias. Expresso addantur

Sacchari albi lib. iij. Succi Melissæ
Aquæ Rosarum ana lib. β.

Percuquantur in Syrupum conditum
Cinnamomi & Santali citrini ana ʒ β.

Ante alios cordis palpitationi & syn-
copæ succurrit: peculiariter verò pestilen-
tium & venenatorum morborum mali-
gnitatem obtundit.

Syrupus Augustini Niphi.

℞. Corticum Myrobalanorum citrinorum
Rad. Rhapontici vulg. siue Centaurii ma-
ioris recent.

Fol. Senæ Epithymi ana ʒ j.

Polypodii quercini

Fol. Fumiterræ

Lupulorum recent. ana lib. j.

Glycyrrhizę contusę

Sem. Anisi ana ʒ iij.

Florum Boraginis Buglossæ

Violarum [ana] ʒ ij.

Fiat omnium decoctio ut moris est. De-
cocto excolato, quod erit, ad lib. ij. ad-
misceatur.

Succi Lupulorum

Succi Fumi terræ depurat. ana lib. j.

Sacchari clarificati q. s.

Fiat Syrupus s. a. & condiatur cum pau-
culo Moschi & Ambræ.

Datur

Datur ab vnciis iiij. ad vj. cum aqua
Lupulorum.

In Italia, præsertim Neapoli, est vñtissimus ad cutis vitia, luem venereã, epatis calidam & siccam intemperiem, quartanam ac lentam febrim. Educt pituitam salſam, & humores melancholicos. Patavii addunt Hellebori nigri non nihil.

Syrupus de Scolopendrio, Fernelii.

℞. Polypodii quercini
Rad. Buglossi utriusque
Cort. rad. Capparorum
Cort. Tamarisci ana ʒ ij.
Scolopendrii; veri, seu Ceterach, manipul. iij.

Lupuli Capillorum Veneris
Cuscutæ Melissophylli ana manip. ij.

Coquantur in aquæ libris novem ad remanentiam librarum quinque: colaturæ huic adde Sacchari albi lib. iiij. Percoquantur in Syrupum.

Crassam terrenamque melancholiam extenuat, mollit, fluxilemque reddit: lienem obstructione liberat, tumoremque solvit.

Syrupus de Polypodio.

Varie sunt Syrupi de Polypodio descriptiones

scriptiones. Sed quarum omnium vicem
supplere potest alteruter præcedentium
Syruporum duorum;

*Loboch è Caulibus, seu Brassica,
Gordonii.*

℞. Succi Caulium rubeorum depurati &
clarificati libram vnam

Croci ʒ . ij.

Mellis despumati Sacchari analib. β.

Fiat Eclegma secundum artem.

In morbis pectoris vtile: plurimumque
valet in omni raucedine & ablatione vocis.

Hydromel simplex.

℞. Mellis libram vnam

Aquæ pluviæ vel fontis libras octo

Decoquantur donec Mel non ampliùs
spumat.

Hydromel compositum.

℞. Aquæ fontis libras viginti

Mellis despumati libram vnam

Salviæ Origani an. pug. semis

Anisi Coriandri ana ʒ . j.

Glycyrrhiæ ʒ . ij.

Cinnamomi ʒ . j. β.

Bulliant ad consumptionem quartæ par-
tis, & colentur.

Hydro-

Hydromel purgans.

℞. Hydromelitis ℥ xxxij.
 Caricarum pinguium num. viij.
 Fol. Senæ electæ
 Polypodii quercini ana ℥ β.
 Sem. Anisi ℥ j.
 Cinnamomi ℥ β.
 Zingiberis ℥ j.
 Coquantur ad dimidium ; colaturæ adde
 Sacchari Candi rubei ℥ ij.
 Misce ut artis est.

Eccoproticon felix ; pueris , senibus , ac
 iis quos sedes remorantur , familiare.

Oxymel elleboratum , Gesneri.

℞. Calamenthi Thymi Pulegii
 Cardui Benedicti
 Rosarum rubrarum
 Menthæ crispæ ana p. j.
 Sem. Anisi Ocymi
 Sem. Vrticæ Romanæ
 Sem. Anethi ana ℥ j.
 Rad. Angelicę
 Rad. Fœniculi Althææ
 Scillæ Iridis nostræ
 Turbith ana ℥ β.
 Ellebori albi
 Esulæ præparatæ ana ℥ ii.
 B b Rad.

Rad. Asari ʒ j. β.

Galangæ Cinnamomi

Calami aromatici ana ʒ j.

Omnia trita infunde in aceti acerrimi lib. ij. vel q. s. triduo in sole vel ad fornacem in vitreo vase obturato. Tum decoquantur in olla vitreata ad dimidium ferè; tum colabis, modicè exprimendo, addeſque Mellis deſpumati, Sacchari ana lib. j. & ad conſumptionem Aceti decoques in Syrupi conſiſtentiam. Doſis ad mouendam aluum ab ʒ β. uſque ad ʒ vj. cum decoctione Senæ & Polypodii, vel Syrupo Violato, aliòve ſolutiuo.

Confert Epilepiæ, aſthmati, & omnibus morbis à materia frigida, craſſa, tenaci, à phlegmate & melancholia dependente.

Potus Hippocraticus.

℞. Cinnamomi electi ʒ ij.

Zingiberis

Galangæ ana ʒ ij.

Nucis Moſchatae ʒ j.

Sacchari albiſſimi ʒ xvj.

Vini albi potentis ac odorifeti lib. v.

Macerando probè teſta per horas octo vel decem, poſteaſque ſæpe ſæpiùs percolanda redigantur in potum Hippocraticum; tranſcolatum liquorem aromatibus
in ma-

in manica Hippocratis contentis semper affundendo.

Cerebrum & ventriculum roborat, spiritus auget, vitales facultates fulcit, amissas vires reparat, ac infirmę coctioni opem præstat.

Cremor Ptisane.

℞. Hordei mundi excorticati lib. j.
Aquæ q. s.

Bulliat semel. Facta ebullitione remoueaturs prima aqua, & affundatur recens; quę iterum coquatur ad consumtionem medietatis, ac per pannum coletur.

Tabidis ex vsu est; hecticis, consumptis, & à prolixo morbo extenuatis idoneus ac perutilis.

Mostarda, seu Diasinapi.

℞. Pul. seminis Sinapi lib. iiij. β.
Salis communis albiss. lib. ij.
Vini rubei q. s.

Infundantur per noctem agitata in vase lapideo aut testaceo vitreato amplo; manē addendo

Corticum Citri melle conditorum, & crassiusculè incisorum ℥ iiij.

Conseruæ pro Mostarda lib. xvij.

Melazii, id est, Spumæ Sacchari nigræ

Bb 2

& li

& liquidæ [quam Syrupum vulgus vocat]
lib. xliij.

Caryophyllorum ℥ j. β.

Nucis Moschatæ ℥ ij.

Aromata etiam crassiusculè incidantur,
ac cum prædictis omnibus misceantur:
seruenturque sic in vsum debitum.

Conserua pro Mostarda.

℞. Cydoniorum recentium in radula seu
tyrocnestiderasorum partes tres

Mellis despumati partes duas.

Coquantur f. a. & seruentur vsui.

Mostarda ventriculum laxum ac frigi-
dum corrigit, mollitiem eius aufert, co-
ctionem procurat, appetentiamque deie-
ctam erigit. Adhibetur potissimum ad
embammata seu intinctus mensis magna-
tum.

Passula Laxativa.

℞. Fol. Senæ Alexand. ℥ iiij.

Cinnamomi electi

Zingiberis ana ʒ iiij.

Aq. Endiuicæ & Vini albi ana ℥ xiiij.

Infundantur per horas sex aut octo: de-
inde ebulliant, ac leniter exprimantur.
huic decocto post colaturam adde Saccha-
ri albi ℥ iiij.

Coquantur simul ferè vsque ad consi-
sten-

stentiam Syrupi; iniiciendo tum, vt adhuc simul leniter bulliant, Passularum minorum repurgatarum \mathfrak{z} xij. Atque sic lege artis post iustam coctionem reponatur.

Eodem modo parantur & Zibebæ, & Pruna laxatiua.

Quamuis à longinquis partibus ob facilitatem vix quicquam educere possint; dantur nihilo minùs pueris, delicatulis, & hominibus alias medicinas purgantes respuentibus. Adstrictam enim aluum leniunt, fœcesque diutiùs detentas expellunt.

*Electuarium purgans,
de Pomo Citrio.*

\mathcal{R} . Corticum Citrii Pomi conditorum
Conseruæ Boraginis
Buglossæ

Violarum ana \mathfrak{z} β . [al. \mathfrak{z} v.]

Specier. Diatragacanthi frig.

Diacrydii ana \mathfrak{z} β .

Turpeti opt. \mathfrak{z} vj.

Sacchari albi lib. j. in aquis cordialibus destillatis dissoluti.

Fiat Electuarium.

Plurimum in Gallia in vsu est: sed in-
confectione solida. Nonnulli additis fo-
liis Senæ, & pauculo Zinzibere ac Croco
tabellas conficiunt s. a. loco Electuarii.

Euacuat omnes humores.

Bb 3

Holip-

Holippæ purgantes.

℞ Turbith electi ℥ . v.

Diagridii ℥ ij.

Zingiberis Cinnamomi ana ℥ j. ℞.

Hermodactylorum ℥ j.

Puluerisata infundantur per noctem in aqua Rosarum fragrantissima : manè co-
lentur & exprimantur. Cum hoc expresso
accolato , & sufficienti Farina Triticea
candidissima , ac Sacchari albißimi ℥ iiij.
fiant Holippæ s. a.

Pituitosos biliososque humores edu-
cunt, nec non serosa excrementa euacuant,
V sui sunt iis potissimum quibus appeti-
tus peruersitas alterius medicamenti sum-
tionem dissuadet.

Diasarum Fernelii.

℞. Syr. de Mentha

Violarum ana ℥ iiij.

Coquantur ad Mellis crassitiem : sub fi-
nem , amoto igne , inspergantur

Radic. Peponis aridarum

Sem. Raphani , Vrticæ ,

maceratorum in aqua Rosarum, & rursus
arefactorum ac tritorum ana ℥ ℞.

Rad. Asari contrit. & per cribrum excre-
tarum ℥ j.

Cinna-

Cinnamomi

Sem. Fœniculi ana ʒ i. β.

Fiat Electuarium liquidum.

Dantur ʒ iij. ex aqua Hordei, vel
Mella, aut Sero lactis.

Omnis generis humores circa ventri-
culum & præcordia exuperantes vomitio-
ne ducit, non continuato, sed ex inter-
uallis facto impetu; ut senibus quoque
& aliis imbecilibus corporibus non ob-
sit. Eadem emendatiùs habebis infra.

*Pulvis contra Hydropem,
Eraſti.*

R. Pul. Foliorum Soldanellæ ʒ j. β.

Fol. Senæ ʒ ij.

Turpeti vel Rhabarbari ʒ j.

Sacchari ʒ j.

Misce, fiat Pulvis.

Quidam addunt pulueris Lumbrico-
rum terrestrium præparatorum & exsicca-
torum ad pondus omnium.

Pulvis contra Vermes.

R. Sem. Santonici ʒ ij.

Coriandri præparati ʒ j.

Cornu Ceruini vsti ʒ j.

Corallinæ ʒ β.

Sem. Caulium ʒ j. β.

Bb 4

Rha-

Rhabarbari opt. ʒ j.

Sacchari ʒ j. β.

Misce. fiat Pulvis.

Cum Rhabarbarum pueris non semper sit acceptum, quidam loco Rhabarbari sumunt tantundem vel paulo plus foliorum Senæ.

*Pilule de Nitro, Alexandri
Tralliani.*

℞. Aloës Colocynthidos

Scammonii Bdellii

Hellebori nigri præparati

Gummi Arabici ana ʒ ij.

Euphorbii præparati Nitri ana ʒ j.

Cum Succo Brassicæ & Melle cocto fiat massa.

Valent ad omnem humorem euacuandum à partibus remotioribus. In doloribus luis Venereæ, Epilepsia, & aliis pertinacibus morbis plurimi in Italia & alibi vsus.

Pilule Iliacæ Rhasis.

℞. Colocynthidos

Sagapeni ana ʒ vj.

Diagridii ʒ ij.

Cum Succo Porri fiant pilulæ.

Cum iudicio vsurpandæ sunt hæ pilulæ. Dantur à ʒ ij. ad ʒ j.

Velo-

Velociter passionem solvunt iliacam.
Cephalalgicis, hemicranicis saluberrimæ:
nec in hydropo & cachexia contemnenda.
Deiisdem infra agetur.

Trochisci de Rosis simplices, Mesuæ.

℞. Folior. Rosarum ʒ i.

Glycyrrhizę ʒ v.

Spicæ Aromaticæ, siue Indicę ʒ ij. β.

Tritis omnibus fiant Trochisci ex vino albo.

Ventriculum & hepar roborant, humoresque detergunt; atque adeò phlegmaticæ feberi conueniunt.

His si Scammonii opt. ʒ iiij. adiciantur, conficiuntur Trochisci purgantes.

Trochisci de Violis purgantes, Mesuæ.

℞. Violarum purpurearum mundatarum, & mediocriter exsiccatarum ʒ vj.

Turpeti albi & gummosi ʒ iiij.

Succi Glycyrrhizæ Mannæ ana ʒ ij.

Succus Glycyrrhizæ, Manna & Viola, simul benè conterantur: quibus addatur pulvis tenuissimus Turpeti: diu simul terantur, & cum Syryo Violato, si opus fuerit, formantur Trochisci. Validiores autem efficiuntur si Diagridii ʒ viij. addantur.

His utimur ad expurgandam pituitam lentam in thorace, cui bilis vitellina est permixta: faciuntque ad difficultatem spirandi.

Sief album cum Opio & sine Opio.

℞. Gummi Arabici Tragacanthæ
Amyli ana ʒ iiij.
Cerussæ lotæ ʒ vj.
Sarcocollæ nutritæ ʒ iiij.
Opii ʒ j. Cum albumine oui fiat Sief.
Paratur etiam sine Opio, ut utrumque sit in promptu. Rhases alibi sumit Cerussæ ʒ: Mesue addit Tus.

Ad oculorum fluxiones, lippitudines acres, & dolores inde natos leniendos adhibetur, cum aliquo conveniente liquore.

Collyrium album, Galeni.

℞. Cadmiæ lotæ, id est, Tutia præparatæ ʒ xvj.
Cerussæ ʒ j.
Amyli Gummi Arabici
Tragacanthæ ana ʒ iiij. Opii ʒ ij.

Excipiantur cum aqua pluuiæ vel Rosacea, & fiat Collyrium siccum. Paratur etiam sine Opio.

Ad Oculorum vstiones, pustulas, chymoses, fluxiones, lippitudines acres, ac dolores inde natos leniendos faciunt hæc
Colly-

Collyria: maximè in his qui nullam mordacitatem ferre possunt, vtilia. Sed posterius in Italia est frequentius vñitatum. Vñus est cum ovo.

Pomum Ambrae.

℞. Santali Citrini ʒ vj. ʒ ij.
 Ligni Aloës ʒ β.
 Rosarum rubearum Basiliconis
 Lauendulæ Anthos
 Maioranæ ana ʒ iiij. ʒ j.
 Corticum Citri ʒ viij.
 Cinnamomi Nucis Moschatae
 Macis Caryophyllorum
 Coriandrorum præparatorum
 Cardamomi ana ʒ iiij. ʒ j.
 Labdani puri ʒ viij.
 Styracis Calamitæ ʒ vj. ʒ ij.
 Styracis liquidæ ʒ iiij.
 Asæ dulcis ʒ x.
 Cere citrinæ ʒ j. β.
 Terebinthinæ Cypriæ ʒ iiij.
 Aquæ Rosarum ʒ ij. β.
 Moschi Alexandrini
 Ambre cin. ʒ ij. β.
 Fiat massa.

Odore spiritus instaurat, & cordi robur addit.

Vñus est maximè cum aliqua aëris inquinati suspicio viget: cui tunc temporis An-

gelica , Zedoaria, Ruta, & præsertim
Camphora rectè adiicitur.

Candela pro suffitu.

℞. Styracis Calamitæ

Carbonum Salicis ana ℥ ij.

Benzoini ℥ j.

Caryophyllorum ℥ β.

Laudani ℥. vj.

Terebinthinæ Cypriæ, & Mucilaginis Tragacanthæ cum Aqua Rosarum factæ q. s.

Fiant Candela, Tedæ, vel Auiculæ: quibus pro delicatioribus Galliam Moschatem aut Ambram addere licebit.

Oleum Ranarum, Mesuæ.

Ranarum fluuiatilium libra dimidia decoquitur in olei Sesamini sextario, in vitro optimè clauso, usque ad ipsarum dissolutionem.

Arthritidi & Podagræ calidæ prodest.

*Oleum præstantissimum, vermes
pellens, aut necans.*

℞. Myrrhæ electæ ℥ vij.

Mastiches ℥ ix.

Aloës Epaticæ ℥ xvij.

Salis communis lib. j.

Con-

Contusa omnia per retortam igne lento destillantur magna diligentia. Exhibit primò aqua , dein Oleum admitandum: cuius (inquit Melichius) vnica gutta preciosissimis etiam gemmis est preciosior. Siquidem infantes à vermibus infestatos inunctum liberat à morte. Vulnere etiam, nisi in ipsa vsque ossa penetrèt, guttula vna consolidat intra horas **xxiiiij.**

Oleum Balsami.

℞. Terebinthinæ \mathfrak{z} xvij.
 Myrrhæ Cinnamomi
 Caryophyllorum
 Nucis muscatæ Aloës
 Cubebæ Castorei
 Zedoariæ
 Mastiches Galangæ
 Ligni Aloës
 Tormentillæ
 Dictamni albi ana \mathfrak{z} β .
 Gummi Hederæ
 Turis ana \mathfrak{z} ij.
 Olei Laurini
 Galbani Gummi Elemi
 Olei Oliuarum
 Aquæ Vitæ ana \mathfrak{z} vj.
 Rad. Chelidoniæ
 Sarcocollæ
 Matris siluæ Saluiæ ana man. j.
 B b 7 Terenda

Terenda tere, & cum aqua Vitæ permisce, atque cum Terebinthina in cucurbitam benè clausam immissa, in balneo Mariæ calenti quatrimum deponere. Dein super cineribus igne lento distilla, ita ut biduo opus soluas.

Valdè à Melichio hic liquor commendatur in paralyfi, nervis contractis, dolore dentium, pestiferis apostematibus, pauculis guttulis.

Oleum Cerae, ex descriptione Melichii.

Præstantissimarum esse virium, inquit, comperimus ad dolores hypochondriorum & Stomachi. Tussi medetur; vulnera simplicia, quæque in partibus facta sunt nervosis, curat. Quod intra corpus exhiberi solet, sic fit:

Cera liquata in aquam communem proiicitur octies aut decies: dein per retortam, cui cineres non subsunt, destillatur igne moderato. Initio autem non Oleum, sed quiddam Butyro simile prodit: ideoque quinquies vel sexies repetita destillatione opus erit, donec non concreseat amplius Oleum. Quod si coagulari videris, destillationem repete, donec sincerum prodeat Oleum.

Alio modo fit, vulneribus sanandis utile:

Cera

Cera liquata in vinum album quàm haberi poterit optimum, proiicitur octies deciésve, semperque diligenter subigitur. Deinde distillatione modò descripta Oleum elicitur.

Oleum Zanetinum, Melichii.

Patauinis & Venetis est in vsu, & miracula præstat: calidum enim quantum tolerari potest vulnere instillatum, glutinando xxiiij horarum spatio persanat.

R. Apii manip. ij.

Chelidonii M. iiij.

Rorismarini Sicilianæ [*seu Androsamæ quorundam*]

Plantaginis Absinthii ana M. ij.

Saluæ M. iiij. Millefolii M. ij.

Flor. Calendulæ M. vj.

Flor. Verbasci M. iiij.

Laurentinæ M. vj.

Laureolæ M. iiij.

Succi Rutæ ℥ iiij.

Olei communis lib. vj.

Terebinthinæ

Resinæ Pini ana lib. iiij.

Galbani ℥ iiij.

Viridis Æris ℥ iiij.

Ex herbis confusis succus exprimitur, quo Galbanum dissolvitur. Additis po, stea Oleo & Terebinthina, in vase cooper-
to si-

to simul coquantur, donec omnis succus sit absumptus:quo facto per stamen fortissimè exprimuntur. Expresso adhuc calenti mox Viride Æris additur, & tam diu subigitur, donec exactè sit commixtum, & colorem viridem adipiscatur oleum.

*Vnguentum Alabastrinum,
Fauentini.*

℞. Succī Chamæmeli recent. ℥ iiij.
Succī Rosarum recent. ℥ ij
Succī Rutæ recent.

Betonicæ ana ℥ j. β.
Succī radicū Althææ ℥ ij.
Olei Rosati Omphacini lib. j. β.
Alabastrī opt. & puriss. ℥ iiij.

Puluerisentur subtiliter, & per diem naturalem infundantur in oleo omphacino: deinde cum Cerae albæ q. s. ex omnibus fiat vnguentum.

Prodest in omni dolore capitis, siue per essentiam, siue per consensum; adsit febris, vel non: ac in omni tempore paroxysmi possumus vti, excepto principio.

*Vnguentum de Tabaco siue Peto,
Iouberti; quod Vnguentum
Nicotianum vocat.*

℞. Foliorum Peti lib. ij.

Pin-

Pingued. Porci recent. vel diligenter lota lib. j.

Herba maceretur per noctem in vino rubro. Manè bulliat igne lento cum pinguedine, ad Vini consumptionem; & coletur exprimendo: colato addantur

Succi Peti lib. β.

Resinæ Abiegnæ ℥ iiij.

Coquantur ad succi consumptionem; circa finem addendo

Rad. Aristolochiæ rotundæ puluerisatæ ℥ ij.

Ceræ novæ q. s.

Fiat vnguentum. Si malis Ceratum, augetur pondus Ceræ. Si magis siccare velis, & consolidare, addantur Mumix & Succini ana ℥ iiij.

Vsurpatur efficaciter ad scabiem, & præsertim tineam capitis; item ad vlcera & vulnera, tam recentia quàm antiqua; ad inflammationes & furunculos; adusta quoque & morphæam; ad tela item ac globulos extrahendos. Ad scrophulas admirandum esse, asserit huius Vnguenti inuentor Ioubertus.

*Vnguentum ex succis,
Iul. Caesaris Arantii.*

℞. Olei Rosati opt. lib. j.

Ceræ albæ novæ ℥ viij.

Folio-

Foliorum Plantaginis Lapathii

Solani Centauri minoris ana man. ij.
 Herbæ pridie cælo sereno, orto iam sole, æstate aut autumno ineunte collectæ, bulliant donec probè coctæ fuerint, postea colentur, torculari exprimantur. Expres-
 sum verò, abiectis herbis, denuò moderatè ferueat vnà cum oleo, in quo cera lento igne lique scat, donec omnis aquea absumatur humiditas, & solidam Vnguenti formam acquisierit; quo ferè iam refrigerato, adde Camphoræ puluerisatæ $\frac{3}{4}$ β.

Vlceribus fœdis ac malignis opitulatur: mundificat, siccatur, abstergit, coquit, & consolidat, fluxiones acres in iisdem temperat, inflammationes reprimat, ac sinus cicatrice tegit.

Vnguentum Pediculorum.

℞. Sem. Staphisagriæ $\frac{3}{4}$ ij.

Hellebori albi $\frac{3}{4}$ j.

Salis $\frac{3}{4}$ ij.

Argenti viui $\frac{3}{4}$ ij.

Aceti vini $\frac{3}{4}$ ij.

Axungia porcina lib. j.

Olei Laurini $\frac{3}{4}$ ix.

Saponis Veneti lib. β.

Fiat vnguentum secundùm artem. Quidam omittunt Saponem Venetum: quidam addunt oleum Spicæ.

Vnguen-

*Unguentum ad verrucas seu carunculas
in meatu urinario natas,
Alphonſi Ferrii.*

℞. Mercurii præcipitati ℥ ij.

Unguenti de Ceruſſa ℥ β.

Addatur his pro magnitudine affectus
aliquid Olei Vitrioli aut Aquæ fortis, im-
mittendo de his parum ſupra candelam
ceream in canalem. Poſteſt autem loco
Unguenti de Ceruſſa à principio ſumi
Unguentum Anodynum, in æqua cum
Præcipitato portione.

Candela ſic fiunt in hunc uſum.

℞. Cerae albæ lib. j.

Terebinthinæ Venetæ ℥ j.

Liqueſcat Cera; poſtea addatur Tere-
binthina, & in his liquatis intingantur
ellyphnia, ſiantque candelæ iuſtam craſſi-
tiem habentes.

Unguentum Anodynum.

℞. Olei Liliorum alborum ℥ vj.

Anethini Chamæmelini an. ℥ ij.

Olei Amygdalarum dulcium ℥ j.

Pinguædinis Anatis Gallinæ an. ℥ ij.

Cerae

Ceræ albæ parum. Misce.

Mitigat corporis quacunq̃ parte dolores.

Ceratum ex Betonica, Angustanorum.

℞. Terebinthinæ Resinæ Pini

Ceræ flauæ an. \mathfrak{z} ij.

Betonicæ puluerisatæ \mathfrak{z} v.

Mastiches Turis an. \mathfrak{z} ij.

Mumiæ \mathfrak{z} j. β . Misce, fiat malagma.

Vsus huius cerati est in vulneribus capitis. Vulgo ita fit:

℞. Resinæ puræ

Ceræ nouæ ana \mathfrak{z} vj.

Terebinthinæ lib. ij.

Succi Apii Betonicæ

Plantaginis an. \mathfrak{z} vj.

*Ceratum Diachalciteos, Galeni,
sen Diapalma.*

℞. Axungię Porci veteris, à membranis per liquationem & colationem purgatæ, lib. ij.

Olei veteris

Lithargyri triti & creti an. lib. iij.

Chalcitidis [vstæ,] siue eius loco Vitrioli stalactici \mathfrak{z} iij.

Liquefactis igni Axungię & Oleo misceatur Lithargyrum & Chalcitis siue Vitriolum, mouendo continuò rudicula ex

ramo

ramo Palmæ recentissimo , dempto prius cortice , confecta : verum vbi pars rami medicamento immissa , calore exarescit, abscindatur, & reliqua adhuc recēs immitatur , & coquatur ad convenientem crassitiem , iniecto inter coquendum ramo Palmæ viridis minutim inciso. Aliqui sumunt pro ramo inciso succum ex eodem expressum. Alii , vbi propè excoctum est, addunt tenerorum Palmę ramorum minutim incisorum , & in nodulo ligatorum manip. iiij. In defectu ramorum Palmæ sumatur rudicula ex recenti succulentoque ramo Quercus. Alii sumunt ramum Pyri, aut Pruni siluestris, aut Salicis : Alii Canis vtuntur.

Ambustis , ruptis & contusis, vulneribus cruentis, tumoribusque pestilentibus vtile.

Ceratum pro Herniosis , Noribergensibus vsitatum, ex descriptione Volkeri Coiter Frisii.

℞. Pul. Mastiches Mumia
Turis Electri siue Succini
Gummi Arabici
Tragacanthæ
Aloës opt. Balaustiorum
Rosarum an. ℥ β.
Sanguinis Draconis

Boli

Boli Armeni

Lapidis Hæmatitis an. ʒ vj.

Olei Rosarum ʒ iij.

Myrtini Mastichini an. ʒ j.

Cum Cera & Resina q. s. Fiat Ceratum.

*Emplastrum ad Tophos, Angu-
stanorum.*

℞. Picis naualis

Colophonix an. ʒ iij.

Mucilaginis Radicum Althææ ʒ ij. β.

Galbani Mastiches Myrrhæ

Turis Ammoniacy an. ʒ j. β.

Propoleos Visci Quercini

Aristolochiæ rotundæ Æris vsti

Ceræ citrinæ

Terebinthinæ, an. ʒ iij.

Fiat secundum artem Emplastrum.

In tumoribus & nodis luis Venereæ fe-
lici successu vsurpatur.*Emplastrum de Ranis, Vigonis,
ex correctione Rondeletii.*

℞. Olei Chamæmelini Anethini

De Spica Liliorum an. ʒ ij.

Pinguedinis Porci

Pinguedinis Vituli an. lib. j.

Euphorbii Turis ʒ v.

Olei Laurini ʒ j. β.

Pin-

Pinguedinis Viperæ \mathfrak{z} ij. β .
 Ranarum viuientium num. vj.
 Lumbricorum lotorum in vino \mathfrak{z} iiij. β .
 Succi rad. Ebuli
 Enulæ Campanæ an. \mathfrak{z} ij.
 Schœnanthi Stœchados
 Matricariæ an. manip. j.
 Vinigenerosi lib. j.

Bulliant omnia ad consumptionem
 Vini.

Colaturæ adde Litharg. auri lib. j. &
 diu agitentur. Deinde adde Cera citri-
 næ q. s. Terebinthinæ Abietis \mathfrak{z} ij. Au-
 ferantur ab igne, & adde Styracis li-
 quidæ \mathfrak{z} j. β . Agitentur fortiter. Post-
 quam refrigerit aliqua ex parte, adde Ar-
 genti viui extincti in saliuâ hominis iei-
 uni \mathfrak{z} iiij. Fiat Emplastrum.

Hoc Emplastrum, inquit Rondeletius,
 recipit quantitatem parua[m] Argenti viui:
 quare efficacius reddetur ad omnia, si Ar-
 genti viui \mathfrak{z} vj. receperit, & Euphorbii
 \mathfrak{z} β . Quod Argentum viuum extinguitur
 saliuâ, superstitiosum est & inutile.

*Lapis septicus, seu Cantherium poten-
 tiale, Angustanorum.*

℞. Cineris Clauellati
 Calcis viuæ an. partes equales.

Macerentur per dies aliquot in aqua
 com-

communi: postea colentur, & durum coquatur ut artis est.

Eo chirurgi in parandis emissariis seu fonticulis ac abscessibus extrorsum vergentibus communiter utuntur.

Lapis Philosophorum, Augustanorum.

℞. Aluminis Rochæ, seu communis Vitrioli Hungarici an. lib. j.

Misceantur in olla non vitreata, affundendo Aquæ fontanæ lib. iiij. Hæc perpetuò agitando ad ignem lentum, spumam semper auferendo, liquecant.

Postea ad de

Boli Armeni ℥ j. β.

Cerussæ albæ & mundissimæ ℥ j.

Camphoræ ℥ ij.

Minutissimè puluerisata misceantur; rudicula semper agitando, ac sub finem addendo

Aceti vini albi lib. β.

Coque ad iustam lapidis consistentiam.

Mirabilis eius usus in ulceribus fluidis, ac putrida humiditate fœdis: sinus & fistulas extergit, ac consolidat: ulceribus insuper malignis, quæ cacoëthe vocant, cicatricem inducit.

LOBELIANÆ & RONDELETIANÆ
FORMVLÆ ALIQVOT,

omissæ, aut ab ipsis emendatæ;
cum aliis quibusdam.

Decoctio Communis, Clysteris.

℞. Betæ Maluæ Parietarię
Brancę Ursinæ Mercurialis ana m. j.
Furfurum p. j.
Fiat decoctio in sufficienti quātitate aquę.
*Quodsi addantur Anisi & Fœniculi ana ʒ ij.
melior erit decoctio.*

*Decoctio Communis Medicinæ,
ad dissoluenda solutina.*

℞. Hordei integri p. j.
Prunorum & Passularum ana p. x.
Glycyrrhizæ rasæ ʒ ij.
Violarum p. j.
Anisi ʒ j. Fiat decoctio.

*Dicitur autem Communis, quòd nulli parti
aut humori sit destinata, ut est Pectoralis,
qua utimur in affectibus pectoris; neque pitui-
tam, bilem vel melancholiam euacuet; sed
tantum leniens sit, ad omnia excrementa. Id-
circo Tamarindos expuimus, quia ladunt*

ventriculum, & ad bilem praescribuntur. Anisum addidimus, ut flatus à Prunis & Hordeo genitos discutiat; & quia odorata semina cum medicamentis laxantibus admiscenda imperat Hippocrates.

Decoctio Pectoralis.

℞. Hordei integri p. j.
 Glycyrrhizæ ℥ β.
 Capillorum Veneris Hyssopi ana m. j.
 Ficum Dactylorum mundatorum
 Passularum enucleatarum an. p. vj.
 Florum Violarum Buglossi ana p. j.
 Anisi ℥ ij. Fiat decoctio.

Vsui erit ad medicamenta laxantia dissoluenda; utilis ad deterfionem & expectorationem in pleuritide.

Electuarium Caryocostinum.

℞. Hermodactylorū Diagridii ana ℥ vj.
 Caryophyllorum Costi Cumini
 Zingiberis ana ℥ iiij.

Mellis despumati ex Vino albo aromatico ℥ ix. Misceantur, & fiat Conditum. Vini autem vis, ut Mellis, longa decoctione valdè minuitur. Praestaret uti duabus Mellis despumati partibus, molliissimo igne; affuso paucō liquore, & Vini Passi aut Sapē parte vna.

Apud

Apud Londinenses quosdam in frequentissimo usu est, ad articulares affectus, podagricosque dolores : materiâ tamen defluente, ait Lobelius, prestaret uti Rhabarbaro & Myrobalanis; aut saltem Hermodactylis, permixtis Scammonio aut Diagridio, & reliquis.

*Pilula Sanctæ, Italarum,
ad Luem Veneream.*

℞. Trochisc. Alhandal Scammonii
Salis Gemmæ
Sagapeni ana æquales partes.

Cum Rhodomelite fiat massa. Dosis ʒ β.
Ob Sal Gemmæ humida massa est. Quidam ex Succo Porri parandam iubent.

Chylisma Pilularum, Saccharo conditarum, Thomæ Plateri.

℞. Specierum Diambarû, vel Diamargarit. frig. ʒ β.

Cinnamomi selectissimi ʒ j.

Spiritus Vini lib. iiij. Macerentur per dies aliquot in vase vitreo, probè obli-
to, ne quid expiret. Vas quotidie agitari
debet: deinde relictis in fundo vasis fæ-
cibus, adde

Trochisc. Alhandal, Rhabarb. electi
ana ʒ vij.

C c 2 Senæ

Senæ mundatę, & Gratiolę præparatę
contusarum ana ʒ vj. ʒ.

Turbith & Dacrydii, (Italico more parati,) ana ʒ vj.

Agarici candidissimi ʒ iv.

Veratri nigri legitimi ʒ iiij.

Omnia incisa macerentur in eodem liquore per dies xiv. Colentur, & deinde distillantur in balneo Marię, ad consistentiam, secundum artis præcepta. Tunc adde Aloës Succotrinę selectissimę, in pulverem redactę & præparatę, ʒ x. Formentur Pilulę. Obvolvuntur pulvere Cinnamon aut Glycyrrhizę, & exactè siccantur per se in umbra. Deinde accipe Albumen unius Ovi, vel q. s. & in eo dissolve Gummi Tragacanthi ʒ j. pulv. Sacchari albißimi q. s. ex lib. ʒ. operiantur primo tegumentı involucro. Deinde conditura absolvaatur, vt cæterorum tragematum.

Dosis à ʒ j. ad ʒ ʒ. vel ʒ j.

Si Extractum volueris conservare in formâ Opiatę, tunc adime Trochiscos Alhandal; quos vltimè miscere poteris. Aufer item Aloën, & adde eorum loco Catholicum commune, eodem pondere. Datur in ea forma ad ʒ j. vel ʒ j. ʒ.

Hac artis lege pleraque alia Catapotia & Medicamenta in gratiam molliculorum & morosorum nitidè cōflabat Ludouicus Myreus, Matthiæ Lobelii gener; Anisum
item

item laxatiuum, Cari semen, & similia;
vti Semen contra vermes, descriptum in-
ter pulueres à prædicto Myreo.

Cremor Tartari.

℞. Tartari subtilissimè triti lib. j.

Superaffusa aqua decoquatur terreo va-
se. Inter coquendum Spumam colligito,
& siccato; quam Tartari Cremorem
appellant. Per se exhibitus blandè purgat.
Alii calculosis cum Dacrydio exhibent,
pro arcano magno.

Trochisci è Minio, corrodentes, Ioannis de Vigo.

℞. Medullæ panis crudi, bene fermentati
3 iv.

Sublimati electi 3 j.

Minii 3 β.

Aquæ Ros. q. s. Fiant Trochisci. Sic-
centur calore clibani tepidi.

His sæpissimè vtuntur Chirurgi.

Oleum Rosatum completum.

Fit ex Oleo dulci & maturo, & Rosis
expansis, contusis, & soli expositis, & le-
uiter decoctis in duplici vase, vt Oleum
Rosomphacinum componitur.

C c 3

Hec

Hoc ad dolores conuenit. Post annum valet adhuc ad confortationem & doloris mitigationem. *Omphacinum* uero post annum inutile est ad refrigerandum & repellendum. Quare pro completo usurpari potest secundo & tertio anno. Regiones autem quae carent Oleo *Omphacino*, addere possunt *Omphacium* & *Plantaginem*, vel *Succum Rosarum*, in infusione *Rosarum*, vel iteratis infusionibus adstrictoriam vim oleo conciliare: aut tempore *Vus* a terba coquere in Oleo dulci quantitatem sufficientem praedictae *Vus*, cum acinis, ad adstrictionem.

*Syrupus de Hedera terrestri,
sive Pulmonarius.*

℞. *Hederæ* terrestris *Hyssopi*
Veronicae Pulmonariae *Melissæ* ana ℥ β.
Vini optimi lib. ij. β.

In fusione facta per aliquot horas, coquantur s. a. addendo *Sacchari* albissimi lb. j.

Vsitatus est in vitiis pulmonis, & phthisi, ac aliis fluxionibus ad pectus decumbentibus.

Aqua Cinnamomi, contra Epilepsiam.

℞. *Cinnamomi* optimi lib. j.
Sem. Pæoniae recentis ℥ j.

Gallitrichi Caryophyllorum an. \mathfrak{z} v.
 Visci quercini Rad. Præniæ ana \mathfrak{z} β .
 Incisa & contusa omnia macerentur in
 aq. Cinnamomi q. s. per dies octo. Dein-
 de fiat destillatio per balneum.

Morselli Laxativi.

R. Conseruæ Violarum Boraginis
 Buglossi ana \mathfrak{z} ij.
 Corticum Citri \mathfrak{z} j.
 Zingiberis \mathfrak{z} j. β .
 Specierum Diatragacanthi frigidi \mathfrak{z} ij.
 Dacrydii \mathfrak{z} vj.
 Fol. Senæ, Turpethi ana \mathfrak{z} β .
 Croci \mathfrak{z} j.
 Sacchari albißimi lib. j. Alii sumūt \mathfrak{z} viij.
 Fiant Morselli.

Passule purgantes, cum Rhabarbaro.

R. Rhabarbari optimi \mathfrak{z} j.
 Spicæ Indicæ \mathfrak{z} ij.
 Cinnamomi \mathfrak{z} iiij.
 Incisa infundatur in vino dulci recentí
 quantū satis fuerit. Facta vna atque altera
 ebullitione, & Saccharo pauco, vt dulce-
 scat, addito, cum hac irrorentur Passularum
 uncia octo, donec ad consistentiam perue-
 niant, in loco calido, secundum artem.

Emplastrum ad Hydropem.

℞. Stercoris colúbini aceto macerati lb. j.
 Sulphuris vivi ℥ j.
 Nitri, vel Salis Gemmei ℥ β.
 Pol. Rad. Enulæ Baccarum Lauri
 Anethi Florum Chamemeli an. ʒ vj.
 Sem. Nasturtii ʒ ij.

Decoquantur omnia in Vino ad consistentiam, & addantur

Mellis ℥ ij. Terebinthinæ ℥ j. β.
 Succi Ebuli ʒ ij. Iridis ℥ j.
 Farinæ Fabarum ʒ i. β. Fiat Emplastrum.
 Patauī vñtatiſſimum eſt.

Emplastrum ad callos pedum efficax, D. Iac. Cargilli Scoti.

℞. Gummi Ammoniacy Aceto soluti ℥ j.
 Vitrioli Romani, Calcis viuæ ana ʒ vj.
 Viridis Æris ʒ β.
 Auripigmenti, Cantharidum ana ʒ j.
 Cera nouæ ℥ iiij.
 Olei Chamæmelini & Euphorbii ana q. s.
 Fiat Emplastrum.

Emplastrum è pelle Arietinâ, ad hernias, Arnaldi de Villâ Nouâ.

℞. Lithargyti Auri Lapidis Hæmatitis
 San-

Sanguinis Draconis Boli Armeni

Mumiæ Galbani Turis

Lumbricorum terrestrium ana ʒ β.

Picis naualis Colophonix

Ceræ albæ & rubræ ana ʒ j.

Rad. Consolidæ maioris, minoris & medix ana ʒ iij.

Rosarum rub. Myrrhæ Aloës ana ʒ. iiij.

Stellæ marinæ combustæ

Gallarum combustarum

Aristolochiæ rotundæ ana ʒ vj.

Visci Quercini Terebinthinæ ana ʒ iij.

Sang. hominis rufi lib. j. minus quarta.

Conficiatur hoc modo : Pellem Arietina, recenter detractam seu excorticatam, cum pilis, coque ad dissolutionem.

Colaturæ lib j. misce Viscum Quercinum dissolutum. Cum spatulâ stannæa agitur.

Deinde Ceram, Picem, Colophoniam adde. Ammoniacum & Galbanum dissolvantur in Aceto, & colentur.

Addatur deinde pulvis aliorum : Ultimo loco odorata, & quæ minorem calfactionem

ferre possunt. Postremò Terebinthinæ Sanguis permisceatur.

Vermes in Vinococti, & diligenter triti, commisceantur.

Coquantur, donec non inquinent manus, manibus inunctis Ol. Rosato vel Cydoniorum; non Violaceo, vt vulgus facit.

Malaxentur : fiant magdaleones. Ego, inquit Lobelius, tantum mutavi, quòd pro Pal-

leam Marinam, Stellam legerim, quæ est
 ad id efficacissima. Quod Sanguinis hominis
 rufi legitur, censerem potius hominis pitui-
 tosi legendum, qui sanguinem viscosiorem &
 tenaciorem habet. Satis siccant alia medicamen-
 ta: sed parum refert. Nam oporteret accipere
 sanguinem eorum qui truncantur capite, in
 quibus fluit venalis & arterialis: & sic est satis
 siccus & viscosus.

FRAN-

FRANCISCI DISSALDEI

D. Medici Parisiensis Regii

PHARMACONETES,

siue

PHARMACITIS BIBLOS:

Liber continens PHARMACA tam
Simplicia quàm composita, quæ
in Officinis parata habere debent
Pharmacopœi.

Apud Galenum lib. 6. Comp. Med. Gen.
 cap. 7. reperias Andromachum scripsisse
 librum *Φαρμακωνία*, de Remediis quæ ex-
 trinsecus corpori admouentur. Sed legen-
 dum, vocabulo non admodum vsitato,
Φαρμακωνία, vt sit Liber comparãdorum
 Remediorum: ad eum modum quo apud
 Pollucem citatur ex Dinarcho *ἐν τῷ ἡττάς*:
 aut vocabulo vsitatissimo *Φαρμακίη*.

POPVLO SALMVRIENSI

Fr. Diffaldeus Medicus

S. P. D.

CONQUESTI sunt apud me sapiùs v-
estri pharmacopœi (Cines optimi,) quòd
in tanto Medicamentorum, tam Simpli-
cium quàm Compositorum pelago harantes, quæ
in medicum usum parare, quæ omittere debeāt,
ignorent. Vnde fit, ut Officinis, copiâ alioquin
Remediorum laborantibus, ea sæpe desint quæ
ad morborum curationem sint necessaria. Hinc
quanta agris perniciēs oriatur, Et πῆγος ἰνὲ
τέχνης ἐμπροσὶς non difficile dictu est; non paruo
etiam ipsorum Pharmacopœorum damno, quæ
necessariis dum sæpe carent, multa inutilia sicut
sibi corrumpi experiuntur. Ego itaque ex longo
usu, multumq; trita, quam vestri habeo, expe-
rientiâ, agrorum bono publico hac exaravi, ut
in posterum nec medicis desit quod præscribant,
nec pharmacopœis, quo medicorum præscripta
exsequantur: Et venia locus non sit, si eorum
Officine aut necessariis carent, aut pravis sca-
tent. Volo præterea, ut hoc perpetuò memine-
rint Pharmacopœi, hæc sibi Pharmaca tantùm
esse, hoc est, si ex suo arbitrio abutantur, ven-
ena præsentissima; sin ex arte ac methodo à
peritis medicis in usum traducantur, remedia
efficacissima: atque ut piè simul ac eleganter

ab Herophilo olim dictum, ad restituendam salutem *ἡγεας θεῶν*. Ne ergo eorum usum sibi permittant temerarii; aut, si permiserint, senerè in eos à iudicibus, quibus publica salutis cura tradita est, animadvertatur. Servavi autem in his scribendis eam temperiem, ut ex Simplicibus ea tantum enumerarem, quæ in Officinis asservari solent, iis quæ ex tempore colligi possunt omisissis, & iis etiam quæ ad illustrium tantum & magni nominis Compositionum dispensationem comparanda veniunt; quòd ea satius sit recentia habere, quàm caris exesa & vetustate exsoluta, ex Officinis in usum producere. Ex Compositis autem, ea etiam sola in unoquoque genere recensui, quæ & selectiora sunt, & usu frequentiora, & magis ad salutem egrorum comparanda necessaria; iis quæ in vulgatis Dispensatoriis descripta habentur, solo digito, ut aiunt, indicatis: iis autem quæ vulgò non extant, integris adscriptis. Sic factum spero, ut hic Medicamentarius libellus, & mole minor multò, & suis tamen numeris omnibus ornatior ac cumulatioꝝ prodeat. Notas etiam huc illuc adpersi, lecturis, nisi me animus fallit, non inutiles futuras. Hæc sibi publicè prosunt, satis superq; mihi est; qui in hoc mustaceo laureolam non quero. Vivite, ac Valete.

hoc est,
MEDICAMENTARIUS LIBELLUS,

seu

LIBER CONTINENS PHARMACA,
TAM SIMPLICIA QUAM COMPOSITA,
quæ in Officinis parata habere
debent Pharmacopœi.

MEDICAMENTA SIMPLICIA.

TERRENA & MARINA		
Bolus Armena.		Arsenicum.
Terra sigillata.		Ærugo.
Fragmenta pretiosa.		Cadmia, seu Lapis Calaminaris.
Lapis { Bezaardicus		Pompholyx.
{ Sanguinalis		Cerussa.
{ Iudaicus,		Sulphur { Viuum { Excoctum { Flores Sul phuris
{ Lazuli.		
Bitumen Iudaicum		
Ambarum Griseum		Alumen.
Corallium.		Sal gemmæ
Margaritæ.		Chalcanthum
Succinum.		Vitriolum Romanū.
METALLICA.		Chrysocola nostra,
Lithargy-	{ Auri	siue Borax, res fa-
rum		ctitia.
		Argen-

Argentū vium	{	Simplex	Salvia.
		Sublima- tum	Vitex, seu Agnus.
		Præcipi- tatum	Senna Epithymum Cuscuta.

P L A N T A R U M

R A D I C E S.

Folia, cum surculis.

Summitates Rubi	Angelicæ
Equisetum	Asari
Herniaria	Aristolochiarum trium.
Abſinthiū latifoliū	Althææ
Ceterach	Capparum, cortex.
Artemiſia.	Acori vulgaris.
Calamintha.	Asari
Euphrasia	Galangæ
Caryophyllata, cum radice.	Helenii
Mentha,	Pyrethri
Origanum.	Pæoniæ
Pulegium	Tuſſilaginis
Betonica	Ireos Florentinæ.
Verbena	Acori veri, ſive Ca- lami aromatici vul- garis.
Periclymenum ſeu Caprifolium.	Cyperii.
Chamaedrys	Spicæ Nardi.
Chamaepitys	Sinarum, ſeu Chinæ.
Centaurium minus	Salſæ Parilliæ.
Hypericum	Ellebori { Albi.
Meliſſa	{ Nigri.
	Rha-

Rhabarbari.
 Polypodii.
 Agarici. *Fungus est
 inter radices adnu-
 meratus.*
 Hermodactylorum.
 Turbith.
 Glycyrrhizæ.
 Pentaphylli.
 Bistortæ.
 Tormentillæ.
 Plantaginis.

L I G N A.

Aloës
 Guaiaci
 Nephriticum
 Visci quercini
 Sassafras
 Santali { Albi
 Rubri
 Citrini

C O R T I C E S.

Guaiaci.
 Tamaricis.
 Radicum Capparum.
 Turis.
 Cinnamomi.

Macis.
 Fraxini
 Sambuci.
 Mali Citrii.
 Mali Aurantii.
 Cupulæ Glandium.
 Malicorium.

F L O R E S

Verbasci albi.
 Rosarum Rubrarum
 Violarum.
 Cichorii
 Nymphææ,
 Balaustiorum.
 Cytinorum
 Buglossi.
 Boraginis.
 Croci.
 Etonicæ.
 Caryophyllorum.
 Rorismarini.
 Agni.
 Præoniæ.
 Sambuci.
 Anethi.
 Chamæmeli.
 Meliloti
 Genistæ.

S E M I-

SEMINA.

Cydoniorum.

Pſyllii.

Acetoſę.

Hyoſcyami { albi.
nigri.Quatuor { maio-
feminafrig. } ra.
 { mino-
 } ra.Capita Pa- { albi.
paueris. } nigri.

Hordei excorticati.

Berberis.

Malux.

Althææ.

Raphani.

Atriplicis.

Cnici.

Periclymeni.

Bombacis.

Coriandri.

Vrticæ.

Cumini.

Sinapi.

Ocimi.

Citri.

Nigellæ Romanæ.

Præoniæ.

Agni, ſeu Viticis.

Lini.

Fœnigræci.

Lithoſpermon.

Saxifragæ.

Lupini.

Orobi.

Fabę.

Quatuor ſe- { ma-
minacalida. } iora.
 { mi-
 } nora.

FRUCTVS.

Amygdala { dulcia.
 } amara.

Ficus.

Gallæ

Nuces Cupreſſi.

Nuces Moſchatę

Daſtyli

Sebeſten.

Iuiubæ.

Tamarindi.

Passulę { Damasce-
 } næ.
 { Corinthia-
 } cæ.
 Vulgares.

Caſſia

Cassia cathartica.

Halicacabi.

Quadruplex genus

Myrobalanorum :

ad bilem, Citrina;

ad melancholiam

Inda; ad phlegma

Cepula & Empe-

litica. *Quintum ge-*

nus Belezicorum ad

densanda tanquam

coria usurpant ait

Garcias ab Horto.

Vetat tamen emitti

sincera sedulitas in

Compositionibus in

quibus prescribun-

tur.

Colocynthis.

{ Lauri

{ Myrti

Baccę { Juniperi, in

{ vino rubro

{ generoso

{ preparatę.

Grana Kermes.

{ Rotu-

{ dum.

Piper { Lon-

{ gum.

{

{ al

{ bũ

{ ni

{ grũ

{

SYCCI INSPISSATI.

Abſinthii latifolii

{ Græco-

{ rũ, seu

{ Agri-

{ monię.

Eupatorii { Mesuę,

{ seu A-

{ gerati.

{ Auicę-

{ nę, seu

{ Canna-

{ binę.

Glycyrrhizę.

Chelidonii maioris.

Ex foliis, caule, radi-

ce, exprimatur suc-

cus in ætate in

areo vase cum melle

prunis decoquatur.

Servetur ad ocula;

via remedia.

Cremor Tartari.

Sapa.

Ladanum.

Asa foetida.

Opium.

Aloë.

Manna Arabum, siue

Mel ærium.

Scam-

Scammonium.

Mel.

Saccharum

Cera.

SVCCI LIQUIDI,
superfuso Oleo.

Lupulorum

Rosarum

Cydoniorum

Berberis

Ribes.

Cichorii.

Citri, seu Limonum.

VINA.

Absinthites.

Euphrasiatum.

Passulatum.

GYMMI ET RESINÆ.

Tragacanthum.

Arabicum,

Caphura.

Sandaracha Arabum.

Edellium.

Galbanum.

Myrrha.

Mastiche.

Tus.

Styrax { Solida.
 { Liquida.

Benzoinum.

Ammoniacum.

Terebinthina.

Euphorbium.

Sagapenum.

Opopanax

Pix.

ANIMALIA,

*Eorum partes ac
excrementa.*

Cantharides.

Pulmo Vulpis.

Hepar lupinum.

Adeps { Gallinæ.
 { Anseris.
 { Anatis.

Castorium.

Dens apri.

Unicornu.

Ebur.

Cerui { Genitale.
 { Cornu.
 { Sebum.
 { Medulla.

Ossordis { Bovis.
 { Cerui.

Cra-

Cranium hominis
non sepulti.

Hirci { Sanguis.
Sebum.

Sericum { Crudum.
Intinctū

iucco Ker-
mes. Sericū in quibus conficiendīs
vulgatū Cra-
mesmū ve-
nenatū est,
& Arsenico
infectum.

Leporis { Coagulū.
Pili even-
tre.

Vngula { Alcis.
Asini.

Moschus.

Zibettum.

*Reliqua sedulā diligē-
tiā comparabunt Phar-
macopœi in dispēsatione
singularū Cōpositionū:
mes. Sericū in quibus conficiendīs
advocabunt Medicos.*

*Qua verò recentia, at-
que (ut vocant) viri-
da Arsenico diacolliguntur, ut re-
frigerantia atque hu-
meſtantia ferè omnia,
ea ex tēpore, pro usu ac
necessitate parabuntur.*

COMPOSITA.

Decocta, quæ vulgo à Medicis
nomine tenus indicantur.

Decoctionis Clysteris carminativa.

℞. Seminum Anisi Fœniculi

Cumini ana ℥ β.

Baccarum Lauri contusarum ʒ iiij.

Florum Chamæmeli & Anethi ana m. β.

Coque in aquâ communi ad dimidias.

Deco-

*Decoctio communis Clysterum
remollientium.*

℞ Maluæ Violariæ Parietariæ
Betæ Mercurialis ana manip. j.
Foliorum Liliorum alborum m. β.
Seminiſ Fœniculi ℥ β.
Coque in aqua ſufficiente.

Decoctum pectorale ſimplex.

℞. Hordei mundati ℥ j.
Capilli Veneris Scabioſæ Tuſſilagiſ
ana m. j.
Hyſſopi m. β.
Paſſularum mundatarum ℥ vj.
Sebeſten, Iuiubarum ana num. xv.
Daſtylorum num. vj.
Caricarum pinguium num. iiij.
Glycyrrhiſæ ℥ β.
Fiat decoctio ex arte in ℞. iiij. Aquæ flu-
uiæ, ad conſumptionem libræ vnius.

*Decoctum pectorale compoſitum,
cum Sena.*

℞. Foliorum Senæ mundatæ ℥ ij. β.
Parum bulliant in Decocti ſuperioris
colati libræ una & dimidia. Infundantur
ſex horas : poſtea exprimantur leuiter.

Deco-

*Decoctum commune medicina,
cum & sine Sena.*

℞. Radicum Polypodii quercini ℥ β.
 Passularum mundatarum ℥ ij.
 Sebesten Prunorum ana num. xij.
 Florum Boraginis Violarum Rosarum ru-
 brarum ana ℥ ij.

Fiat decoctio secundum artem.

Vt fiat compositum,

℞. Foliorum Senæ mundatorum ℥ ij β.
 Parum bulliant in decocti superioris
 lib. j. β. addita Caryophyllorum ℥ j. In-
 fundantur sex horas : postea leuiter expri-
 mantur.

Lac Virgineum, ut est apud Weckerum.

℞. Aluminis crudi ℥ iiij.

Aquæ fluuiæ lib. ij.

Decoquantur ad tertias. Postea

℞ Lithargyri lib. β.

Aceti optimi lib. j. β.

Coquantur, donec remaneat libra vna.

Ambæ aquæ colatæ misceantur, & agi-
 tentur, donec lactis colorem adipiscantur.

*Potio vulneraria, sine Decoctum
Sclopetarium, ut vulgo paratur.*

℞. Cancrorum fluuiatilium vstorum, &
 subti-

subtilissimè puluerisatorum 3 ij.
 Radicum Aristolochiæ rotundæ, & Conso-
 dæ maioris

Foliorum Prunellæ

Baccarum Lauri ana 3 j.

Contundantur crasso modo : includan-
 tur linteo raro, & bulliant in Vini albi li-
 bris tribus, donec tertia pars consumpta
 sit : addendo circa medium decoctionis
 Vincæ Peruinæ pugillum vnum.

Fiat colatura.

ALIA COMPOSITA.

Saccharum Rosatum tabulatum.

Saccarum Penidiatum, ex aqua Hordei.

*Baccilli Bechici, vulgo
 Rebecha dicti.*

Rx. Pulueris Diastreos, Diatragacanthi fri-
 gidi ana 3 ij.

Pulueris Glycyrrhizæ 3 β.

Sacchari canditi 3 iiij.

Sacchari Tabarzeth, hoc est albißimi,
 lib. j. β.

Cum Gummi Tragacanthi aqua Rosa-
 rum soluto fiat pasta, ex quâ parentur Bac-
 culi, ad vsum reponendi.

Mel

Mel { Rosatum.
 Violatum.
 Anthosatum.
 Mercuriale, *ex succo non decoctoparatum: quod quidam pessimè faciūt.*

CONSERVÆ.

Rosarum { Liquida
 Solida

Violarum.

Nymphææ

Cichorii.

Boraginis.

Anthos.

Radicum { Inulæ.
 Symphyti.
 Eryngii

Syraculorum tenerorum Absinthii latifolii excorticatorum.

Diacynorrhodon cū paucō Saccharo paratū
 Cydoniatum.

Corticum { Arantiorum.
 Citriorum.

Fructuum { Cerasorum, Berberis, Ribes,
 Omphacii, Cornorum,
 Mororum semimaturorum

SYRVI.

Rosarū pallidarū, nouem { Simplex &
 ad minimum infusionum { Cōpositus cū
 Agarico.

D d

Rosa

Rosarum rubrarum siccarum, ex libra vna
 Rosarum, horis viginti quatuor infu-
 sarum in aquæ tepidæ lib. iiij: & expres-
 sione coctâ cū Sacchari albißimi lib. ij.

Violarum { Violatus,
 Laxatiuus, ex nouem infu-
 sionibus.

Floribus arborum Persicarum.

De Symphyto.

Florum Nymphææ simplex, ex duabus in-
 fusionibus, apud Iouertum.

Cydoniorum { Cum Saccharo.
 Sine Saccharo excoctus.

Malorum granatorum *acido-dulcium*: vel
ex aquis partibus acidorum & dulcium.

Berberis.

Aciditatis Citri.

Syrupus è Corticibus Mali Citrii.

℞. Corticum Malorum Citriorum re-
 centium, in aqua maceratorum & præ-
 paratorum lib. j.

Coquantur in aquæ lib. vj, donec lib. ij.
 supersint: & cum lib. iiij. Sacchari albi
 fiat Syrupus.

Condiatur pars vna Syrupi Moschi gra-
 nis duobus, Ambra griseæ grano vno.

De Pomis Simplex, & Compositus, Sa-
 boris Regis. Isque duplex: scilicet cum
 simplici Senna, & cum triplicata Senna.

Iu-

Iuiubinus.

De Tussilagine

De Glycyrrhiza. *Sed pro aqua Rosarum accipe aquam infusionis Rosarum pallidarum, ex Fratrum Minorum consilio.*

Adiantinus { Communis.
Monspessulensis, prout haberi poterit.

De Althæa.

Syrupus de Stœchade, descriptionis Fernelii.

℞. Florum Stœchados ℥ iiij.
Thymi Calaminthes Origani ana. ℥ j. β.
Saluix Betonicæ Florum Rorismarini ana ℥ β.

Sem. Rutæ Pæoniæ Fœniculi ana ℥ iij.

Coquantur in aquæ libris decem ad dimidias. In colatura adde Sacchari & Mellis ana lib. ij. Fiat Syrupus, aromatizatus Cinnamomi, Zingiberis & Calami aromatici ana ℥ ij. raro linteoligatis, & in Syrupo appensis.

De Absinthio, Mesuæ. *Ex Absinthio nostrate latifolio, prius seorsim in aqua tepida macerato.*

De Artemisia. *In quo cur pro Buglossa necessario substituendum sit Albugilissa, ut voluit Ioubertus, non video: cum Buglossum verum, quæ nostræ Borago est, vel solo flore*

mensēs potenter moueat, & succo etiam secundinas deiciat. Attamen Anchusæ primæ radix (quæ Arabum Albugiliffa est) apud Dioscoridem vuluæ indita etiam fœtus mortuos extrahere dicitur. Ita ut parum referat, utram ponas, Anchusam aut Boraginem. Verum correctior multo est & melior descriptio Syrupi de Artemisia apud Fernelium: eamque sequendam puto.

Syrupus de Artemisia, Fernelii.

R. Artemisiæ manipulos ij.

Rad. Helenii Rubiæ Præniæ

Leuistici Fœniculi ana ʒ β.

Pulegii Origani Calaminthes

Nepitæ Melissophylli Sabinæ

Sampsuchi Hyssopi Praslii

Chamædryos Chamæpityos

Hyperici Parthenii Betonicæ ana manip. j.

Seminis Anisi Petroselini Fœniculi

Ocimi Dauci Rutæ Nigellæ ana ʒ iiij.

Contusa macerentur horis viginti quatuor in Hydromelitis libris octo.

Coquantur ad lib. v. & cum Sacchari lb. v. percoquantur in Syrupum, conditum Cinnamomi vnciâ vnâ, Spicæ drachmis tribus.

De Mentha simplex, cum Saccharo parata.

De Ci.

De Cichorio { Simplex, ex succo Cichorii,
 & Sacchari dimidio.
 Compositus, Nicolai Flo-
 rentini, (non Prepositi, qui
 Rheum octuplum ponit.)

Ex capitibus vtriusque Papaueris.

Papaueris Rhœadidis.

Diamoron Mesuræ.

Oxysaccharum simplex.

Oxymel simplex dilutum.

Oxymel Scilliticum merum, & sine aqua,
 aut saltem

Acetum Scilliticum, ex quo in rem presen-
 tem posset Oxymel parari.

Syrupus Diachelonæ, seu de Te- studinibus.

℞. Carnis Testudinum ℥ iiij.

Hordei mundati ℥ ij.

Carnis Dactylorum ℥ j.

Passularum Damascenarum

Glycyrrhizæ rasæ ana ℥ vj.

Sebesten Iuiubas ana num. xij.

Seminis Bombacis Melonum

Cucumeris Citrulli ana ℥ β.

Sem. Lactucæ Papaueris albi ana ℥ ij.

Vngulæ caballinæ Pulmonariæ an. man. j.

Florum Violarum Nenupharis an. ℥ β.

Fiat decoctio, vt decet.

In colatura clarificata, ad lib. iiij. adde

D d 3 Sac-

Sacchari albiſſimi lib. ij. Sacchari Roſati & Diatragacanthi frigidi ana ʒ v. Fiat Syrupus perfectè coctus.

Testudinum caro (amputatis collo, cauda & pedibus) à ſordibus repurgetur: incidatur in fruſta; ſimul cum reliquis coquatur. Deinde colaturæ adde Saccharum Roſatum, & Diatragacanthum. Loco Diatragacanthi quidam ſubiiciunt Saccharum Penidiatum. Vtrumque non malè.

PV L V E R E S.

Lumbricorum.

Diamargaritum frigidum	} Cum Ambra & Moſcho.
apud Siluium	
	} Sine Ambra & Moſcho.

Triſantali Nicolai.

Diarrhodon Abbatis, apud Nicolaum.

Aromaticum Roſatum Gabrielis, apud Meſuem.

Diambra.

Diatragacanthum frigidum Nicolai.

Diairis ſimplex Meſuæ

Diacarthami Arnaldi de Villa noua apud Siluium.

ELECTVARIA

PURGANTIA MOLLIA.

Diacassia Nicolai Præpositi , *additis aquis
partibus Cassia & Mellis, ac non decoctâ
Cassia.*

Catholicum { Expulueribus
Ex infusione puluerum,
Senna & Rheo duplicatis
sic parandum, vt sequitur.

*Catholicum ex infusione puluerum,
Sena & Rheo.*

R. Rad. Polypodii semisiccati
Foliorum Senæ mundatorum ana ℥ vi.
Violarum ℥ iiij.
Sem. Anisi & Fœniculi dulcis ana ℥ ij.
Glycyrrhizæ rasæ
Quatuor Sem. frigidorum maiorum mun-
datorum ana ℥ j.

Contusa omnia (exceptis Senâ , Semi-
nibus frigidis maioribus, & Floribus Vio-
larum) macerentur horis xxiiij in aquæ
fluuię quantitate sufficiente (vel lb. v.) po-
stea coquantur leuiter in balneo Mariæ.
Paulo antequam ab igne remoucantur, ad-
de Senam, Semina frigida maiora, & Vio-
larum

Iarum Flores. Macerentur calidè aliquot horas in balneo. Vbi refrixerint, linteolo colentur, & exprimantur leuiter. Colaturę pars vna seruetur pro infusione Rhabbarbari: Altera iterum coquatur, donec in consistentiam Mellis crassescat: adiectis Sacchari albi lib. viij. & addendo in fine decoctionis infusionem vnciarum viij. Rhei electi, scorsim factam in parte reseruata decoctionis Polypodii. Iterum coquatur, sed lento igne.

Postea ab igne remotis adde Florum Cassiæ (extractæ ad vaporem decocti præscripti) & Tamarindorum an. \mathfrak{z} viij Sacchari Candi, & Penidiorum ana \mathfrak{z} β .

Fiat Electuarium.

Tryphera Persica Mesuæ, ex correctione Fratrum Minorum, apud Ioubernum.

Diaprunis { Simplex.

Nicolai. { Solutius. Et quia breui acciscit, quo tempore Pruna recentia desunt, paretur ex Pulpa decoctionis Prunorum, potiùs quàm ut acidum in usum recipiatur.

Confectio Hamech maior, apud Mesuem. Huic cur minorem, minùs efficacem, præferat Ioubertus, non video. Ingrata est: sed non detur delicatis. Neque reprobandum pato Serum lactis, quòd longis infusionibus acescat (parcant mihi docti viri.) Nam Serum non ideò reiiicendum, quòd acidum. Tale enim & te-

minus

mius est, & magis refrigerat; ideoque magis domat acrimiam acrimoniā, & felicius eorum quae infunduntur vires elicit. Denique cur in hac Compositione improbabitur Serum acidum, cum in Tryphera Persica & Diaphœnico feratur Acetum? Verumtamen, si displicet quod in hac Compositione multa sine arte & consue traduntur. Nam cur Rhabarbarum coquitur? (coquitur quidem Mesue; sed recens, puta, compactum ac validum: at nostrum inueteratum, laxum, proptereaque euaniidum, constat coctione vim catharticam amittere: Annon Cassia & Manna cum Tamarindis cocta corrumpuntur? Annon Dacrydii vires coctione exsoluuntur? praterquam quod sic aliis non facile Dacrydium commiscetur, ita ut in omnibus Compositionis partibus par facultas non reperiatur?) si cui, inquam, hac displicent, preferatur ea, quae ex Fernelii censura & artificiosior & efficacior est; cuius descriptio sequitur.

*Confectio Hamech, ex censura
Fernelii.*

℞. Corticum Myrobalanorum cittinarum ℥ ij.

Myrobal. Cepularum Myrob. Indarum
Violarum Colocynthidis

Polypodii querni ana ℥ j. β.

Absinthii Thymi ana ℥ β.

Semen Anisi Fœniculi

D d 5

Rosa-

Rosarum rubrarum ana ꝓ iij.

Tusa omnia inacerentur per diem in lib. ij Serilactis : deinde coquantur ad libram vnam. Fricentur manibus, & exprimantur.

Colaturæ adde

Succi Fumariæ Pulpę Prunorum, & Vuarum Passarum ana lib. β.

Sacchari albi Mellis despumati an. ℥ j. Coquantur ad consistentiam Mellis : inspergendo sub finem

Agarici & Senæ pulueratorum ana ꝓ ij. Rhabarbari triti ꝓ j. β. Epithymi ꝓ j. Dacrydii ꝓ vj.

Cinnamomi ꝓ β. Zingiberis ꝓ ij.

Sem. Fumariæ Anisi Spicę Nardian. ꝓ j.

Fiat Electuarium.

Benedicta laxatiua Nicolai Alexandrini.

Hiera picra simplex, mellita, Galeni.

Hiera diacolocynthidos Pactii, ex Scribonio Largo, bono medico, in usum reuocata.

Hiera Lagodii, Nicolai Myrepsi.

Caryocostinum Garyopōti, apud Iouberinum capite de Benedicta.

Hydragogum Fernclii { Maius.
Minus.

Nullum vulgò extat Hydragogum in Officiis. Ideò duo hæc hîc addēda existimaui. Minus minus est, ita ut gravidis etiam dari possit: Maius validius, & non nisi paulo robustioribus idoneū.

Hydra-

Hydragogum minus, Fernelii.

℞. Succi Rosarum pallidarum lb β.
 Sacchari albi Mellis optimi ana ℥ xv.
 Coquantur dum expumauerint & crasse-
 fiant. Tum adde
 Succi radicum Ebuli lib. j.
 Prassii sicci Sem. Fœniculi tritorum
 ana ℥ ij.
 Acinorum Ebuli & Sambuci ana ℥ ij.
 Cinnamomi ℥ vj.
 Macis Galangæ ana ℥ iiij.
 Coquantur igne lento, in Mellis cras-
 sitiem.

Hydragogum maius Fernelii.

℞. Seri lactis lib. vij.
 Sacchari albi Carnis Cydoniorum ex
 aceto coctorum ana ℥ x.
 Mannę Galabrinę ℥ v.
 Coquantur igne lento, ad Mellis consi-
 stentiam. Sub finem adde
 Foliorum Laureolę preparatę ex Oleo
 Amygdalarum dulcium & Aceto ℥ ij.
Preparatio Laureolę sic faciendā : Folia
 Laureolę macerentur horis xxiiij in Ace-
 to & Succo Portulacę, vel Mali Granatī:
 modicè coquantur : exprimentur, siccen-
 tur, terantur. Deinde affunde Aquę Ro-
 sarum

farum lib.ß. Olei Amygdalarū dulciū ꝑ j.ß.
 Bulliant rursus ad consumptionem aquæ.

Pulvis cum superstitute Oleo addatur in
 Compositionem.

ELECTVARIA PURGANTIA, SOLIDA.

Diacarthami Arnaldi de Villa Nova,
 apud Silvium. *Hoc Electuario nullum in vſu
 frequentius ; nullius descriptio in Dispensariis
 minùs constans.*

De Succo Rosarum Nicolai Præpositi,
*cum suo Scammonio toto, contra sententiam
 Silvii; ut verè sit Calcar medicinarum.*

De Citro solutium Guidonis, apud Iouber-
tum. Nam in aliis ferè Sena omittitur.

ELECTVARIA VOMITORIA.

Electuaria vomitori- { Mitius.
 a. { Validius.

*Nulla extant in Officinis & Dispensatoriis
 vulgaribus vomitoria composita. Idèò & hac
 hic addere, optimum putavi. Scio parari posse
 in rem præsentem, sed qua careant beneficio fer-
 mentationis.*

Mitius, Diasaron dictum Fernelio, sic
 paratur.

Dia-

Diasaron, Fernelii, vomituum mitius.

℞. Symplicum Menthæ & Violarum
ana ℥ viij.

Coquantur ad consistentiam Mellis. Su-
finem, subducto igne, insperge

Rad. Peponis arefactæ

Sem. Raphani & Vrticæ, maceratorum in
aqua Rosarum, arefactorum & trito-
rum ana ℥ j.

Radiciis Asari tritæ & cretæ ℥ ij.

Cinnamomi Sem. Fœniculi ana ℥ iij.

Fiat Electuarium.

Validius, imò *validissimum* Dielleborou,
in morbis contumacibus, robustis corporibus,
ac thoracis ampli, faciliè vomentibus, atque cor-
pore ritè preparato usurpandum.

*Dielleborou, Fernelii, vomituum
validum.*

℞. Caryophyllorum ℥ ij.

Fibrarum Ellebori albi siccarum & incisa-
rum lib. j.

Aquæ lib. xiiij.

Fiat infusio per tres dies. Hinc fiat deco-
ctio ad consumptionem mediæ partis:
& facta diligenti expressione, abijcia-
tur Elleborum. Tum adde

Mellis ℔. vij.

D d 7

Syru.

Syrupi de Nymphæa lib. j.

Succi Raphani ℥ iiij.

Répetatur coctio, donec reducatur ad consistentiam Mellis.

Electuarium vitro vase excipiat ; & seruetur ad vsus.

ELECTVARIA ALTERANTIA.

Electuarium contra vermes.

℞. Farinæ Lupinorum ℥ ij.

Corallinæ Dictamni albi ana ℥ j. β.

Cornu Cerui, Sem. Caulium ana ℥ j.

Rhabarbari ℥ β.

Fiat pulvis, diuidendus in duas partes. Vtraque pars coquatur seorsim, cū Sacchari in aqua Graminis dissoluti ℥ iiij. Sed vni parti adde Dacrydii ℥ ij. Trochiscorum Alhandal gr. vj.

Diacodium solidum.

℞. Caput Papaueris albi cum suis seminibus, quantum voles : Coque fortiter exprime. Decocti expressi libra vna coquatur cum altera libra Sacchari, ad consistentiam Confectionis Manus Christi, rudiculâ aliquamdiu agitando.

Serue-

Seruetur ad distillationes ferinas.

Potest parari candidius & suauius ex solo semine, sed minùs efficax.

Philonium Persicum Mesuæ.

Philonium Romanum Nicolai.

De Baccis Lauri Rasis.

Diasatyrium. (*Nam & huius vsus sapiusculè necessarius est.*) Ex tribus autem eius descriptionibus, sequens præfertur Fernelio.

Diasatyrium, Fernelii.

℞. Radicis Satyrii, recentis ac solidæ
Radicis Pastinacæ satiuæ Rad. Eryngii
Nucis Indicæ Strobilorum
Pistaciorum ana \tilde{z} j. β .
Caryophyllorum Zingiberis Anisi
Sem. Erucæ Sem. Fraxini ana z vj.
Cinnamomi Caudatum Scincorum
Seminis Bulbi ana z ij. β .
Moschi gr. vj.
Mellis optimi despumati l. iij.

Radices tusæ coquantur ex melle, & subigantur: Deinde Nux Indica, Strobili & Pistaciæ tusæ similiter adiiciantur. Postremò etiam reliqua exquisitè trita.

Theriaca trium ætatum.

Mithridatium Damocratis.

Aikermes Mesuæ, ex infusione Serici crudi, & Syrupo Kermesino, cum Ambrâ totâ. Ne cum illis erres, qui falsis ducti rationibus, dimidiatarum

mediatam tantum ponunt, & Compositionem reddunt minus efficacem; & , ut ita dicam, minus spirituales. Calor Ambra, inquiunt, in regionibus Septentrionalibus & frigidioribus metuendus est, quia in his interna magis calens. Ridiculè. Certè interna magis calens, sed calido innato, hoc est, temperato & humido; non acris & sicco. Quod si hæc Ambra quantitas in regionibus Meridionalibus, ubi calor & acrior & siccior est, calore non nocuit, multo minus in nostris, ubi mitior calor est, & humido temperatior, ac quantitate tantum excedens, non qualitate. Ni hæc vera sint, æstate quàm hyeme calida convenientiora; & malè Hippocrates libro De dieta idiotarum dixerit, Hyeme parcius & meracius bibendum; æstate largius, sed dilutius. Eadem enim ratio regionum, quæ temporum.

De Hyacintho, descriptione Iouberti, quæ hæc est.

*Electuarium de Hyacintho, Iouberti,
ad obstructions hepatis & lienis.*

Rx. Limaturæ Chalybis vstæ in crucibulo donec rubeat, & diligenter in mortario tritæ, sine extinctione, ℥ iiij.

Diarrhodon Abbatis

Aromatici Rosati ana ℥ j.

Thymi Epithymi Cinnamomi ana ℥ β.

Ex vna parte, additis pulueris Hieræ picræ ℥ vj. cū Syrupo de Artemisia fiat massa
Pilu-

Pilularum : ex altera, cum octuplo Saccharo fiant tabellæ ponderis drachmarum duarum aut trium. Saccharum coquatur cum parcissima aqua. Vbi optimè despumatum fuerit, pulueres indantur, & continuè agitentur, ne Chalybs inimuma resideat. Mediocriter cocta, & paulo minùs quàm Saccharum Rosatum, defundantur supra marmor aut chartam; manibus subigantur, aut spatula agitentur; & formentur tabellæ; ne, si immotæ refrixerint, cauè reperiantur.

Restat Electuarium unum, Resumptiuum dictum, ad restaurationem virium, in iis qui diuturno morbo contabuerunt. Sic autem descriptum à Fernelio.

Electuarium Resumptiuum, Fernelii.

℞. Rosarum rubrarum
 Glycyrrhizæ ana ʒ ij. gr. v.
 Gummi Arabici
 Tragacanthi ana ʒ ij. ʒ ij.
 Santali rubri & albi ana ʒ iiij.
 Succi Glycyrrhizæ Amyli
 Seminis Papaueris albi
 Portulacæ Lactucæ Scariole ana ʒ iiij.
 Quatuor seminum frigidorum maiorum
 Sem. Cydoniorum Maluæ Bombacis
 Violarum Strobilorum
 Pistaciorum recentium

Amygda.

Amygdalarum dulcium

Pulpæ Sebesten ana ʒ ij.

Caryophyllorum Spodii

Cinnamomi ana ʒ j.

Crocī gr. v.

Penidiorum ʒ β.

Terantur: excipiantur triplo Syrupo Vio-

lacco. Fiat Electuarium molle.

TROCHISCI.

De Agarico.

Alhandaal, siue de Colocynthide.

De Karabe.

De Myrrha Nicolai.

Albi Rafis { cum Opio

sine Opio.

Gordonis apud Bauderonem.

Trochisci Andronis.

℞. Cytinorum ʒ i.

Gallarum ʒ j.

Myrrhæ Aristolochiæ rotundæ ana ʒ β.

Chalcantbi Aluminis scissilis

Misyos Cyprii ana ʒ ij.

Excipiantur passo. Antiballomenon, siue Succedaneum Mysios sit Vitriolum vitansum, vsum.

PILVLÆ.

*Iliacæ Rasis, nono ad Almanforem;
capite de Colico dolore.*

Rx. Colocynthis & Sagapeni ana ʒ x.
Scammonia ʒ iij. (alijs ʒ iij. & tertiam, ut
sint ʒ iij. ʒ j). Sed certè delendum est [&
tertiam,] & Arculanus Rasis Commenta-
tor non agnoscit.)

Forma Pilulas.

Sagapenum vino dissoluendum, colan-
dum; & eo reliqua excipienda. Eorum usus
nonnunquam necessarius in colica biliosa, Piſſa-
uiensi dicta, ubi alius leuioribus Catharticis
surda non respondet, & vi paulo validiore
metastasis in brachia per aluum renocanda.

Indæ Haly, apud Mesuem. In quibus Lapis
Lazuli diligenter lauetur, sed non vratur.

Ex Puluere Hieræ Pachii, incorporato cum
Syrupo Rosato solutiuo.

Auræ Nicolai, non diminuto Scammonio.

Cocciæ Rasis, cum suo Scammonio toto: qua
prima descriptio est apud Siluium, contra
sententiam Iouerti: ut habeas quas des ro-
bustioribus, & minore quantitate.

De Agarico, Mesuæ.

Lucis maiores, Mesuæ.

Fœtidæ maiores, Mesuæ.

De Her-

De Hermodaſtylis maiores, Meſuæ.

De Thymelæa, Meſuæ, *vel potiùs De Eſula Fernelii; quarum descriptio ſequitur.*

Pilula de Eſula, Fernelii.

℞. Corticum Radicum Eſulæ minoris, maceratæ horis vigintiquatuor in Aceto & Succo Portulacæ, ʒ ij.

Grana Ricini expurgata & torrefacta num. xl.

Myrobalanorum citrinorum ʒ j. β.

Chamædryos Chamæpityos

Spicæ Nardi Cinnamomi ana ʒ ij.

Omnia tenuiſſimè trita excipiantur vncia vna Tragacanthi Aqua Roſarum ſoluti: & fiat maſſa. Eſula menſes oſto antè ſit collecta, non recens.

Valdè turbant: ſed ſunt efficaces in corporibus robuſtis. Minùs exſiccabuntur, ſed & minùs efficaces erunt, ſi excipiantur Symplo Roſarum ſolutino, non mucagine Tragacanthi.

Aggregatiuæ Meſuæ; in quibus par quantitas Scammonii, Turbiſh, & Aloës, ſcilicet ana ʒ vj.

De Hieta, cum Agarico.

Ruſſi, ſeu communes, Melle Roſato comprehenſa.

Pilula Scaligeri.

℞. Aloës (bis Succo Endiuie, & bis Succo Roſa-

Rosarum lotæ, & iterum bis imbutæ
 expressione drachmarum sex Rhei electi
 infusi in Aqua Endiuia, cum tertia par-
 te Vini albi, & ℥ β. Spicæ Nardi) ℥ ij. β.
 Galangæ ℥ ij.
 Succi Absinthii latifolii inspissati, &
 Salis Gemmæ ana ℥ β.
 Fiat massa.

*Mercuriales (si quando vsus venerit) paran-
 da in modum sequentem, ut sunt apud Re-
 nodæum.*

Pilule Mercuriales.

℞. Hydrargyri in Succo Limonum pri-
 mum extincti, & postea in Succo Saluiæ
 nutriti ℥ vj.
 Aloës optimæ ℥ v. Rhabarbari ℥ iiij.
 Dacrydii ℥ ij. Agarici ℥ j.
 Styracis calamitæ Cinnamomi Macis
 Santali citrini Salsæ Parillia
 Sassafras Moschi ana ℥ β.
 Mellis in decocto Guaiaci despumati, &
 ad aquæ consumptionem cocti, quod
 sufficit. Fiat massa, digitis pauco
 Oleo Terebinthinæ imbutis tractanda
 aliquamdiu, ac postea vsui reponenda.

Pilule ex Aristolochia, Fernelii.

℞. Radicum Aristolochiæ rotundæ ℥ j.
 Radic.

Radicum Gentianæ

Myrrhæ electæ ana ʒ iij.

Aloës Cinnamomi ana ʒ β.

Zingiberis ana ʒ j.

Omnia exquisitissimè trita excipiantur
Qleo Amygdalorum dulcium recenti.

Paranda in rem presentem.

De Cynoglossio, Mesuæ, addendo Syraciæ
ʒ iij. Reliqua quæ à quibusdam adiecta fue-
runt, humores attenuant, quos incrassare
consilium est; ideòque omittenda. Nostrium
Cynoglossum non est malum veri Cynoglossi
antiballomenon.

AQVÆ DISTILLATÆ.

Tartari	Nymphææ.	Euphragiæ.
Vitrioli.	Papaveris	Salviæ
Sulphuris.	rubri.	Maioranç
Vitæ.	Graminis,	Melißæ
Scabiosæ.	Solani.	Scordii.
Endiviæ	Plantaginis.	Cardui bene-
Acetosæ.	Herniariæ	dicti.
Cichorii.	Buglossi.	Ulmariæ
Violarum.	Boraginis.	Cruciata.
Rosarum.	Tussilaginis.	Aluminosa.
Lactucæ.	Betonicæ.	Cinnamomi.
Pimpinellæ.	Abstiathit	
Portulacæ.	Fœniculi.	

AQUA

Aqua Theriacalis optima.

℞. Radicum Gentianæ Enulæ Campanæ
 Tormentillæ Angelicæ
 Imperatoriæ ana ℥ j.
 Cyperi Ircos Florentinæ ana ʒ vj.
 Zedoariæ
 Corticis Citri sicci, & Arantiorum
 Cinnamomi Caryophyllorum
 Seminis Gardui benedicti
 Corymborum Hederæ
 Granorum Iuniperi ana ℥ β.
 Dictamni Scordii Melissæ
 Calendulæ ana manip. β.

Macerentur diem integrum super cineres calidos, in vase oris stricti, optimè obturati, cum Vini albi lib. vj.

Die sequente adde decoctionis Vlmariæ, Betonicæ & Nenupharis libras ij. Deinde bulliant parum, lento igne. Postea fiat expressio: in qua dissolue & infunde per noctem Theriacæ optimæ ℥ iiij. Ponantur in alembico vitreo, & fiat distillatio in balneo Mariæ.

Aqua distillata seruetur.

Facultates omnes recreat: qualitates pestilentes & venenatas domat: syncope, cordis palpitationi, vertigini, lethargo, epilepsiæ, apoplexiæ, & paralyfi succurrit.

Aquæ

Aqua vitæ aurea , magna & verè Empirica compositionis (Thomæ Eraſti:) quam nos, rebus non immutatis, in paulo meliorem ordinem rede-
gimus.

Aqua vite aurea, Thomæ Eraſti.

R. Rosarum ζ j. β .

Caryophyllatæ Baccarum Iuniperi

Florum Lauendulæ ana ζ j.

Saluiæ minoris Origani Bistortæ

Rutæ Radicum Petroseliniana 3vj.

Betonicæ Rorismarini Maioranæ

Pulegii Bismalux Valerianæ

Pimpinellæ Succisæ Menthe crispæ

(an *Mentha hortensis* ? Certè non errabit qui
eam accipiet)

Menthæ siluestris Verbenæ Keiri

Radicum Leuistici Tormentillæ

Polypodii ana ζ β .

Abſinthii Hyſſopi ana 3ij.

Magistratiæ (hoc est Mei, seu Imperatricis) 3j.

Contusa omnia crassiusculè , maceren-
tur in tribus mensuris spiritus Vini (acci-
pe quantitatem sufficientem, ad iam præscriptorum
& sequentium infusionem ritè peragendam) quin-
quies distillati in vase bene obturato , pes
dies tres. Postea diligenter distillantur.

Aquæ huic distillatæ infunde

Anisi Glycyrrhizæ

Conseruæ Rosarum ana ζ j β .

Cin

Cinnamomi Caryophyllum Malo-
rum Cranatorum (*corticis scilicet*)

Zingiberis albi

Nucis Moschatæ Macis

Galangæ Calami aromatici

Zedoariæ Aristolochiæ rotundæ

Mechoacæ Foliorum Lauri

Seminis Coriandri Cardamomi

Nigellæ Romanæ Sacchari Candi

Manus Christi Perlatæ ana \mathfrak{z} β .

Cubebarū Baccarum Lauri excorticatarū

Cumini (*seminis scilicet*)

Rhapontici (*radicis*) Corticis Arantiorū

Theriacæ ana \mathfrak{z} ij.

Granorum Paradisi Rhabarbari

Croci ana \mathfrak{z} j.

Piperis longi Piperis nigri ana \mathfrak{z} β .

Mellis optimi despumati lib. j.

Contusa omnia crassiore modo in vase
stanneo obturato relinquuntur per dies
decem. Singulis diebus agitentur bene.
Postea distillantur denuò: & huic aquæ
distillatæ adde

Sacchari albissimi, tenuissimè pulue-
rati \mathfrak{z} j.

Moschi Alexandrini

Ambra griseæ an. \mathfrak{z} j.

Caphuræ \mathfrak{z} β .

Relinquantur ita per triduum aut qua-
triduum. Postea colentur per pannum ra-
rum, & in loco frigido, vase argenteo aut

Ec stanneo

stanneo purissimo (nam vitrea vasa vis aqua eximia frangit) vsu reſeruetur.

Mirè confortat partes principes : Præſtantiffima ad apoplexiam , epilepſiam, conuulſionem. Præſeruat à peſte. Venenis aduerſatur. Syncopæ præſentiffimum remedium.

Aqua diuina, ad vlcera; Fernelii.

R. Sublimati optimi (ex Mercurio ſcilicet) gr. xij.

Aquæ Plantaginis ℥ vj.

Coque ſuper calidos cineres in phialâ vitreâ ad dimidias.

O L E A.

Philoſophorum
Sulphuris
Terebinthinæ
Cera

Tartari
Caryophyllorum
E Nucibus moſchatis
Laurinum Meſuæ.

Oleum contra vermes, præſtantiffimum.

R. Myrrhæ electæ ℥ vij.

Mastiſches ℥ ix.

Aloës hepaticæ ℥ xiiij.

Salis communis lb. j.

Contuſa omnia per retortam igne lento di-

to diligentissimè distillentur. Exhibit primò Aqua, deinde Oleum admirandum.

Guttulâ arteriæ in carpis manuum, & regio vmblici irrigantur. Etiam præstantissimum Balsamum est ad vulnera recuti-
tia. *Manant hoc Oleum ab Italis.*

E Spica Lauendulæ.

Gagatinum.

Keirinum.

Chamæmelinum.

Anethinum.

Liliorum, simplex.

Perforatæ, compositum.

Abinthii.

Rutaceum, cum Oleo *simplici, non omphacino*
contra sententiam Siluii. sic enim ἰπαστέρμασιν
melius respondebit.

Castorei simplex, Nicolai Præpositi.

Irinum Mesuæ.

Lumbricorum.

Scorpionum simplex, Mesuæ.

Capparinum compositum.

Mastichinum Mesuæ, apud Ioubertum.

Myrtillorum

E floribus & capitibus vtriusque Papaue-
ris, Oleo infusis.

Vi olatum.

Rosatum { Simplex
Complectum
Omphacinum

Omphacinū artificiale, apud Bauderonē.
Cydoniorum, Mesuæ.

CERATA & VNGVENTA.

Santalinum Mesuæ.

Stomachicum Galeni, apud Ioubertum

Rosatū { cum Opio.
Mesuæ { sine Opio.

Populeum Nicolai.

De Tutia, pro oculis.

Desiccatiuum rubrum.

Nicolai Præpositi, duplicato Oleo Rosaceo om-
phacino, & omisso Oleo Violato.

Resumptiui primæ descriptionis apud
Ioubertum.

Comitissæ.

Album, Rasis, sine additamentis.

Diapompholygos, ex Siluii castigatione.

Citrinum: ubi pro Amentho reponē La-
pidem Amiantum; pro Gersâ Serpenta-
riâ, Cerussam Serpentariam, seu Amy-
lum Serpentariæ, ex Siluii consilio.

Cerussam autem Serpentariam sic parabis:
Radices Ari, initio Veris, antequam folia
mittant, collectas, ablutas, & exteriorē corti-
ce mundatas. Contunde in mortario lapideo.
Succus per expressionem extrahatur: linteote-
ctus, sole exsiccetur, aquâ Rosaceâ lauetur.

Rur-

Rursus exsicceetur & reponatur. Verum satius est huius Vnguenti puluerem paratum habere, ut possit ex tempore Vnguentum confici in usus necessarios. Inueteratum enim, minus idoneum est.

Aureum Mesuæ.

Nutritum, seu Triapharmacum simplex, Mesuæ.

Basilicum, seu Tetrapharmacum minus, Mesuæ.

Mundificatiuum de Resina, Iouberti.

Martiatum Nicolai, ex censura Iouberti.

De Althæa, Nicolai.

Enulatum { Gum Mercurio.

Sine Mercurio.

Ægyptiacum Mesuæ.

De Arthanita maius Mesuæ, vel potius

De Lathyride, Fernelii, cuius descriptio sequitur.

Vnguentum de Lathyride, Fernelii.

℞. Succī Lathyridis lib. β.

Succī Esulæ ℥ iiij.

In quibus dissolue

Radicum Cyclaminis ℥ ij.

Scammoniæ ℥ β.

Granorum Ricini & Lathyridis expurgatorum ana ℥ j. β.

Sem. Fœniculi Rutæ & Anethi.

Baccarum Lauri ana ℥ j.

Ec 3

Trita

Trita omnia macerentur in succis diem vnum. Postea Axungiaę ꝑ viij Ceraę ꝑ iiii. liquefiant : & in his sensim omnia dissoluantur, & coquantur igne non acri, donec totus humor absumptus sit, & omnia in Vnguentum coëant.

EMPLASTRA.

De Mastiche, apud Ioubertum.

De Cerussa, ex æquis partibus Olei Rosacei &
Cerussa, prout emendata est à Iouberto.

Contra rupturam, Nicolai.

Album.

Diachylum { lreatum, ex Oleo Iriuo,
Magnum.

Cum Gummis.

De Mucilaginis, Nicolai Præpositi.

Diapalma Galeni, agitando cum baculo Quercino recenti, pro Palmeo.

De Meliloto, Mesuæ.

Oxycroceum, Nicolai.

De Iaua, Nicolai.

Apostolicum, Nicolai.

De Ranis, { cum Mercurio.

Vigonis { sine Mercurio.

Pro matrice, Nicolai.

Duo sunt Emplastrorum genera apud Galenum
libro quarto de Compos. medicam. general. quo-
rum

runſapiuſculè mentionem facimus Commentario noſtro in librum Hippocratis De vulneribus capitis, à paucis annis, magno medicina commodo ab Italis in uſum reuocata; Emplaſtrum Iſis, & Emplaſtrum Ba:ba:um.

Iſis Emplaſtrum vide apud Galenum libro 5. medicamentorum generalium, cap. 2. & 3. & apud eundem, per paucis immutatis, libro 4. ſecundum locos, ex Aſclepiade, ubi dicitur Iſis cephalica. Sic autem deſcriptum eſt ab Aetio.

Emplaſtrum, Iſis cephalica Galeno dictum, ex deſcriptione Aëtii.

Viride, quod Iſis appellatur, à quibusdam Hermoni ſacerdoti Iſidis tribuitur.

℞. Cerae ℥ xij. β.

Terebinthinae ℥ xxv. (al. xv. β.)

Ammoniacy Aëris uſti

Aristolochia longæ

Squamæ Aëris uſti Aëruginis

Turis Salis Ammoniacy ana ℥ j.

Myrrhæ Aloës

Galbani ana ℥ j. β. [al. ℥ β.]

Aluminis ſciſſilis (vel Aluminis Roche) ℥ vj.

Olei antiqui ℥ x. Aceti quod ſufficit.

Emplaſtrum hoc Polychreſtum eſt, ad omnia vulnera, præcipuè capitis, cum oſſium fractura: Item ad puncturas & aculeos infixos extrahendos: Ad hominum

& canum morsus, item viperæ, ac scorpionis : Ad artuum fracturas cum vulnere, quia citiùs callum obducit : Ad fistulas recentes & inueteratas : Ad mammarum & axillarum abscessus, tum ne fiant, tum ut facti curentur : Ad strumas : Ad sistendas oculorum fluxiones, fronti impositum : Ad ecchymoses, gangrænas, & putredines carniū arcendas.

Hoc Emplastrum, inquit Aëlius, absolutè Isis appellatur (vel Isis Hermoris:) sed aliud est Emplastrum Isis, quod Epigono tribuitur, quod etiam recipit radicis Dracunculi unciam unam. Eoque Galenus se usum dicit; quia sola Dracunculi radix, per se tusa, ac probè trita in puluerem, maligna ulcera curat. Ad ulcera sordida adhibetur Emplastri pars una, Cerati Rosacei liquidi partes due : Ad ulcera verò quæ modicæ extersione opus habent, Emplastri pars una, Cerati Rosati partes tres. Hoc autem Ceratum Rosaceum sic paratur: R. Olei Rosacei ℥ xij. Cera candida ℥ iv. Fiat Ceratum. Ceratum Rosaceum & Emplastrum proportionē dicta liquantur, miscentur, rudicula lignea agitantur; sed non diu, ne coloris gratia pereat. Loco Cerati Rosacei potest sumi Vnguenti Rosati Mesus tantumdem.

Ut formetur Emplastrum Isis, Cera, Terebinthina, & Oleum simul liquefiant: dein addantur Galbanum & Ammoniacum, Aceto soluta: atque ad ignem commixtis addantur ceteri pulueres. Vel, mettallica

tallica cum Aceto in mortario terito; deinde reliqua trita & cribrata adiecito: liquabilia liquata in mortarium affundito, subigito, vnito; & forma magdaleones.

Ne putes (inquit Galenus) Emplastrum variare, pro varia inscriptione, cum scilicet inscribitur Ἰσεῖ καὶ τῷ Ἀδύτῳ, vel ἡ Ἡρμονος ἰσσηραμυαλῖος, vel ἡ Ἐπιγονῶν. Nam idem est. Certè Epigoni Emplastrum ab Hermonis Emplastro variat sola radice Dracunculi, quam accipit. Itaque malè Londinenses eius radicis adiectionem tribuunt Fallopio: Et malè quoque Isim sine Dracunculi radice Isim Epigoni vocant, quum Hermonis sit potius. Addit Galenus, quibusdam putari hoc Emplastrum ex adytis templi Vulcani in Ægypto dicati desumptum. Disces ab eodem Galeno, Epigonum, cui postrema Isidis Emplastri descriptio tribuitur, carcere conclusum, cum hoc Emplastro quendam diuitem curasset, fuisse dimissum.

Aliud etiam est Isis Emplastrum apud Galenum lib. 4. Compositionis medicamentorum per genera, ἰσσηρ, hoc est, flauum dictum, cum superius viride dicatur Aëtio.

*Emplastrum Isis, flauum dictum,
Galeno.*

R. Argenti Spumæ 3 c.

Minii Synopici 3 viij.

Diphrygis Ceræ Chalcitidis com-
bustæ ana 3 j. (al. 3 β.)

℞ c j

Chal-

Chalcitidis crudæ ʒ ij.

Olei hemfnas, seu cotylas duas.

Argenti Spuma & Oleum coquuntur donec bis ac tertio efferuescant : postea Aquæ modicum digitis adspargitur : mox Diphryges, Chalcitis tosta, puluerata insperguntur, sub manu aquam instillando, donec non ampliùs medicamentum intercoquendum strepat. Vbi constiterit, Ceram indito. Chalcitis cruda, & Minium ex Oleo modico conterantur, & sub finem immittantur, continuè mouendo. Tandem in mortarium coniicito, atque subigito. Repone, ac vtere.

Molle conficiendum est, quia indurescit repositum.

Valet ad vlcera diuturna fluentia, maligna, ac vix curabilia, maximè in tibiis & partibus extrèmis.

Barbara Emplastra dicuntur Galeno, quæcumque Bitumen recipiunt pro basi. Sed inter alia duo potissimè commemorat, quibus uti solitus erat: Primo quidem ad maxima vulnera; Altero ad minora. Ideò primum Maius dictum, alterum Minus.

*Emplastrum Barbarum Maius,
Galen.*

℞. Picis lib. viij.

Cera

Ceræ lib. vj. ℥ viij.

Resinæ Pini lib. v. ℥ iiij.

Bituminis lb. iiij.

Olei pari lb. j. ℥ vj.

Spumæ Argenti Cerussæ

Æruginis ana ℥ ij. β.

Turis ℥ vj.

Aluminis liquidi ℥ j. β.

Aluminis scissilis ℥ iiij.

Opopanacis Squamæ Æris

Galbani ana ℥ j. β.

Aloës Opii Myrrhæ an. ℥ β.

Terebinthinæ ℥ xxiiij.

Succi Mandragoræ ℥ vj.

Aceti heminas vj. Fiat Ceratum.

Tempus conficiendi Emplastri Barbari Maioris, est, cum viget Mandragora; circa mensem Augustum scilicet.

Bitumen pulueratum, & cribro transactum, ponatur super chartam. Postea Tus, Squamma Æris, Aloë, & Myrrha trita per stamen excutiantur, & seorsim seponantur. Squamma autem super, marmore accuratè læuigetur.

Opopanax & Galbanum, Aceto soluta, ita vt parte Aceti combibitâ, lentore suo adhuc cohæreant, per linteum exprimantur.

Alumen tum liquidum tum scissile in puluerem tenuissimum læuigentur.

His ita præparatis, Pix, Cera, Resina

Pini ad ignem liquefcant : & siquæ sordes sunt , per pannum exprimendo colentur.

Oleum cum Cerussa & Lithargyro ad consistentiam Vnguenti excoquatur.

Mox indantur Resina, Pix, & Cera, ac super igne non acri commisceantur.

Calentibus adhuc, Bitumen iniicito, & spatula diligenter subigito.

Post hæc Terebinthina, cum Lachrymis, non nimis calida addatur.

Tandem Alumen, & post hoc reliqui pulveres inspersi, accuratè commisceantur. Fiant magdalcones.

Ærugo cum Oleo, Lithargyro & Cerussa coquenda est, ut color Emplastri magis gratus sit. Coctione enim Ærugini coloris gratia augetur potius, quàm minuitur.

Valet, ut ait Galenus, ad solidanda vulnera cruenta & recentia : ad vlcera antiqua & sinuosa : ad canum & hominum morsus ; & ad podagram incipientem.

Emplastrum Barbarum Minus, Galen.

℞. Picis	Resinæ Pini
Resinæ coctæ,	Bituminis ana ℥b. j.
Spumæ Argenti	3 x.
Cerussæ	Æruginis, ana 3 vj.
Opopanacis	3 iij.

Olei

Olei , tempore hyberno, z ix ; æstiuo z vj.

Liquanda liquefiant : & tritis terendis,
confice in mortario, cum Aceto.

[Eadem præstat quæ Maius , sed non
tam efficaciter.]

Quodsi mitius , & magis anodynum
desideras , adde Succi Hyoscyami z β .
Opii tantundem.

Fiat Ceratum.

Ceterum Pharmacopœi , ad dispensationem &
confectionem Compositionum tum purgantium,
tum alterantium , itémque Unguentorum & Em-
plastrorum , aliorumque magni nominis medica-
mentorum , quæ in Officinis asservari debent, Me-
dicos advocabunt ; ut eos suæ fidei & diligentia te-
stes oculos habeant, & operis directores.

F I N I S.



INDEX IN VAL. CORDI RECEPTARIUM.

A.

ABIEYINA re-
fina 535
Abrotonum 113
Abſinthium Ponticu
146. 305.
Abſinthium Roma-
num. 146
Abſinthium ruſticum
305
Acacia 112, 121, 406.
Acaciæ ſuccedanea
112, 118, 121, 368,
369, 541.
Acini. 339
Acori loco quid 53.
62.
Acorus. 125, 249, 539.
Acorus verus quid.
68, 112.
Adiantum nigrū. 191
Adipum præparatio.
366.
Adulteria ſimplicium
medicamentorum.
406, & ſeqq.
Aëromeli. 239.
Aerugo. 313
Agarius Trochiſca-
tus. 267
Ageratum. 43
Agreſta. 141
Albatecha. 269
Alexiterium contra
peſtem. 567
Alleluia. 321
Allium ſilueſtre. 522
Aloë abluendi mo-
dus cum aromati-
bus. 359
Aloë præparatio. 359
Alum, aut Halum. 92
Alypias 96.
eius loco quid. 95
Alypum. 95
Alzanahan, alcha-
nach, alzanach,
Ichthyocolla. 349

Amaracus. 144, 255,
256, 314, 328, 520.
544.
Amarena ceraſa. 180
Ambra. 277, 278
Ambreæ pomum.
587
Amentum dulce. 335
Amomi loco quid 51
70, 112, 131, 208,
246, 259.
Amomum verum.
87, 88.
Amomum falſum. 27,
88, 111, 539.
Amylum. 36.
Anchuſa. 296
Angelica 64, 125.
Anguria 193, 194
Animalium partium
delectus. 405, 406
Anthera. 272
Antiballomena. 456
Antimonium, pro Ar-
timon. 93
Anthophylli. 22
Aphace. 516
Apium. 537
Apparine. 315
Aqua Cinnamomicō-
tra epilepſiam. 606
Aqua diuina ad vlce-
ra, Fernellii. 650
Aqua theriacalis op-
tima. 647
Aqua vitæ aurea,
Thomæ Eraſii. 648
Aquæ marinar loco
quid. 288
Archeutida, ſeu Ar-
ceuthis 213, 259.
Ariſtoloeh. rotunda,
112, 119, 277.
287, 542.
Ariſtol. tenuis. 113,
118, 342
Aromaticum Garyo-
phyllatum 17

Aromaticum Roſa-
ium Gab. 19
Aromatum Indico-
rum libellus Gar-
ciz. 19
Arthanita 341.
Artimonium 93.
Arum 221.
Aſarum 40.
Aſpalathi loco quid
254, 255, 257, 259
Aſpalathus 254.
Aſphaltum 103, 541.
Aſpis 517
Aſplenium 153, 456.
289.
Aurea Alexand. 84.
Auri & argenti lima-
tura 23
Aurum aur argent.
foliatum merū 59.
Aurum coctum 86

B.

Bacilli Bechici, vul-
go Rebecha. 614.
Balanus Myreſtica
308.
Balaſtium gr. 132.
Balaſami fruſtus 116
Balaſami loco quid
84, 263.
Balaſmita. 47, 48, 319
Balaſamum quid ſi-
gnificet. 87, 263.
525, 526.
Bardana 337
Batega 269
Bancia 101
Bedeguar. 161, 201.
Behen albi & rubri
ſuccedanea 508
Benedicta laxatiua,
208
Biſorta 536
Bitumen Iudaicum
103, 541.

Blatta

INDEX.

Blatta Byzantia. 259
 528
Bolus Armena 538
Boraginis succusela-
rificandus 170.
Borax 335
Branca vrsina 95
Brassica siluestr. 95.
Britannica 536.
Buglossa domestica
 210.
Buglossa siluestr. 296
Buglossa vulgaris
 170
Bulbi sem. loco 98
Bunias 120. 114
Bupthalmum 321
Burungi 83, 84
 C
Achrys. 125
Calamintha cap-
pestris 25
Calamintha dome-
stica 150
Calamintha montana
 24
Calamintha sil. 151
Calami aromatici
veri loco quid 54.
 155, 256, 259, 281
Calamus arom. 249
Calamus odoratus
 543
Calamus vnguentar-
ius 259
Camphorata 321
Candelæ pro carun-
culis in meatu
vrinario natis. 595
Candelæ pro suffitu
 588.
Capillus Venerisve-
rus 192
Carabe 278
Cardamomum 20, 11
Carduncellus 320
Carduus benedictus
 320
Carneola, aut Cor-
neola. 55.
Carolina 162

Carota 101
Carpesium 540, 541.
Carpobalsami suc-
cedanea 23, 47, 297
 540
Carpobalsamus 297
 540.
Caryocostinum 602
Caryon myrsicon
 298
Carydion 298
Cassia flos 442
Cassia, vel Cassia. 115.
 281, fistula. 47, 110.
 535, extracta, seu
 Flos Cassia. 442.
 extractacomunis
 443 extracta sine
 fol. Senx 129. ex-
 tracta cu fol. Senx
 190, extracta pro
 clysterib. 190. li-
 gnea 20. 21. 47.
 523. 535.
Cataputia maior 309
Catharticum hydra-
gogum 438.
Catharticum Impe-
riale 221.
Cathengit, seu Ebu-
lus. 341.
Catholicon 198
Catholicum ex infu-
sione puluerum,
Sena & Rheo 631
Caulis agrestis 95
Cauterium poten-
tiale 599
Celtica, Spica. 221
Centaurium maius
 528, 529 tenue
 542
Centumneruia 320
Ceræ oleum 590
Cerastes 517
Ceratium, vide Ce-
rotum.
Cerota vel Cerata
 345
Cerotum infrigi-
dans Gal. 345

Rosacenum. 656.
Santalinum 345
Stomachale 346
Cerotum ex Betoni-
ca 596
Diachalciteos, vel
Diapalma 596
 pro Herniosis 597
Cerussa serpentaria
 vt fiat 652
Ceterach 153. 192
Chalcanthum 538
Chalcitis 112, 113
 538
Chalcitidis affatio
 538
Chalcu cecsumen
 356
Chamædrys 53, 54
Chamæmelum 349
Chamæpitys 211
 144. 203
Cherua 309
Cheyri 263. 303.
Cholagogum rosa-
tum clemens 434
Chylisma Pilula-
cum. 603
Cicuta 521
Cinnamom. 523, 536
Cinnamomum cras-
sum 27.
 tenue 27, 28.
Cinnamum 28, 296
Citri semen 526
Collyrium album,
Galeni 526
Colocynthidis præ-
paratio 363
Comæ. 25. 110.
 in Compositionibus
 quid obseruan-
 dum 547, 548.
Condita varia 132,
 133.
Confectio cordia-
lis 58
Hamech 447
Hamech ex celsu-
ra Feroelii 633.
Hamech maioræ
 Ha-

I N D E X.

Hameeth minor 203
Liberans 57
Anacardina 83
Confectiones aromaticæ. 17.
Opiatæ 70. & seq.
Conseruatorum faciedarum ratio 133
Conseruæ varietas 133.
 134
Conserua pro Mostarda 580.
Consolida maior 92
Conyza 316. 317
Corallium rutilū 92
Cordumeni idem
 quod Cardamomum 281
Corticū delectus 403
Costus 22. 23. 40.
 532. *hortensis* 326
Cotula maior 437
Craffula 320
Cremor Prisanæ 579
Cremor Tartari 605
Crethamus agrestis.
 133.
Crinon 296.
Crispula 322
Crithmum spinosum. 69.
Crocus Cilicius 110
 Coricius 117
Croton 309
Cubebæ 252
Cuminum præparatum quid 26
Cyanea glycyrrhiza
 117.
Cyclamen 341
Cymbalaria 317
Cyminum Carmenum 232
Cyperis 51
Cyperus rotundus & longus 50. 51
Cyphi trachelici 120

D.

D Arseni. 27. 28.
 Dauci Cretici

loco quid 48. 73.
 85. 112. 118.
Daucus Creticus quid
 48.
Decoctio Clysteris carminatiua 621
Decoctio communis Clysterum remollientium 612
Decoctum commune medicinarum cum & sine Sena 601.
 623.
Decoctum pectorale simplex 602. 612
Decoctum pectorale compositum, cum Sena. 613
Decoctum sclopetorum. Vide Potio vulneraria 613
Denarius 220
Dentalium 335
Discalaminthos Gal. 35. *Mesuz* 24
Diacameron 12
Diacarthamum 213.
Diacatholicum 198.
 443
Diacasia cum Manana 188
Diacastorium 92
Diachalcitis 596
Diacinnamomum 17
Diagitonium simplex 134 & succo cydoniorum 136
 compositum. 135
Diacnicum cum citro 439.
Diacodium Aduarii
 91. cōp. *Mesuz* 90
 simpl. *Mesuz* 89
 solidum 638
Diacorum 67
Diacostum 40
Diacuminum 26
Diacurcuma maior
 44.
Diadamasenum 196
Diagalanga 34
Diahyssopus 39

Diairis Salomonis
 36. *simplex* 36.
Dialacca maior 42
Diamarenatum cōp.
 182. *simpl.* 181
Diamargaritum calid. 30. *frigidū* 29
Dianubra 21.
Diamoron 180
 Valerii Cordi. 180
Diamoschum amarum. 33. *dulce* 32
Dianisum Mesuz. 20.
Dianthos 29
Diaolibanum 70
Diapalma 596
Diapapauer 184. 185
Diapenidion 35
Diaphenicon. 104.
 441.
 in forma solida
 206.
Diaprasium 45.
Diaprunum comp.
 laxat. 197
 comp. non laxat.
 195.
Diarrhodon abbatis
 41.
Diasarum Fernellii
 582
Diasarou aliud Fernellii 637.
Diasatyriou Fernellii 639
Diasatyriou Mesuz
 99
 Nicolai 98
Diasecordium Fracastorii 565
Diascebesten 416
Diasena 207
Diasinapi 579.
Diathamaron 22
Diatragecathum calid. 32
 frigid. 37
Diatrion pipereonis 1
Diatrion satalon 49
Diaturbith cum rhabarb. 212
 minus 213

ma-

INDEX.

maius	375.
Diaxyloaloes	50
Diazingiber	52
Dictamnus Creticus	110. 533
Dictamnus vulgaris	252
Dielleboru Fernelii	637.
Diploma	280
Dosis Sacchari ad conferuas	334
Dosis Specierum ad libram vnam sac- chari in confect. solidis	17
Dosis Specierum ad libram vnam mel- lis	71.
Drosomeli	239.
Dulcis radix.	94

E.

Electerium	235
Elect. Caryoco- stinum	602
contra vermes	638
De baccis Lauri.	97
De Hyacintho leu- berti.	640.
De limatura Cha- lybis	568
aliter	569
De ouo, Maximil. Imp.	567
De pomo Citrio	181
Diaseordium	566
Diapxonias	65
Ducis	52
Elefchof	209
Episcop.	209
Exstitix Gal.	59.
de Gemmis	54
Indum	442
Indum maius	199.
Indum minus	200
Iustinum	56
Exsticans Rafis	60.
Lenitium	191. 446
Lenitium de Ma- ma	192

Opticum	569
contra Pestem	565.
Plirifarcotium	61
de Psyllio	209
Purgans, de Po- mo Citrio	581.
Resumptium	66
Resumptium Fer- nelii	641
Rosatū Mesuz	211
de succo Rosarum	211 in forma so- lida
de Sebecke	193.
Elelisphecon	25. 312
Ellebori nigri extra- ctio.	374.
Elops	517
Emplastra	346. 347.
& seqq.	
Emplastrum ad cal- los pedum	608
ad hydropem.	608
album coctum	356
Apostolicon	353
Apostolicon aliud	355
de Baccis Lauri	358
Barbarum Mainz.	
Galeni.	658
Barbarum minus.	
Galeni.	660
Basilicon magnum	
	157
de Cerussa	654
de Crusta panis	
	358
de Lapide Calami- nari.	357
Diachylon comp.	347.
Diachylon ma- gnum	348
Diachylon paruum	349
Diachylon simpl.	346
Griseum	357
Isis cephalica, di- ctum	655
Isis danum dictum	

Galeno	657
de Meliloto	350.
de Mucilag.	347.
Oxyroseum	352
de Ranis	598
è pelle arietina, ad hernias	608
ad tophos.	598
Triapharmacu	352
Viride	357
Endivia vera	554
Entalium	334
Epatis lupini præpa- ratio	366
Epitaphium Valerii Cordi	397.
Erucæ semen	23. 24
Eruum verum quid.	516
Esbrium	324.
Esdræ Antidotus Aëuarii	131
Antidotus Aëti.	118.
Esulæ præparatio	364
Eupatorii, eiusque succu succedaneum	43. 162.
Eupatorium	43. 230.
Extractiones purgan- tium medicament. artificiosæ	373. 374 & seqq.
Extractionum melana- gogum, sangui- nem defecās.	436
F.	
Fellix	343
Fisticum seu Phi- ricum	101.
Flores Cafx fistulæ solutiux	187. 447
Florum delectus	402
Flos xris	315
Fœniculus porcineus	43. 64.
Folia Garyophyllo- rum.	207
Folli succedaneum	37. 12. 50. 61. 66. 126. 127. 128. 163. 255.

INDEX.

P ollum 12, 19.	Judaica. 320	arthritica 144
Indum 112	Santiz Mariz 320.	moschata 103.
Malobathri 112, 120	326	Iulep Rosatum 171.
Fornax quomodo faci- enda 385	Moschata 321.	Violatum 171
Fraxinella 212	Paralysis 134, 320.	Iuncus Arabicus 115
Fructus Balsami 116.	Turcha 320.	odoratus, 122, 131.
Fructuum delectus 403.	Venti 324	534.
G Alanga magna 17 rufa. 17.	Herbarum delectus 401.	Juniperus magna 159
Galbanum 523	Hermela vel Harma- la 249.	L Ac Virgincom, V Veckeri 623
Galliz cupressi 172.	Hiera Pachii 219.	Lactz ablutio. 360
Gallion, 127. 319.	Aromatica 454.	Lachryma Terebin- thi 117
320, 325	picra composita 226	Lachrymarum dele- ctus 405
Gemmae Populi 307	picra cum Agari- co 215	Lapathiolom 310
Gentiadis radix 117.	picra simpl. 215	Lapis Armenus 107
Gerfa serpētaria 335	picra Ralis ad pi- culas cochias. 231	cancrorum 278
Gersamfaciendi mo- dus 364.	Hieralogedium 217	philosophorum 600.
Glandes sine suppos. 214.	Hippocras, seu Potus Hippocraticus. 578	Lapis sepricus 599.
Glas vnguentaria. 308, 309.	Holippz purgantes 582.	Lappa maior 337
Gleba Armena 538	Hydragogum maius, Fernelii 635.	Lassulata 326.
Gluten Alchanach, alzanahā, alzanach 349.	Hydragogum minus, Fernelii. 635.	Laundula 310
Glycyrrhiza 18	Hydromel simpl. 576	Laureola. 317.
Glycyrrhiza cyanea. 117.	Compositum 576	cuis preparatio 635
Glycyrrhizæ succus 524	Purgans 577	Laurus & Laurinum oleum 525, 526
Gnaphalion 542	Hyoscyamus Anti- dotis additur. 521.	Lemnia terra. 538.
Grana Solis 208, 228	Hypocistis 90, 537	Lenitiuae Cassia. 441
Granum Ben 308, 309	Hyssopus humida 342	Lenitiua, & Solutiua 127
Gratiola. 43, 210.	I Arbs 316	Lepidium maius 235
Gummi splendidum. 117, 118.	Iasme 303	Lepis chalcu 356
Arabicum. 112, 118	Jasmini flos 303	Leucopiper 282
vermiculatum 112	Indicorum aroma- tum libellus Gar- ciz 19	Libanotis Species 125
H alus, aut Halum, huc Alum 92.	Imperatoria 64	Libanum 353
Hedychroon magna 520.	Infusio Rosarum 147	Libra medicinalis 17
Helenium 206.	Violarum 148	Lichen 192
Hepatis lupini præ- paratio 366	Interpretes bonos, etiā rerum peritos oportet esse, non solum Latine, aut Græcè doctos. 542	Ligustrum 302
Hepatica 192.	Iris Illyrica 77, 523	Limatura auri, argen- ti 23.
Heptaphyllon 530, 531.	Iun 111. 144, 203.	Limaturæ ferri præ- paratio 361, 362
Herba crassula 320		Lingua zuis 80. 100. ceruina 157, 325.

INDEX.

de Papavere 184.
 de Pino 183.
 de pulmone Vul-
 pis 186.
 sinum & expert.
 182.
 de Scilla 185.
 Laph planum 100.
 Laph crispum 100.
M Abathematicum
 95.
 Macedonicum 54.63.
 Macropiper 182.
 Magma Hedychroum
 177. 540.
 Maiorana 254. 324.
 Malabathrum, vel
 Malobathrum 111.
 537.
 Malobathri folium
 115.
 succedaneum 111.
 117. 256. 257.
 Malum terræ 120.
 Mamex loco quid 132.
 Mandragora, 531.
 Mandragoræ pom-
 rum succi pœnuria
 quid 284.
 foliorum loco quid
 317.
 Manna Orientalis 139.
 Manus Christi perla-
 ta 38.
 Marathrum 325.
 Marum 254. 521. 545.
 Mari loco quid 254.
 256. 520.
 Matricaria 324.
 Mastiche 21. 535.
 Maturella 321.
 Medulla Ceraforum
 181.
 Medulla prunorum
 194.
 Medulla prunorum
 acetos. 194.
 Medullarum præpa-
 ratio 367.
 Mei loco quid 62. 117.
 Melancardium 176.
 Emblicorum 176.

176.
 Odoratum aroma-
 ticum Dantisca-
 num 150. 151.
 Rosatum 173.
 Rosatum aliud ef-
 ficacius. 173.
 passularum 176.
 Tabarzet. 184.
 Melanagogum extra-
 ctum 438.
 Melanopiper 282.
 Mellis Attici loco
 quid 124.
 Melon Magnus In-
 dus 269.
 Mentha aquatica 293.
 crispa 323.
 Græca 326.
 Romana 326.
 Saracenica 320. 326.
 Menthastrum. 269.
 Meu 64. 86.
 Meu loco quid 71.
 86. 111.
 Meum 48. 64. 86.
 Mezerei præparatio.
 364.
 Michleta 96.
 Milium Solis 120. 228.
 Mira solis, aut Mira
 Sole. 109.
 Mithridates Rex. 314.
 Mithridatum 514.
 Andromachi 126.
 Democratis 119.
 ex Cleopatra &
 Antipatro 121.
 Misa cytoniorum
 arom. 172.
 Cytoniorum simp.
 172.
 Morfelli laxativi 607.
 Moschocaryon 208.
 Moschus 18. 20. 321.
 Mostarda seu Diapsa-
 pi 579.
 Mucharus 148.
 Muria 288.
 Musa Enea, siue
 Egæta, vel Zaze-
 æta. 71.

Murus Aperti 49. 140.
 Myrob. nigri 232. 235.
 Myrrha 527.
 Troglodytica 110.
 Myrtha 325. 328.
 Myrtus 292. 328.

N.

N Abuch 178.
 Napus 86. 101.
 110. 522.
 Narcissus 540.
 Nardi Indicæ loco
 quid 125.
 Nardus Celtica 77.
 120. 121. 537.
 Galatica 115.
 Indica 125. 127. 516.
 Nardus quid 56. 65.
 Nefalia 223.
 Nasturtium album.
 232.
 Nenuphar. 30. 166.
 Nepita, vel Nepeta.
 511.
 Neremisch 61.
 Nerion 231.
 Nigra spinæ 112.
 Nilul album 338.
 Noxæ ponderum 372.
 Nucleus seminum
 quid 30.
 Nux Indica moscha-
 ta 298.
 Myristica 53.
 Vaguentaria 198.
 Nymphaea, alba &
 lutea. 30. 167.

O.

O Bolus 125. cina-
 nota. 125.
 Oculi cæcorum 279.
 Oryzum citratum 33.
 Oesypus. 347. 349.
 Oesypum facienti
 modus 367.
 Oleander 144.
 Olea 279.
 Oleorum natura &
 vires 380.
 Oleorum distillatio
 artificiosa 377. 378.
 & seqq.
 Oleum Absinthii 305.

Amyg-

Amygd. amar. 302
 Amygd. dulciſſ. 308
 Anechinum 300.
 Balaninum 302
 Baſamū 589.
 de Cappare 289.
 Caſtorei 285
 Cere 590
 Chamemelini 301
 de Cherua 309
 Cheyrium 303
 contravermes 588
 aliud. 650
 Coſtinum 281
 Cytoniorum 291
 de Euphorbio 285.
 Formicarum 287
 Hyoſcyami 310
 Hyperici 293
 Iſaminum 302, 303
 Iſinum 294. aliud
 295.
 ex Iuniperi baccis
 280
 ex Iuniperi ligno
 279.
 de Lateribus 289
 Laurinum 311, 525
 Liſuſtrinum 301.
 Lilinum 301
 Lumbricorum terr.
 282.
 Mandragoræ 283.
 Maſſichinum 284.
 Menthæ 304.
 Moſchelinum 297
 Myrtilorum 303
 Myrtinum 304
 Narcifſinum 301
 Nardinum cōp. 281
 Nardinū ſimp. 280
 Nenupharis albi
 306.
 Citrini 306
 ex Nymphæa ci-
 trina 306
 Nymphæatum al-
 bum 306
 Omphacium 292.
 Papaveris 310
 de Piperibus 282
 Populinum 307

I N D E X.
 Populinum aliud.
 307
 Ranarum 588
 Roſaceum 305
 Roſatum comple-
 tum & ompha-
 cinum 605, 606
 Rutæ 299
 Sambucinum 302
 Sampsuchini 292
 Scorpionum comp.
 287
 Scorpionum ſimp.
 286.
 Sefaminum 311
 Spicz 310
 Tartari 290
 Terebinthinæ 290
 contra Vermes 588
 aliud 650
 Violaceum 306
 Vitellorum ouo-
 rum 293
 Vitrioli 381
 Vulpinum 288
 Zanetinum 591
 Olufatrum 25, 54, 56
 63
 Omphacium Ole-
 um 293
 Omphacium 141
 Onyx 259, 278
Ovis 518.
 Opium 521.
 Opium in oleo diſ-
 ſolui nō poteſt 284
 Opobalfamum ſucceda-
 neum, Euricii
 Cordi 312
 Opobalfam. ſucceda-
 neum 23, 45, 63.
 94, 102, 110, 119.
 254, 524
 Opobalfam. 87, 525
 Orchis 100, 101
 Origanum Creticum
 232 Orientale
 78.
 Origanum Perſicum
 78, 232. eius loco
 quid 78, 232

232
 Oxy mel comp. 174.
 ſimp. 174.
 Elleboratum 577
 Scillit. comp. 175
 Scillit. ſimpl. 175
 Oxyſacchara cōp. 157
 ſimpl. 157
 P.
PAEONIA 61
 Palma Chriſti 309
 Pancratium 515
 Panis porcini 341
 Papaver rubrum 325
 Paralyſis herba 320
 Parietaria 191, 324
 Paſſulæ laxatiuæ 580.
 purgantes cum Rha-
 barbaro 607
 Paſilli Scillitici 519
 Theriaci 101, 516.
 517, 518.
 Paſtinaca marina 69
 Pelecini pænuria
 quid 123
 Pentaphyllum 530
 Perſicaria 320
 Periclymenum 321
 Perſici flor. & fol.
 vapor & deſtillata
 aqua aluū ſoluunt
 188
 Petroleum clarum
 ſauum 31, 94
 nigr. & craſſum 312
 Petroſelinum 531
 Agreſte 47
 Macedonicum 25, 54
 Pharmacopœus qua-
 lis eſſe debeat 10, 11
 Pharmacorum parād.
 tempus 423
 Philonium ex Gal. &
 Aegin. 74
 maius, ſue Roma-
 num 72
 Meſuz 73
 Perſicum 75
 piſticum 52, 101.
 Phu. 86, 117, 321, 540
 Phyllitis 157
 Phyllon. 139.
Pilul.

INDEX.

P ilulæ 214 & seqq.	Myroba 248	P runus silueſt. 139,
de Agarico. 228	de Rhabarbaro 243	P ſeudodiſtamnus
aggregatiuz 230	Ruſi 244	252
alephanginz. 224	de Serapino 249	P uſſanz cremor 579
alephâg. Val. Cor- di. 251	de Sarcocolla 244	P ulegium 533
de Aloë & Maſſi- che 242	de Tribus, ſeu Ruſi 244	cervinum 269
de Aloë lota 242	ex Ariſtolochia, Fernelii 645.	P ulicaria 316, 317
Arabicz 227	Sanctæ, Italorum 603	P ulmonis Vulpin- præparatio 366
Arbitricæ 227	Scaligeri. 644.	P ulpa Caſis ſtultæ ſolut. 187, 188, 189
Aſaieret. 226	Sine quibus 244.	Ceraſorum 281
Aureæ. 229.	Stomachicæ Al- kindi 245	P runorum 294
de Bdellio 250.	Stomachicæ Meſue 246	Sem. Aſparagi & Ruſci 208, 218
Bechicæ 250	P illularum maſſæ ex- tract. 376	T hamarindorū 189
Benedictæ 231.	P impinella Germa- nica 320, 325	P ulvis ad Epithema- ta cordis 69
Cochiz Rhafis. 231	P impinella Italica 324, 325	ad Epithemata he- patis 70
de Colocynthide. 232.	Pinguedinum præpa- ratio 366	ad Glandes vel Suppoſitoria 224
de Cynogloſſa 250	P iper album 521, 532	P ulvis aut Trageæ laxat. 222
de Eſula, Fernelii. 644.	nigrum 25, 109, 522 532	medicaminis Tur- bith. 222
de Eupatorio. 233.	longum 533	S enæ præparatæ 232
de Euphorbio. 233	P iſtacium 52, 101.	S ernuatorius 233
Fœtidæ maiores 234.	P lantago maior 320	P ulvis Epilepticus 570
Fœtidæ Rhafis 234	P lumbi præparatio 361	pro Gutturis vlcē- ribus 571
de Fumo terræ. 235	P olygonum mōtanum 110	contra Hydropem, Eraſi 523.
de Hermodyſtilis. 236.	P olytrichon 320	ad Partum, Helidei 570
de Hiera comp. 237	P ompholyx 338	contra Scabiē 572
de Hiera cum Aga- rico 238	P omum Ambræ 187	contra Vermes 583
de Hiera ſimplex. 237	P onderum ratio 369	V iolarum odora- tus 572
Iliacæ 584. & 641	P otio vulneraria ſeu Decoctum Sclope- tarium 623	P unicæ ſilueſt. ſos 91 132.
Imperiales 246	P otus Hippocrati- cus 578	P urpureus color, pro intensè ſplendido. 541, 542.
Indæ 236.	P ræparationes quo- rumdam ſimpl. 359 & ſeqq.	Q uid pro quo 456 & ſeqq.
de lapide Armenio 239	P raſium viride 356	R adicum delectus 398
de lapide Lazuli. 238	P rimula veris 234.	R adix concava 276
Lucis maiores 240.	P ropolis 354	R amich 99
Lucis minores 241	P runorum ſilueſt. va- por & aqua deſtill. aluum ſoluunt 188	R apæ ſemina 523
Maſſichinz 241		
Mercuriales 645		
de Mezereco. 239		
de Nitro 584		
de Oſſo rebus 248		
de Opopanace 247		
Peftilentiales 244		
de Quinque gen.		

Raved

INDEX.

Raued 265.
Raued Seni. 162, 230, 233, 240, 255.
Rebecha. Vide **Baccilli Bechici.** 614
Requies Nicolai 76
Rehna Abietina 335
Terebinthina 535
Rhabarbarum 529
Ponticum 528, 529
Rha sine Rhæu Pontici pœnuria quid sumi possit 22, 129 255.
Rhabarb. extraG. 375
Rha Ponticum verum 88, 110, 113.
Rheoponticum 22 255, 328.
Rhodostagma 263
Rhusculinarium, obsoniorum 92, 130.
Ricinus 309
Rob 179, 180, 181.
Rob de Berberiscôp. 179
de Berberis simp. 179.
Cerasorum 181.
Nucum 180
de Ribes comp. 179
de Ribes simp. 179
Rosa asinaia 61
Rosa Hierichôtis 519
Rosata nouella 65
Rosmarinus 125
Rubricæ Lemniæ loco quid 123
Rubus Idæus 181
Ruscus 248.
S.
Sacchari libra in cōfectionibus quantum specierum requirat 17
Saccharum Tabarzet 27, 211.
Sagapenum 97, 112
Sal Hammoniacū 94
Salis Indi loco quid 236, 239
Saluunca 23, 77, 85.

Salpetræ 335
Saluia Romana 326
Sampluchus 254, 281
Sanguisorba. 320
Sanguinis Hircini præparatio 366
Santalū Machoziri. 17
Moschatellinum. 29
Sapa. 165, 229.
Sapphirilocoquid. 38
Sapphirus 55.
Sarda, gemma 55
Satyrium. 98, 100, 101
Saxifragia 47, 56, 145 221, 325, 326.
Scammonæ præparatio 362.
Scariola 42, 49, 166.
Scatuncellum 317.
Schoenanthum 40, 43 102, 534.
Schoenon 119, 124, 256, 258.
Scilla, & Pastilli Scillitici 515
Scillæmuccilago quomodo colligenda 186
Scillæ præparatio 363
Scincus 98
Scolopendria 157. 192, 289, 325.
Scolopendrium. 161.
Scordion 109, 523
Scoria ferri 79
Scoriz ferri præparatio 361
Secacul 67, 58, 69, 80
Seitaragi Indum 81, 335.
Selinon 531.
Semen rosarum. 272
Seminū delectus 402
Semperuina minor 337.
Sericum crudum 34
Seris. 129.
Serpentes 517
Serpentaria. 100, 316
Serpentariz locoquid 364
Sesamum. 311
Seseli. 35, 86, 111.

Creticum 48, 62, 64 80, 127
tenue 118.
Setacrua 34
Sextarius. 90, 324.
olei. 296
Siciliæus 93, eius nota 92.
Sief album 586.
Sigilli Lemni loco quid. 102, 113
Sigillum Lemniū 111
Siler montanum 25, 111.
Simpl. absolutè scriptum quid denotet 414 & seqq.
Simplicium delectus 398
Simpl. Adulteria 406
Simplicium legendorum tempus 423
Sinapi album 83, 84
Sinnus. 87
Sinon. 87
Sinonum 47, 87, 88
Sirupi, seu Syrupi 137. & seqq.
de Absinthio maior 145
Acetositate Citri. 139.
Acetositate Limonium 140
Acerosus cōp. 138.
Acetosus simp. 138
de Agresta 143
Althææ Fernelii 572
Aranciorum acetosorum 140
de Artemisia 144.
de Artemisia, Fernelii 628
Augustini Niphi 574
Byzantinus comp. 142
de Byzantiis simp. 143.
de Calamintha 150
de Cichorio cum Rha-

INDEX.

Rhabarb. 153, 154	simplex 151	Succed. Lobelii 466
de Cichorio Nicol.	de Succo Endiuiz 152	& seqq.
Florentini 154	comp. 152	Suchaha 162
de Cichorio, Val.	de Succo Fumiter- 148	Succinum 252, 278
Cordi 177	re maior 148	Succorum delict. 403
de corticibus mali	de Succo Myrtillo- 168	Succus Borag. 169.
Citrui, 626	rum 168	& Buglossæ. 170
Dinarii 142	de Succo Viola- 159	Eupatorii. 43. 230
de Duabus radici- 137	rum 159	Scillæ. 349. 348
bus 137	de Testudinibus, 159	Violarum 159
de Endiuiz cōp. 152	seu Diachelonon 619.	Samach 92
de Epithymo. 164.	2 Rosæ siccis 572	Suppositoria, seu 214
de Eupatorio. 162	Granatorum accio- 142	Glandes 214
de Fumaria maior. 148	forum 142	Symph. pterum 92
de Glycyrrhiza 160	dulcium. 142	Synodontes lap. 278
de Hyssopo 161	In fusionis Rosa- 146	Syrupi. vide Sirupi.
de Hedera terre- 161	rum 146	
stri, sine Pulmo- 606	Infusionis Viola- 146	
monarius 606	rum. 146	
de Iuiubis 153	Myrtius cōp. 168	
de Lupulo 170	Resectus, Cordi 177	
de Melissa, Fernelii 573	Violarū comp. 152	
de Mēthamajor 149	Sister 68	
de Mentha minor 150	Sisymbriūvid. Silym. 87, 88, 131.	
de Nymphæa 165	Sison 87, 88, 131.	
de Papauere comp. 167	Sistra 64	
de Papauere simp. 167	Sisymbrium. 51. 202.	
de Polypodio 575	Smaragdiloco quid 57	
de Pomis 141	Smaragdus 55	
de Præsisio 160	Solanum 332	
de Pyris Val. Cordi 176	Sorba. 339	
de Quinque radi- 137	Spargula 219, 320	
cibus 137	vera 323	
de Scolopendrio 575	Species ad supposi- 224	
de Stæchade cōp. 163.	toria 224	
de Stæchade simp. 163	Spica Cæltica 77. 79.	
Fernelii 627	102. Lauédula 310	
de Succo Acetosæ 169	Romana. 77. 85. 121	
de Succo Boragi- 169	Spina nigra vel ex- 118	
nis 169	rules 118	
de Succo Buglossæ 170.	Spodii loco quid 67	
de Succo Endiuiz 170.	69. 262. 272.	
	Spodii præparat. 265	
	Spodium 264.	
	Squamaris 354, 355	
	Stæbe 526. 525	
	Styrax, seu Storax 111. 113. 284.	
	rubea. 94. 266.	
	Succedanea 456.	

T.

Tamariscus 76
Terebinthinæ co- quendi modus 368
Terebinthus & Resi- na Tereb. 534, 535.
Terebinthi loco quid 368. 468.
Terra vel Rubrica Lemnia 112. 538
Sigillata 521. 538
Terræ Cimolix loco quid 138
sigillatæ loco quid 57, 58, 75. 112.
Testiculi vulpis, her- ba. 100, 101
Terrahiz 310
Thamar 22
Thereniabin, vel Te- reniabin. 239. 246.
262. 271.
Theriaca 101 & seq. 512.
eius descriptiones variz 512. præpa- ratio. 553
vnde dicta 514
Cut γαλβωή 514
eius vires, quando recens danda, quæ- do antiqua, qua- 405 515. 559. & seq.

The-


Theriaca Londinen-
sum 563, 564
Theriacez Monspeli-
sis formula 545
Theriaces prępara-
tio, ex Lobelio. 562
Theriaca Rusticorum
 522
Theriaca Andr. 107.
 Andr. senioris. 114
 Diatesaron. 118
Theriaca pauper. 565
Theriac. 513. 517
Thlaspi 11. 232. 536.
Thymbra. 26. 39.
Thymiana. 94. 267
 Hammoniacum 131
Thus, vide Tus
Tirus 253
Tormentilla 530, 531
Tragea laxat. 22
Tribulus aquatic. 314
Trifolium acetos. 322
Trochisci. 253, & seq.
Trochisci de Absin-
thio. 273
 de Agarico 267
 Alhandal 273
 Alkekengi. 269
 Alindaraearon 117
 Alistę mosch. 260
 Andronis 642
 Bechii albi 274
 Bechii nigri 275
 de Berberis. 265
 de Camphora 270
 de Cappare 261
 de Charabe 268
 de Corallo 520, 521
 Cyphi 257
 Diaur 263
 Diaion 263
 Diarrhodon 264
 de Eupatorio 262
 Galliz moschatz
 266
 Hedychroi 253,
 255, 256, 257.
 de Lacca 264
 de Lacca, Valerii
 Cordi 276


I N D E X.

de Myrrha 268
 Ramich 259
 de Rhabarb. 265
 de Rosis 270
 De Rosis simp. 585
 Scillitici 253
 de Spodio 272
 de Succino, Valerii
 Cordi 277
 de terra sigill. 271
 Theriaci 109
 de Tiro 253
 de Violis purg. 585
 de Viperis 253
 è Minio, corro-
 dentes 605
Tryphera magna 77
 minor 78
 Persica 81
 Sarraeenica 79
Trypherarum diffe-
rentię 449, 450.
Tus albū aut flauū 71
 masculum 71
Tussilago 166
V **Valeriana** 321, 540
 Valerii Cordi
 epitaphium 297
 Vas duplex 280
 Venter Mergi 131
 Vermicularis 337, 336
 Vesicaria 153
 Vicia 516
 Vini Falerni loco
 quid 462
 Viperę 517, 518
 Viola 190, 263
 Violaria 190
 Viperę 109, 253, 513
 Vitriol. 381 & seq.
 Vlmus 348
 Vmbilicus marinus
 278. 335
 Veneris 337
 Vnguenta 313 & seq.
 vnguent. Aegyptia-
 cum 333
 Agrippę regis 313
 Alabastrinum 592
 Album 331
 Album caphur. 344
 Anodynum 595

Apotholorum 314
Aregon 215
 de Arthanita ma-
 ins 340
 de Arthanita mi-
 nus 341
Aureum 334
 ad Carunculas in
 pene 595
Citrium 334
Comitissę 338
De Lathyride, Fer-
nelii. 653
Dialthra cōp. 332
Dialthra simp. 332
Diapomphol. 332
Fuscum 337
Martiatum 317
Martiatum ma-
gnum 322
Martiatum paruum
 328
Nicotianum 592
Pectorale 343
Pedicularum 594
Populeum 336
Potabile 342
Rosat. Mesur 343
Rubeum caphura-
tum 344
 ex Succis Aratii 593
 de Tabaco 592
Vngula caballina 166
Vomitinum mitius,
Fernelii 542. & 637
Vomitinum validum,
Fernelii 637
Vua Lupina 338
X **Yloaloes** 41
Xylobalsamum
 543, 544.
Xylobalsami loco
 quid 59. 62. 544.
Xylocasia 21. 232
Xylocinnamomi loco
 quid 298
Z **Ambach** 303
Zarnabum lon-
gum, & rotund. 312
Zedoaria 31. 55. 75.
 312. 544.
Zurumbeth. 55. 312











77

35/

9

